

Next Generation

Ardeche.

SEGMENT RYNKU

E
EkologicznaP
Przetwórstwo
Płatki, Skrobia

Średnio późna odmiana skrobiowa o dobrym plonie, odporna na zarazę ziemniaczaną liści i bulw, odpowiednia do produkcji płatków.

- » Dobry plon skrobi
- » Wszechstronna odporność na mątwika
- » Dobra odporność na wirusy



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: STAYER x AR 02-2139

Sadzonka: AR 07-2451

Prawa hodowcy: 31-12-2048

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 5,5

Kolor kielków: zielono-czerwony

Kolor kwiatów: biały

Liczba jagód: średnia / 6

Liście - rozwój początkowy: szybki / 8

Liście - rozwój końcowy: dobry / 8

Liście - selektywność: średnia / 6,5

Liście - twardość: dość mocne / 7,5

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Kolor skórki: żółty

Wygląd skórki: bardzo słaby / 4

Wielkość bulwy: dość duża / 7,5

Kształt bulwy: okrągło-owalny

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawijanie bulw: dość niskie / 5

Regularność wielkości: regularne / 7

Wrażliwość i jakość

Okres spoczynku: dość krótki / 5,5

Metrybuzyna: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Bentazon: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6

Czarna plamistość: bardzo wrażliwe / 4,5

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6

Ciężar pod wodą: 474

Zawartość suchej masy: 25,3%

Rozkład suchej masy: - / -

Poziom TGA: 4,7

Odmiana czipsowa: średnia / 6

Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4

Typ kulinarny: mączysty / C

Przebarwienie: - / -

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

JAK UPRAWIAĆ

Nawożenie¹

Azot: standardowe zalecenie + 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 20%.

¹ Poziom nawożenia bazuje na analizie gleby.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkielkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 20-22 cm (60 500 roślin/ha)

35/55 mm: 25-27 cm (50.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po weźwieniu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Pomimo odporności na zarazę ziemniaczaną należy zwracać uwagę na ewentualne infekcje.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 8°C. Do średnioterminowego przechowywania.

Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: odporne / 9

Mątwik agresywny Pa 2: odporne / 9

Mątwik agresywny Pa 3: odporne połowo / 7

Zaraza ziemniaczana - liście: nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 6,5

Fusarium: - / -

Erwinia: - / -

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - A: - / -

Wirus - X: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne / 6

Wirus - Yntn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8,5

Rak ziemniaczany F1: umiarkowanie podatne / 8

Rak ziemniaczany F6: umiarkowanie podatne / 8

Rak ziemniaczany F18: - / -