

Impala.

MARKTSEGMENT



Een vroeg consumptieras met een goede schurftresistentie en een goede opbrengst.

- » Grove knollen
- » Brede resistenties
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Böhm
Kruising: BM 72-0052 x BIRANCO
Zaailing: BM 78-0286
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: grof / 8
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 322
Drogestofgehalte: 17,8%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Kooktype: vastkokend / A
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/impala

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Fusarium: zeer vatbaar / 4,5

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -