

# Riviera.

MARKTSEGMENT



Een zeer vroeg consumptieras met een mooie huid, uitstekende hitte- en virusresistenties en vroeg een goede opbrengst.

- » Grove knollen
- » Mooie presentatie
- » Goede virusresistenties



## KARAKTERISTIEKEN

### Algemene kenmerken

Kweker: Mts. Boerhave  
 Kruising: MINERVA x ALCMARIA  
 Zaailing: BH 86-0266  
 Kwekersrecht: 31-12-2030

### Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: zeer vroeg / 8  
 Kiemkleur: blauw paars  
 Bloemkleur: wit  
 Hoeveelheid bessen: geen / 4  
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
 Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7  
 Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5  
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilkleur: geel  
 Schilhoedanigheid: uitstekend / 8  
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
 Knolvorm: ovaal rond  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6  
 Knolzetting: vrij laag / 5  
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7

### Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6  
 Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8  
 Bentazon: - / -  
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6  
 Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5  
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8  
 Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 318  
 Drogestofgehalte: 17,7%  
 Drogestofverdeling: - / -  
 TGA-gehalte: 4,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4  
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5  
 Kooktype: vrij vastkokend / AB  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5


[www.agrico.nl/riviera](http://www.agrico.nl/riviera)

# OM TE GROEIEN

## Bemesting<sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 10%.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies.

<sup>1</sup> Level of fertilization is based on soil analysis

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

**Aardappelmoeheid Ro 1/4:** resistent\* / 9\*

**Aardappelmoeheid Ro 2/3:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 2:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 3:** - / -

**Phytophthora loof:** zeer vatbaar / 3

**Phytophthora knol:** vatbaar / 5

**Schurft:** vatbaar / 5,5

**Poederschurft:** zeer vatbaar / 2

**Fusarium:** weinig vatbaar / 6

**Erwinia:** vatbaar / 5

**Zwarte spikkel:** vatbaar / 5,5

**Kringerigheid:** zeer vatbaar / 4

**Virus - Bladrol:** weinig vatbaar / 7

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** weinig tot niet vatbaar / 8

**Virus - Yntn:** weinig vatbaar / 7

**Wratziekte F1 (D1):** resistent / 10

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -

\* Resultaten met een '\*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.