



Spunta.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης

Μεσοόψιμη ποικιλία γενικής χρήσης, καλή προσαρμοστικότητα στις κλιματολογικές συνθήκες.

- » Καλές αποδόσεις, μεγάλοι μακρείς κόνδυλοι
- » Καλή αντοχή στη ζέστη και στις ιώσεις
- » Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: J. Oldenburger

Διασταύρωση: BEA x USDA 96-56

Σπορόφυτο: Oldenburger 57-88

Δικαιώματα Δημιουργού: Έληξαν

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 6,5

Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: γρήγορη / 8

Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μέτριος / 6

Metribuzin (Sencor): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Bentazon: - / -

Αιθυλένιο: - / -

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4

Βάρος εντός νερού: 387

Στερεά ουσία: 21%

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: κάτω του κανονικού / 5,5

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5



agricopotatoes.gr/spunta

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 2

Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2

Περινόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περινόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5,5

Erwinia: ευαίσθητη / 5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Ίωση- Spraing: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση - LRV: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση - A: ελάχιστη έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Ίωση - X: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5

Ίωση - Yn: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

