

Next Generation

Jacky.

Een midden vroeg, fijnvallend consumptieras met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Vrij kruimig
- » Zeer hoog knolaantal
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging

MARKTSEGMENT



Biologisch



Retail

Krielaardappelen



Verwerkende
industrie
Koelvers



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.

Kruising: ANOUK x ATHLETE

Zaailing: SW 09-0557

Kwekersrecht: 31-12-2049

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5

Kiemkleur: groen rood

Bloemkleur: licht paars

Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 6,5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5

Knolgrootte: gemiddeld / 6,5

Knolvorm: rond ovaal

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5

Knolzetting: hoog / 9

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5

Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8

Bentazon: - / -

Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7

Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Rooibeschadiging: weinig tot niet gevoelig / 8

Onderwatergewicht: 368

Drogestofgehalte: 20,1%

Drogestofverdeling: goed / 7

TGA-gehalte: 12,74

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5

Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5

Kooktype: vrij kruimig / B

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/jacky

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Fusarium: vatbaar / 5,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -