

Artemis.

MARKTSEGMENT




Traditioneel

Retail
Vers

Een midden vroeg consumptieras met een goede opbrengst en tevens geschikt voor thuisfrites.

- » Goede bakkwaliteit
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging
- » Brede resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: Rianta x Renska
Zaailing: AR 87-0039
Kwekersrecht: 31-12-2029

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: groen
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groei scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 375
Drogestofgehalte: 20,4%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,9

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/artemis

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: vatbaar / 5,5

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - A: - / -

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -