

2026
2027

varietés.

VARIETIES

OF LIFE

Say potato,
say **Agrico.**



VARIETIES OF LIFE

Le monde dans lequel nous cultivons et commercialisons les pommes de terre est en constante évolution. Le changement climatique, les nouvelles législations et réglementations, ainsi que le besoin croissant d'une production alimentaire plus durable, sont autant de nouveaux défis auxquels est confrontée l'ensemble de la filière de la pomme de terre. Parallèlement, les besoins mondiaux en nourriture saine et abordable, en quantités suffisantes, ne cessent de croître.

Pour Agrico, la réponse à ces évolutions commence par la variété. Parce que chez Agrico, une variété n'est jamais qu'une simple pomme de terre. Chaque variété contribue à une culture résistante, apporte une solution adaptée au marché et, en fin de compte, garantit la sécurité alimentaire d'une population mondiale en pleine croissance. C'est ce que symbolisent les « Varieties of life ».

Aucun marché, aucun climat ni aucune région de culture ne se ressemblent. C'est pourquoi nous développons et proposons un large portefeuille de variétés de pommes de terre, chacune présentant des caractéristiques adaptées à des conditions, des destinations et des besoins spécifiques. Cette diversité nous permet de répondre en permanence aux besoins des producteurs, des clients et des consommateurs, partout dans le monde.

Des variétés naturellement résistantes constituent une part importante de notre gamme. Avec « Stronger by Nature », nous misons sur des variétés innovantes naturellement dotées des atouts nécessaires pour être performantes, aidant ainsi Agrico à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Des intrants réduits, des rendements élevés. C'est ainsi que nous développons des variétés qui contribuent à une agriculture robuste et tournée vers l'avenir.

Nos variétés Next Generation en sont un exemple parfait. Leur résistance naturelle au mildiou réduit le recours aux produits phytosanitaires pendant la culture, tout en offrant une plus grande sécurité aux producteurs comme aux acheteurs. Parallèlement, nous continuons à nous projeter dans l'avenir, en développant de nouvelles générations de variétés encore mieux adaptées à l'évolution des conditions.

Les Varieties of Life vont bien au-delà de la génétique et des caractéristiques des produits. Il s'agit également des connaissances que nous partageons, de notre collaboration avec nos membres, nos producteurs et nos partenaires, ainsi que du réseau international au sein duquel nous opérons. Il s'agit de variétés qui offrent différentes possibilités dans diverses régions du monde, tout en poursuivant partout le même objectif : contribuer à une culture de la pomme de terre pérenne et à la sécurité alimentaire pour les générations à venir.

C'est ainsi que nous continuons, jour après jour, à constituer un portefeuille de variétés adaptées à différents climats, marchés et générations. Des variétés qui font leurs preuves aujourd'hui et contribuent aux solutions de demain. ■



Mark Zuidhof
Directeur général

Contenu.



VARIETIES
OF LIFE



Nouvelles
variétés



Variétés
phares



Nos variétés
2026/2027

2 Avant-propos

4 Varieties of Life

8 Nouvelles variétés 2026

18 Variétés phares

28 Nos variétés

56 Plantules à venir

62 Variétés sous licence

64 Index

70 Légende

74 Termes techniques

79 Autres langues

Clause de non-responsabilité

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu'une information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenus responsables des dommages résultant ou liés aux informations contenues dans ces fiches.

VARIETIES OF LIFE

Différentes cultures



Différentes personnes

Différents marchés

Différents climats

Le monde est un monde de différences auxquelles nos variétés doivent s'adapter. Chacune d'entre elles a une vocation spécifique : répondre aux besoins des personnes qui l'utilisent, du marché auquel elle est destinée et aux conditions dans lesquelles elle est cultivée. De l'utilisation locale au rendement, en passant par la qualité et la fiabilité, chaque variété est développée pour répondre à un besoin spécifique.

Car chez Agrico, nous ne nous contentons pas de développer des variétés de pommes de terre. Nous élaborons des variétés qui démontrent leur valeur là où cela compte vraiment : auprès des personnes qui les cultivent, sur les marchés auxquels elles sont destinées et dans les conditions dans lesquelles elles sont cultivées.

C'est ce que symbolisent les « Varieties of life ».

Depuis plus de 50 ans, notre vision va au-delà de la pomme de terre elle-même. Grâce à la sélection et à la recherche, nous nous efforçons de développer des variétés qui répondent aux besoins d'un monde en constante évolution. Ce travail a conduit à la constitution d'un large portefeuille de variétés adaptées à des conditions de culture, des utilisations et des besoins de marché variés à travers le monde.

Et nous ne nous limitons pas aux besoins actuels. Nos variétés doivent également être prêtes à relever les défis de demain. C'est pourquoi nous continuons à investir dans une génétique solide, dans le savoir-faire et dans la sélection. Stronger by Nature illustre la manière dont nous concrétisons cette ambition : grâce à des variétés naturellement résistantes, qui utilisent efficacement les intrants et offrent des performances fiables dans un large éventail de conditions.

Mais la valeur d'une variété ne réside pas uniquement dans la sélection. Elle se vérifie également dans la pratique. C'est pourquoi nous collaborons à travers le monde, en partageant nos connaissances et en associant l'expérience locale à l'expertise internationale. C'est ainsi que nous travaillons ensemble pour bâtir des chaînes de valeur solides autour de la pomme de terre.

Cela signifie que Varieties of Life prend un sens différent à travers le monde, tout en restant fidèle à une idée commune : développer des variétés qui apportent une valeur ajoutée aux personnes, aux marchés et au monde de demain.

Nous ne nous contentons pas de développer des variétés de pommes de terre. Nous développons des variétés adaptées aux personnes, aux cultures, aux marchés et aux climats.



Nos variétés dépassent le simple cadre de la pomme de terre elle-même. Associées à nos connaissances, à notre expertise et à notre collaboration à l'échelle mondiale, elles contribuent à la sécurité alimentaire, à une agriculture tournée vers l'avenir et à des chaînes de valeur de la pomme de terre solides. C'est ainsi que Varieties of Life se concrétise dans la pratique.



Une agriculture tournée vers l'avenir

Des variétés qui s'adaptent à l'évolution des conditions et contribuent à une culture de la pomme de terre résistante, efficace et durable.



Sécurité alimentaire

Des variétés qui contribuent à une production de pommes de terre fiable et qui permettent de garantir, à l'avenir, un approvisionnement suffisant en nourriture saine et abordable.



Collaboration à l'échelle mondiale

En associant l'expertise internationale aux connaissances et à l'expérience locales, nous développons des variétés adaptées à différents marchés, conditions de culture et utilisations.



Connaissances et développement de la chaîne de valeur

Le partage des connaissances et la collaboration tout au long de la chaîne de valeur permettent à nos variétés de prouver leur valeur dans la pratique, tout en contribuant à des chaînes de valeur de la pomme de terre solides.

PARCE CHEZ AGRICO, UNE VARIÉTÉ N'EST JAMAIS QU'UNE SIMPLE POMME DE TERRE

FELIZ

SW 14-7008

JAMAICA

AR 14-0334

OREGON

AR 14-3578

TEXAS

AR 14-3488

NOUVEAU !

Nouvelles variétés

Nous sommes ravis de vous présenter quatre nouvelles variétés prometteuses qui viennent enrichir notre gamme : Feliz (SW 14-7008), Jamaica (AR 14-0334), Texas (AR 14-3488) et Oregon (AR 14-3578).

Après une longue période d'essais en plein champ et d'évaluation, ces quatre variétés ont obtenu l'autorisation officielle de commercialisation. Grâce à leur inscription au Catalogue national des variétés 2026, Feliz, Jamaica, Oregon et Texas sont désormais prêtes à être commercialisées sous leurs noms distinctifs. ▶▶

Feliz

(SW 14-7008).



Frais
Frais

Une variété de type chair ferme demi-hâtive, avec des tubercules ovales et allongés, type culinaire A, et une forte résistance au virus Y.

- » Belle finition de peau
- » Type culinaire A
- » Bonne résistance au virus Y

Caractéristiques générales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: LORELEY x SW 06-0296
Code de semis: SW 14-7008
Droits d'obteneur: En attente

NOUVELLE!



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la fleur: blanche
Couleur du germe: -
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: élevée / 8
Taille du tubercule: moyen / 6,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: peu à pas sensible / 8

Metribuzin² - pré-émergence: peu sensible / 7,5
Metribuzin² - post-émergence: peu sensible / 7,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantes/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine² peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.



agricopotatoes.fr/feliz



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Découvrez Feliz (SW 14-7008), la pomme de terre idéale pour des salades fraîches et savoureuses. Feliz (SW 14-7008) allie un aspect attrayant à des performances fiables. Ses tubercules oblongs, sa belle peau, son goût exceptionnel et sa cuisson ferme font de Feliz (SW 14-7008) un excellent choix pour les segments des produits frais et des salades dans le commerce de détail. Grâce à sa forte tubérisation et à sa grande résistance au PVY, Feliz offre également aux producteurs une combinaison séduisante de productivité et de fiabilité. Une variété bien équilibrée qui allie une présentation attrayante, une qualité gustative et de solides caractéristiques agronomiques.”

Poids sous eau: 358
Matière sèche: 19,6%
Type de cuisson: ferme / A
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: très sensible / 4
Fritabilité: - / -
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu sensible / 7
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Virus du mop top: très sensible / 4
Mildiou du feuillage: très sensible / 3,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5


Fusariose: - / -
Gale commune: sensible / 5
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -

Galle verruqueuse F1: résistante* / 10*
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: sensible* / 4*
Nématode doré Ro 5: / 3*
Nématode blanc Pa 2: moyennement sensible* / 5*
Nématode blanc Pa 3: sensible* / 3*


* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say **Agrico.**



Jamaica

(AR 14-0334).



Une variété précoce traditionnelle et de vente au détail avec une belle finition de peau et une bonne taille.

- » Bon rendement
- » Belle finition de peau
- » Bonne taille

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: OS 07-0020 x SAVIOLA
Code de semis: AR (14-0334)
Droits d'obteneur: En attente

NOUVELLE!



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5
Couleur de la fleur: blanche
Couleur du germe: -
Nombre de baies: assez élevé / 5
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
Feuillage - tenue: moyenne / 6,5

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: assez sensible / 6

Metribuzin² - pré-émergence: très sensible / 3
Metribuzin² - post-émergence: très sensible / 3
Éthylène: - / -

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé.

Densité de plantation

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantes/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.500 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine², car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.



agricipotatoes.fr/jamaica



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Découvrez Jamaica (AR 14-0334), une variété précoce très séduisante pour le marché du frais. Avec son bon rendement, ses tubercules oblongs et sa belle peau, Jamaica (AR 14-0334) constitue un excellent choix pour les segments du frais et de la grande distribution traditionnelle. Sa forme et sa taille régulières contribuent à une présentation homogène et attrayante, tandis que sa forte résistance au PVY représente un avantage supplémentaire pour les producteurs. Jamaica (AR 14-0334) allie un bon rendement, des tubercules attrayants et des performances fiables. Une variété prometteuse offrant un fort potentiel sur le marché du frais.”

Poids sous eau: 332
Matière sèche: 18,3%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6
Grisaillement: - / -
Fritabilité: - / -
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6

Virus du mop top: peu sensible / 6,5
Mildiou du feuillage: très sensible / 3,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6

Fusariose: - / -
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -

Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: sensible* / 1*
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode doré Ro 5: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say **Agrico.**



Oregon

(AR 14-3578).



Variété demi-hâtive pour une utilisation en chips, avec une bonne uniformité de la forme et de la taille des tubercules et une bonne teneur en matière sèche.

- » Forme et taille régulières
- » Bonne qualité pour les chips, même après un long stockage
- » Peu de défauts de tubercules

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LEANDRA x VR 808
Code de semis: AR 14-3578
Droits d'obteneur: En attente

NOUVELLE!



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5
Couleur de la fleur: mauve pâle
Couleur du germe: -
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule: oblong rond
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: sensible / 5

Metribuzin² - pré-émergence: peu sensible / 7
Metribuzin² - post-émergence: peu sensible / 7,5
Éthylène: - / -

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent.

Densité de plantation

30/40 mm: 26 cm (51.000 plantes/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 plantes/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine² peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

La température de stockage conseillée est de 9 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.



agripotatoes.fr/oregon



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Oregon (AR 14-3578) est une variété fiable pour la production de chips de haute qualité. La forme et la taille uniformes de ses tubercules, sa bonne teneur en matière sèche et sa bonne tolérance aux coups bleus font d'Oregon (AR 14-3578) un choix de premier ordre pour le segment des chips. La variété reste très adaptée à la production de chips même après un stockage de longue durée, offrant ainsi aux transformateurs une flexibilité précieuse tout au long de la saison. Grâce à la qualité constante de ses tubercules et à ses excellentes caractéristiques de transformation, Oregon (AR 14-3578) allie uniformité, aptitude au stockage et performances de production de chips fiables. Une qualité longue durée, avec Oregon (AR 14-3578).”

Poids sous eau: 465
Matière sèche: 24,9%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: sensible / 5
Grisaillement: assez sensible / 6,5
Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche: plutôt irrégulière / 5,5
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): - / -

Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5

Fusariose: - / -
Gale commune: peu sensible / 6,5
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -

Galle verruqueuse F1: très sensible* / 1*
Galle verruqueuse F6: très sensible* / 1*
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode doré Ro 5: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say **Agrico.**



Texas

(AR 14-3488).

Variété demi-hâtive, à haut rendement, destinée à l'industrie de la frite.

- » Rendement élevé
- » Teneur élevée en matière sèche
- » Résistance multiple à la galle verruqueuse

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LEANDRA x AR 07-4113
Code de semis: AR 14-3488
Droits d'obteneur: En attente



Industrie de
transformation
Frites

NOUVELLE!



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la fleur: blanche
Couleur du germe: -
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule: oblong long
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: sensible / 5

Metribuzin² - pré-émergence: peu sensible / 7
Metribuzin² - post-émergence: peu sensible / 7,5
Éthylène: - / -

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantes/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantes/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantes/ha)

Dés herbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine² peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.



agricopotatoes.fr/texas



Roeland Jensma
Product Manager

“Texas (AR 14-3488), une variété à rendement élevé développée pour la production industrielle de frites. Avec sa teneur élevée en matière sèche, sa bonne aptitude à la friture et ses tubercules volumineux et de forme régulière, Texas (AR 14-3488) offre d'excellentes caractéristiques pour la transformation. Associée à une résistance à plusieurs types de maladies verruqueuses, Texas (AR 14-3488) allie rendement, adaptabilité et qualité de transformation. Un choix sûr et polyvalent pour la production de frites.”

Poids sous eau: 427
Matière sèche: 23%
Type de cuisson: farineuse / C
Noircissement après cuisson: sensible / 5,5
Grisaillement: très sensible / 4,5
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: moyenne / 6,5
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu sensible / 6,5
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6

Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: très sensible / 4
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5

Fusariose: - / -
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -

Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: résistante* / 10*
Galle verruqueuse F18: résistante / 10

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode doré Ro 5: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say **Agrico.**





Elles font leurs preuves sur tous les marchés

Chaque année, nous mettons à l'honneur une sélection de variétés d'exception. Ces variétés ont mérité leur place grâce à leurs excellentes performances sur le marché, leur qualité éprouvée et leur capacité à répondre aussi bien aux besoins des producteurs qu'à ceux des clients.

Grâce à notre gamme étendue et diversifiée, le choix ne manque jamais. Cette année, nous mettons en avant quatre variétés qui s'imposent véritablement : deux dans le segment de la transformation, une dans le segment traditionnel et une dans le segment du commerce de détail. Chacune possède ses propres points forts, des performances reconnues et une position bien établie sur le marché. ▶▶

FELIZ

SW 14-7008

NAPOLEON

SIDNEY

PARADISO

Feliz

(SW 14-7008).

Une variété de type chair ferme demi-hâtive, avec des tubercules ovales et allongés, type culinaire A, et une forte résistance au virus Y.

- » Belle finition de peau
- » Type culinaire A
- » Bonne résistance au virus Y

Caractéristiques générales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: LORELEY x SW 06-0296
Code de semis: SW 14-7008
Droits d'obteneur: En attente

NOUVELLE!



Frais
Frais



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantes/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine² peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



agricipotatoes.fr/feliz

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la fleur: blanche
Couleur du germe: -
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: élevée / 8
Taille du tubercule: moyen / 6,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: peu à pas sensible / 8

Metribuzin² - pré-émergence: peu sensible / 7,5
Metribuzin² - post-émergence: peu sensible / 7,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau: 358
Matière sèche: 19,6%
Type de cuisson: ferme / A
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: très sensible / 4
Fritabilité: - / -
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu sensible / 7
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Virus du mop top: très sensible / 4
Mildiou du feuillage: très sensible / 3,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5


Fusariose: - / -
Gale commune: sensible / 5
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -

Galle verruqueuse F1: résistante* / 10*
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: sensible* / 4*
Nématode doré Ro 5: sensible* / 3*
Nématode blanc Pa 2: moyennement sensible* / 5*
Nématode blanc Pa 3: sensible* / 3*

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say Agrico.



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Découvrez Feliz (SW 14-7008), la pomme de terre idéale pour des salades fraîches et savoureuses. Feliz (SW 14-7008) allie un aspect attrayant à des performances fiables. Ses tubercules oblongs, sa belle peau, son goût exceptionnel et sa cuisson ferme font de Feliz (SW 14-7008) un excellent choix pour les segments des produits frais et des salades dans le commerce de détail. Grâce à sa forte tubérisation et à sa grande résistance au PVY, Feliz offre également aux producteurs une combinaison séduisante de productivité et de fiabilité. Une variété bien équilibrée qui allie une présentation attrayante, une qualité gustative et de solides caractéristiques agronomiques.”

Paradiso.



Une pomme de terre précoce de conservation, aux gros tubercules et à l'excellent rendement, destinée à la vente au détail.

- » Gros tubercules
- » Bel aspect
- » Bonne tolérance à la chaleur et à la sécheresse

Caractéristiques générales

Obtenteur: M. Pot & M. Klaver
Croisement: RODEO x VALOR
Code de semis: PK 06-0108
Droits d'obteneur: 31-12-2048



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la fleur: violette
Couleur du germe: rouge
Nombre de baies: assez faible / 6,5
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: peu sensible / 7
Coups bleus: peu sensible / 7,5
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: assez sensible / 6,5

Metribuzin² - pré-émergence: peu à pas sensible / 8
Metribuzin² - post-émergence: assez sensible / 6,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Poids sous eau: 329
Matière sèche: 18,2%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: - / -
Fritabilité: mauvaise / 4,5
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 4
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,8 mg/100g

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu sensible / 6
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7,5

Virus du mop top: très sensible / 4
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5

Fusariose: sensible / 5
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: peu sensible / 7,5
Dartrose: sensible / 5,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard - 10%.
Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm : 23 cm (58.000 plantes/ha)
35/55 mm : 35 cm (38.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine² ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.

agricopotatoes.fr/paradiso

Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode doré Ro 5: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say Agrico.



Douwe Werkman
Product Manager

“Paradiso est le mélange idéal de caractéristiques, car elle donne des rendements impressionnants avec un nombre élevé de tubercules, et d'une grande régularité. La variété Paradiso donne des plantes fortes et constitue donc un choix sûr et fiable, même dans les régions chaudes. Paradiso est la garantie de réussir votre récolte chaque année, d'obtenir des rendements constants et de belles pommes de terre. Devenez-vous aussi un client satisfait et avec Paradiso, offrez-vous une sécurité de production et une grande qualité. La certitude de récolter, avec Paradiso !”

Sidney.




Industrie de
transformation
Frites

Demi-précoce à la chair jaune pâle, variété convenant à une utilisation en frites industrielles.

- » Tubercules de gros calibres
- » Bonne résistance aux virus
- » Bonne répartition de la matière sèche et adaptée au QSR

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LADY ANNA x AR 05-3392
Code de semis: AR 12-1680
Droits d'obteneur: 31-12-2054



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la fleur: blanche
Couleur du germe: -
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune pâle / 5
Finition de la peau: assez terne / 5
Forme du tubercule: oblong long
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu sensible / 7,5
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: peu sensible / 7

Metribuzin² - pré-émergence: assez sensible / 6,5
Metribuzin² - post-émergence: assez sensible / 6,5
Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau: 396
Matière sèche: 21,5%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: peu sensible / 7,5
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: excellente / 8,5
Chipabilité: /
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,3 mg/100g

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7,5

Virus du mop top: peu à pas sensible / 8
Mildiou du feuillage: /
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8

Fusariose: peu sensible / 6
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: peu sensible / 6
Dartrose: sensible / 5,5

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm: 26 cm (51.000 plantes/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantes/ha)
50/55 mm: 37 cm (36.000 plantes/ha)
50/60 mm: 34 cm (39.000 plantes/ha)³

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine², car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.

³ Lorsque la coupe est autorisée pour la production de pommes de terre, une cicatrisation adéquate et des mesures d'hygiène strictes sont essentielles pour minimiser les risques de maladies. Toute opération de coupe et l'utilisation ultérieure des plants de pommes de terre s'effectuent aux risques de l'utilisateur.



agripotatoes.fr/sidney

Galle verruqueuse F1: très sensible* / 1*
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: sensible / 4
Nématode doré Ro 5: sensible* / 4*
Nématode blanc Pa 2: assez résistante / 8
Nématode blanc Pa 3: moyennement sensible / 6

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say Agrico.



Roeland Jensma
Product Manager

“Sidney, faite pour la friture ! Avec ses gros tubercules oblongs, son excellente répartition de la matière sèche, sa chair de couleur crème et son aptitude à la friture supérieure à la moyenne, Sidney est un choix idéal pour la restauration rapide. Cette variété de conservation précoce allie de précieuses caractéristiques de transformation à une bonne résistance aux virus et au nématode PCN, offrant ainsi aux producteurs une récolte fiable et aux transformateurs la qualité qu'ils recherchent. Mise sur la qualité avec Sidney !”

Napoleon.



Variété de conservation destinée à la transformation en chips, aux calibres homogènes à la teneur en matière sèche élevée.

- » Bonne aptitude à la transformation en chips
- » Convient à la transformation en flocons
- » Bonne résistance aux virus

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: ANTINA x ALICANTE
Code de semis: AR 10-4637
Droits d'obteneur: 31-12-2051



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5
Couleur de la fleur: blanche
Couleur du germe: rouge violet
Nombre de baies: très élevé / 4
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau: jaune
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: assez terne / 5
Forme du tubercule: oblong rond
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: sensible / 5,5
Crevasses: assez sensible / 6
Endommagement à la récolte: très sensible / 4,5

Metribuzin² - pré-émergence: peu sensible / 7
Metribuzin² - post-émergence: peu sensible / 7
Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau: 450
Matière sèche: 24,1%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6
Grisaillement: assez sensible / 6
Fritabilité: / 7
Répartition de la matière sèche: bonne / 7
Chipabilité: excellente / 8
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,0 mg/100g

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: peu sensible / 6
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5

Fusariose: peu sensible / 6,5
Gale commune: peu sensible / 6
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: peu sensible / 6

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Fertilisation¹

Azote: conseil standard - 10%.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

30/40 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)
40/50 mm: 33 cm (40.000 plantes/ha)
50/60 mm: 38 cm (35.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine² ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Stockage

Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 9 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.



agricopotatoes.fr/napoleon

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

² Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.

Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode doré Ro 5: - / -
Nématode blanc Pa 2: sensible / 4
Nématode blanc Pa 3: sensible / 2

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

Say potato,
say Agrico.



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Voici Napoleon, la variété de pomme de terre idéale pour des chips de haute qualité ! Avec sa bonne qualité de cuisson, une répartition uniforme de la matière sèche et un minimum de défauts de sucre, Napoléon offre systématiquement un excellent produit final. La variété donne de bons rendements et un calibre très régulier, idéal pour le segment des chips. Son excellente résistance aux virus et son adaptation à diverses conditions de culture font de Napoleon une variété très robuste. Choisir Napoléon, c'est choisir la qualité et la fiabilité.”

Nos variétés 2026/2027

Un aperçu complet de notre gamme

Ce catalogue rassemble les principales variétés de notre large gamme diversifiée, présentées par ordre alphabétique pour en faciliter la consultation. Chaque variété est identifiée par une icône à code couleur, ce qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil à quel segment de marché elle est la mieux adaptée : **traditionnel, commerce de détail ou transformation.**

Outre nos variétés sous licence, le catalogue présente également une sélection de variétés non brevetées qui restent très prisées et appréciées par nos clients. ▶▶



Biologique



Tradit



Agrico Originals



Frais
Frais, grenailles,
salade, spécialité




Industrie
Fécule, chips, flocons,
frites, 4ème gamme



Next Generation
Résistance naturelle au
mildiou

Agata.



Une variété primeur de consommation courante plébiscitée pour sa qualité de peau et son niveau de rendement.

- ▶ Bonne capacité de stockage
- ▶ Bonne résistance aux virus
- ▶ Très peu sensible aux endommagements à la récolte



Caractéristiques principales


Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: BM 72-0052 x SIRCO
Maturité: très hâtive / 8
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: excellente / 8
Tubérisation: élevée / 8
Dormance: courte / 4

Poids sous eau: 316
Matière sèche: 17,6%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/agata

Alouette.



Variété de conservation précoce, polyvalente, à peau rouge, résistante au mildiou du feuillage et des tubercules, adaptée à la production conventionnelle et biologique.

- ▶ Bonne tolérance aux endommagements mécaniques
- ▶ Nombreuses utilisations en cuisine et préparations maison
- ▶ Résistante au mildiou



Caractéristiques principales


Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 02-139-1 x LAURA
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune / 7,5
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6
Poids sous eau: 389

Matière sèche: 21,1%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: assez résistante / 8
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10




agricopotatoes.fr/alouette

Agria.



Variété de conservation à chair jaune, à la qualité très stable et au bon rendement, destinée à la transformation.

- ▶ Excellente qualité de friture
- ▶ Résistances à de multiples virus
- ▶ Bonne capacité de stockage



Caractéristiques principales

Obtenteur: Böhm
Croisement: QUARTA x SEMLO
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: assez faible / 5
Dormance: longue / 8
Poids sous eau: 402
Matière sèche: 21,8%

Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: excellente / 8
Chipabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7
Galle verruqueuse F1: assez résistante / 9
Galle verruqueuse F6: assez sensible / 6



agricopotatoes.fr/agria

Arizona.



Une variété primeur de consommation, à l'excellent rendement sous divers climats.

- ▶ Tubercules de forme et calibre très homogènes
- ▶ Bonne tolérance à la sécheresse
- ▶ Résistances à de multiples virus



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 301
Matière sèche: 17%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez sensible / 6



agricopotatoes.fr/arizona

Armedi.



Industrie de transformation
Frites

Variété de conservation précoce, adaptée à la fabrication de frites.

- ▶ Tubérisation élevée
- ▶ Adaptée au stockage à long terme
- ▶ Résistances multiples aux nématodes à kyste de la pomme de terre



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: TOPAS x BASIN RUSSET
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: moyenne / 6,5
Dormance: moyenne / 6,5
Poids sous eau: 402
Matière sèche: 21,8%

Type de cuisson: farineuse / C
Fritabilité: excellente / 8
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: assez résistante / 7
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7,5
Nématode blanc Pa 2: résistante / 9
Nématode blanc Pa 3: assez résistante / 8
Galle verruqueuse F1: assez résistante / 9



agricopotatoes.fr/armedi

Artemis.



Variété primeur de consommation offrant un excellent rendement et idéale pour les frites maison.

- ▶ Excellente qualité de friture
- ▶ Très peu sensible aux endommagements à la récolte
- ▶ Résistances multiples



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: RIANITA x RENSKA
Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5,5

Poids sous eau: 375
Matière sèche: 20,4%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: moyenne / 6
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/artemis

Arsenal.



Industrie de transformation
Chips, flocon

Variété de conservation précoce, possédant une excellente résistance aux nématodes à kystes de la pomme de terre et offrant un bon rendement.

- ▶ Résistances multiples
- ▶ Convient à la fabrication de chips et flocons
- ▶ Forte teneur en matière sèche



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 92-1146 x SILVESTER
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez terne / 5
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5
Poids sous eau: 447
Matière sèche: 24%

Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Chipabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: assez résistante / 8
Nématode doré Ro 5: moyennement sensible / 6
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Nématode blanc Pa 2: résistante / 9
Nématode blanc Pa 3: assez résistante / 8
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/arsenal

Babylon.



Variété de conservation à chair jaune, grande régularité de qualité et bon rendement, destinée à la transformation.

- ▶ Excellente qualité de friture
- ▶ Résistances à de multiples virus
- ▶ Bonne capacité de stockage



Caractéristiques principales


Obtenteur: R.K. Bakker
Croisement: AGRIA MUTANT
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: longue / 8
Poids sous eau: 401

Matière sèche: 21,7%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: excellente / 8
Chipabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: assez résistante / 8
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/babylon

Beyonce.



Variété de conservation précoce à forte teneur en matière sèche, adaptée à la transformation en chips, adaptée à un stockage à moyen terme et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- » Gros tubercules
- » Teneur en matière sèche précoce
- » Excellente qualité des chips

Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 94-2061 x LADY JO
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Tubérisation: moyenne / 6

Dormance: assez longue / 7
Poids sous eau: 446
Matière sèche: 23,9%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Chipabilité: excellente / 8
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 8,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7,5



agricopotatoes.fr/beyonce

Chester.

(AR 13-2694)



Variété chipable demi-hâtive résistante au Globodera pallida, aux tubercules homogènes, avec une bonne matière sèche et une bonne tolérance aux coups bleus.

- » Haut rendement et bonne tubérisation
- » Bonne qualité de friture, même après une longue période de stockage
- » Teneur en matière sèche précoce

Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 07-4052 x ALICANTE
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Tubérisation: moyenne / 6,5
Dormance: assez courte / 5

Poids sous eau: 446
Matière sèche: 24%
Type de cuisson: farineuse / C
Chipabilité: très bonne / 7,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Nématode blanc Pa 2: assez résistante / 8
Nématode blanc Pa 3: assez résistante / 8
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/chester

Carolus.



Variété de conservation précoce, de consommation, polyvalente et caractérisée par de jolis yeux rouges et une résistance au mildiou du feuillage et des tubercules.

- » Grande polyvalence
- » Forte teneur en matière sèche
- » Cuisson assez farineuse

Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AGRIA x AR 00-94-17
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: lisse / 6
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6,5
Poids sous eau: 398

Matière sèche: 21,6%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: bonne / 7
Chipabilité: bonne / 7
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/carolus

Constance.



Variété primeur de consommation, à la peau jaune vif et à la chair jaune clair.

- » Bel aspect
- » Tubercules de taille très uniforme
- » Cuisson assez ferme

Caractéristiques principales


Obtenteur: J.L. Spijman
Croisement: MARABEL x AR 93-1243
Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: excellente / 8

Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6,5
Poids sous eau: 358
Matière sèche: 19,7%
Type de cuisson: assez ferme / AB



agricopotatoes.fr/constance

Corazon.



Variété primeur de consommation à peau rouge et au bon rendement précoce.

- ▶ Peau d'excellente qualité
- ▶ Cuisson assez ferme
- ▶ Bonne tubérisation



Caractéristiques principales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: EVOLUTION x MANITOU
Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5,5
Poids sous eau: 321

Matière sèche: 17,8%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9
Nématode doré Ro 5: assez résistante / 8
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez résistante / 9



agricopotatoes.fr/corazon

Erika.



Variété précoce pour salade, ferme à la cuisson, avec une bonne résistance à la tavelure.

- ▶ Bel aspect
- ▶ Tubérisation élevée
- ▶ Bonnes résistances au virus Y



Caractéristiques principales

Obtenteur: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Croisement: MARABEL x AR 88-0156
Maturité: hâtive / 7,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: excellente / 8

Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: moyenne / 6,5
Poids sous eau: 337
Matière sèche: 18,6%
Type de cuisson: ferme / A
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9



agricopotatoes.fr/erika

Diamant.



Variété précoce de conservation, caractérisée par une bonne tolérance à la chaleur et un bon rendement, et adaptée aux frites maison.

- ▶ Excellente qualité de friture
- ▶ Bonne résistance aux virus
- ▶ Convient pour une deuxième récolte



Caractéristiques principales

Obtenteur: Precardi
Croisement: CARDINAL MUTANT
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5
Poids sous eau: 420

Matière sèche: 23%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu sensible / 6
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez sensible / 6



agricopotatoes.fr/diamant

Esmee.



Variété primeur de consommation avec une belle peau rouge, une bonne tolérance à la chaleur et un bon rendement.

- ▶ Bel aspect
- ▶ Gros tubercules
- ▶ Résistance à de multiples virus



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LAURA x RODEO
Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: excellente / 8
Tubérisation: moyenne / 6

Dormance: moyenne / 6
Poids sous eau: 326
Matière sèche: 18%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/esmee

Evolution.




Une pomme de terre primeur de consommation avec une belle peau rouge foncé, et au rendement élevé.

- » Gros tubercules
- » Bonne tolérance à la sécheresse
- » Résistances multiples aux nématodes à kyste de la pomme de terre

Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 94-0807 x AMOROSA
Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: courte / 4
Poids sous eau: 343

Matière sèche: 18,9%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: moyennement sensible / 6
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Nématode blanc Pa 2: assez résistante / 7
Galle verruqueuse F1: peu sensible / 8
Galle verruqueuse F6: résistante / 10



agripotatoes.fr/evolution

Fajah.



Variété de consommation précoce et rustique, gros tubercules avec un taux de matière sèche assez élevée.

- » Gros tubercules et rendement élevé
- » Tubercules oblongs courts de calibre homogène
- » Dormance courte, deuxième culture possible

Caractéristiques principales

Obtenteur: R. Rispens
Croisement: LANORMA x AMBITION
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 354
Matière sèche: 19,4%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5



agripotatoes.fr/fajah

Feliz (SW 14-7008).



Retail
Salads

Un look superbe, des performances exceptionnelles !

Le pouvoir de l'innovation

Une variété de type chair ferme demi-hâtive, avec des tubercules ovales et allongés, type culinaire A, et une forte résistance au virus Y



NOUVEAU !

- » Belle finition de peau
- » Type culinaire A
- » Bonne résistance au virus Y

Toutes les informations et les données techniques de la variété de projecteurs sont disponibles à la **page 10 and 20** ou en scannant le code QR.



agripotatoes.fr/feliz

Fontane.



Industrie de transformation
Frites, chips, flocon



agricopotatoes.fr/fontane

Variété de conservation précoce, très productive, pour la production de frites et de flocons.


- » Gros tubercules
- » Forte teneur en matière sèche
- » Convient à divers types de sol

Caractéristiques principales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: AGRIA x AR 76-034-03
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: assez terne / 5
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5,5
Poids sous eau: 430

Matière sèche: 23,2%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: excellente / 8
Chipabilité: moyenne / 6
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5
Galle verruqueuse F1: assez sensible / 6
Galle verruqueuse F6: peu sensible / 8

Jolene.



Variété de conservation précoce, avec une belle peau et bonne aptitude au stockage.

- » Adaptée aux frites maison
- » Forme de tubercule uniforme
- » Bonne teneur en matière sèche

Caractéristiques principales


Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: SAGITTA x AR 03-1491
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez élevée / 7

Dormance: moyenne / 6
Poids sous eau: 389
Matière sèche: 21,1%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: bonne / 7



agricopotatoes.fr/jolene

Jacky.



agricopotatoes.fr/jacky

Variété primeur de petit calibre, avec un rendement élevé et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.


- » Cuisson assez farineuse
- » Tubérisation élevée
- » Très peu sensible aux endommagements à la récolte

Caractéristiques principales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: ANOUK x ATHLETE
Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Tubérisation: élevée / 9
Dormance: assez courte / 5,5

Poids sous eau: 368
Matière sèche: 20,1%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9

Kuroda.



Une pomme de terre précoce de conservation, à la peau rouge, extrêmement tolérante à la chaleur, et au rendement très élevé.

- » Gros tubercules
- » Bonne aptitude au stockage
- » Résistances multiples aux gales

Caractéristiques principales

Obtenteur: G. Kuik
Croisement: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez faible / 5
Dormance: longue / 8

Poids sous eau: 426
Matière sèche: 23%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: assez mauvaise / 5,5
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez résistante / 9



agricopotatoes.fr/kuroda

Leonore.



Variété industrielle précoce faisant un bon rendement.

- ▶ Peau de bonne qualité
- ▶ Bonne résistance aux virus
- ▶ Tubercules oblongs longs



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: EXCELLENCY x AR 06-3754
Maturité: hâtive / 7,5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: moyenne / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 397
Matière sèche: 21,5%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/leonore

Lugano.



Variété précoce de conservation, destinée à la transformation, à chair jaune, avec de bonnes résistances aux nématodes à kyste de la pomme de terre et à la galle verruqueuse.

- ▶ Gros tubercules
- ▶ Résistances multiples
- ▶ Bonne aptitude au stockage



Caractéristiques principales

Obtenteur: F.J. Vos
Croisement: AR 00-2211 x AR 99-0669
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: assez faible / 5
Dormance: longue / 8
Poids sous eau: 394
Matière sèche: 21,4%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B

Fritabilité: excellente / 8
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9
Nématode doré Ro 5: résistante / 9
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Nématode blanc Pa 2: résistante / 9
Nématode blanc Pa 3: résistante / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez résistante / 9



agricopotatoes.fr/lugano

Levante.



Variété de conservation précoce, à haut rendement, présentant une belle peau jaune et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- ▶ Tubérisation élevée
- ▶ Belle peau
- ▶ Bonne aptitude au stockage



Caractéristiques principales


Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 01-3218 x ALMERA
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: élevée / 8
Dormance: moyenne / 6,5
Poids sous eau: 365

Matière sèche: 19,9%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: assez mauvaise / 5,5
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 8,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7,5



agricopotatoes.fr/levante

Manitou.



Variété de conservation, de consommation, à peau rouge, offrant un rendement élevé.

- ▶ Gros tubercules
- ▶ Bonne tolérance à la sécheresse
- ▶ Tubercules de taille très uniforme



Caractéristiques principales

Obtenteur: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Croisement: LAURA x MARANCA
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5,5
Poids sous eau: 351

Matière sèche: 19,4%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: assez mauvaise / 5,5
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9
Nématode doré Ro 5: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/manitou

Markies.

Variété de conservation polyvalente à haut rendement pour le marché de la transformation.

- ▶ Excellente qualité de friture
- ▶ Bonne teneur en matière sèche
- ▶ Adaptée au stockage à long terme

Caractéristiques principales

Obtenteur: Dr. R.J. Mansholt's
Veredelingsbedrijf B.V.

Croisement: FIANNA x AGRIA

Maturité: tardive / 4

Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5

Finition de la peau: lisse / 7

Tubérisation: moyenne / 6

Dormance: moyenne / 6,5

Poids sous eau: 427

Matière sèche: 22,8%

Type de cuisson: plutôt farineuse / BC

Fritabilité: excellente / 8

Chipabilité: bonne / 7

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Mildiou du feuillage: peu sensible / 6,5

Mildiou du tubercule: peu sensible / 7



agricopotatoes.fr/markies

Melrose.

Variété demi-précoce, polyvalente au goût prononcé.

- ▶ Plutôt à chair farineuse
- ▶ Couleur de chair jaune
- ▶ Couleur de peau rouge clair

Caractéristiques principales

Obtenteur: C.R.A.

Croisement: BP 15.7.70 x AM 15.1.68

Maturité: demi-tardive / 6

Couleur de la chair: jaune / 7

Finition de la peau: assez lisse / 6,5

Tubérisation: élevée / 8

Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 406

Matière sèche: 22%

Type de cuisson: légèrement farineuse / B

Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5

Galle verruqueuse F1: peu sensible / 7



agricopotatoes.fr/melrose

**NOW
PLAYING**

NAPOLEON
the rise of crunch

"When the heat is on, one variety stands out"

HIGH
DRY MATTER

CONSISTENT
YIELDS

EXCEPTIONAL
STORABILITY

PROVEN
ROBUSTNESS

PERFECT
CRISPING QUALITY

A CRISPY PRODUCTION BY

Meryem.



Une variété de consommation et de conservation à haut rendement à la belle peau rouge.

- ▶ Tubérisation élevée
- ▶ Bonne résistance aux virus
- ▶ Bonne tolérance à la sécheresse



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LUSA x AR 01-0420
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: très lisse / 7,5
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: courte / 4

Poids sous eau: 349
Matière sèche: 19,2%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez résistante / 9



agricopotatoes.fr/meryem

Picasso.



Une variété de conservation et de consommation, à la peau jaune et aux gros yeux rouges, résistante à la gale commune et adaptée à un stockage à long terme.

- ▶ Rendement élevé
- ▶ Bonne tolérance à la sécheresse
- ▶ Très peu sensible aux endommagements à la récolte.



Caractéristiques principales

Obtenteur: Duoplant V.O.F.
Croisement: CARA x AUSONIA
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: longue / 8

Poids sous eau: 381
Matière sèche: 20,8%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: mauvaise / 5
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/picasso


Paradiso.



La pomme de terre idéale :
résistante, fiable et
productive !

Le pouvoir de l'innovation

Une pomme de terre précoce de conservation, aux gros tubercules et à l'excellent rendement, destinée à la vente au détail.



- ▶ Gros tubercules
- ▶ Bel aspect
- ▶ Bonne tolérance à la chaleur et à la sécheresse

Toutes les informations et les données techniques de la variété de projecteurs sont disponibles à la **page 22** ou en scannant le code QR.



agricopotatoes.fr/paradiso

Premiere.



Une pomme de terre nouvelle destinée à l'industrie de la frite, avec un bon rendement précoce.

- » Récolte précoce
- » Forte teneur en matière sèche
- » Bonne répartition de la matière sèche



Caractéristiques principales

Obtenteur: Precardi
Croisement: CIVA x PROVITA
Maturité: très hâtive / 8
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: assez courte / 5

Poids sous eau: 416
Matière sèche: 22,4%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/premiere

Riviera.



Variété primeur de consommation à la belle peau, avec une bonne tolérance à la chaleur, une bonne résistance aux virus et un bon rendement précoce.

- » Gros tubercules
- » Bel aspect
- » Bonne résistance aux virus



Caractéristiques principales

Obtenteur: Mts. Boerhave
Croisement: MINERVA x ALCMARIA
Maturité: très hâtive / 8
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: excellente / 8
Tubérisation: assez faible / 5

Dormance: moyenne / 6
Poids sous eau: 318
Matière sèche: 17,7%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/riviera

Ranomi.



Variété précoce de consommation avec une relativement bonne résistance à la tavelure commune et un bon rendement précoce.

- » Jolie peau
- » Gros tubercules
- » Cuisson assez ferme



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Maturité: hâtive / 7,5
Couleur de la chair: jaune berre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 322
Matière sèche: 17,9%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.com/ranomi

Rudolph.



Une pomme de terre précoce de conservation à la belle peau rouge, caractérisée par une bonne tolérance à la chaleur et un très bon rendement.

- » Chair blanche
- » Gros tubercules
- » Bonne aptitude au stockage



Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: CHIEFTAIN x STIRLING
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: blanche / 4
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez faible / 5
Dormance: assez longue / 7
Poids sous eau: 376

Matière sèche: 20,5%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: peu sensible / 8



agricopotatoes.fr/rudolph

Sevas.

(KO 13-2242)



Consommation

Variété hâtive de conservation avec de larges tubercules ovales, une bonne dormance et une bonne tolérance aux coups bleus.

- ▶ Rendement élevé
- ▶ Bonne résistance aux virus et à la gale commune
- ▶ Belle qualité de peau



Caractéristiques principales

Obtenteur: Konst Research B.V.
Croisement: KO 06-1457 x SAVANNA
Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Tubérisation: assez faible / 5,5
Dormance: assez longue / 7,5
Poids sous eau: 350

Matière sèche: 19,2%
Type de cuisson: ferme / A
Fritabilité: moyenne / 6
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/sevas

Sevilla.



Biologique



Industrie de transformation
Frites, chips

Variété demi-tardive avec un bon niveau de matière sèche, un goût délicieux et résistant au mildiou du feuillage.

- ▶ Résistante au mildiou
- ▶ Faibles besoins en azote
- ▶ Bonne résistance aux stress hydriques



Caractéristiques principales

Obtenteur: N. Vos
Croisement: AGRIA x DOB 1997-507-015
Maturité: tardive / 4,5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Tubérisation: assez élevée / 7

Dormance: longue / 8
Poids sous eau: 385
Matière sèche: 21%
Type de cuisson: farineuse / C
Fritabilité: très bonne / 7,5
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9



agricopotatoes.fr/sevilla

NOW
PLAYING

Industrie de
transformation
Frites

SIDNEY

Born to be fried

"In a world where the entire industry demands perfection, one variety becomes a legend"

HIGH
YIELD

UNIFORM
TUBERS

OUTSTANDING
RESISTANCES

PERFECT
FRYING QUALITY

BIG SIZED
TUBERS

A MASTERPIECE
CREATED BY



Sinora.



Variété primeur, à haut rendement et facile à cultiver pour une récolte précoce destinée au secteur des frites ou chips.

- » Récolte précoce
- » Forte teneur en matière sèche
- » Bonne résistance aux virus



Caractéristiques principales

Obtenteur: J. Schilt
Croisement: AGRIA x AM 70-2166
Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: assez élevée / 7
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 416
Matière sèche: 22,6%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: excellente / 8
Chipabilité: bonne / 7
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9



agricopotatoes.fr/sinora

Twinner.



Variété de consommation précoce, adaptée à la culture conventionnelle et biologique, résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- » Gros tubercules
- » Bel aspect
- » Cuisson assez ferme



Caractéristiques principales

Obtenteur: G.W. te Winkel
Croisement: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Maturité: hâtive / 7,5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: assez faible / 5
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 359
Matière sèche: 19,7%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 8
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/twinner

Spunta.



Une pomme de terre de consommation précoce, de conservation et offrant des rendements élevés.

- » Gros tubercules
- » Tubercules de taille très uniforme
- » Forte teneur en matière sèche



Caractéristiques principales

Obtenteur: J. Oldenburger
Croisement: BEA x USDA 96-56
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: moyenne / 6
Dormance: moyenne / 6

Poids sous eau: 387
Matière sèche: 21%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Fritabilité: moyenne / 6
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



agricopotatoes.fr/spunta

Twister.



Variété primeur de consommation adaptée à la culture conventionnelle et biologique, avec un bon rendement et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- » Bel aspect
- » Bonne aptitude au stockage
- » Cuisson assez ferme



Caractéristiques principales

Obtenteur: G.W. te Winkel
Croisement: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: moyenne / 6,5
Dormance: assez longue / 7

Poids sous eau: 345
Matière sèche: 19%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9
Galle verruqueuse F1: peu sensible / 8



agricopotatoes.fr/twister



Consommation

- 

Poids sous eau: 311
Matière sèche: 17,3%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: assez résistante / 9



agricopotatoes.fr/vogue

Remarques.

Un aperçu de l'avenir de la culture de la pomme de terre

Nous sommes ravis de vous offrir un avant-goût d'une nouvelle génération de variétés de pommes de terre prometteuses. Actuellement en phase finale d'essais, ces variétés ne sont pas encore disponibles à la vente, mais elles révèlent déjà un formidable potentiel pour l'avenir.

Considérez ceci comme un aperçu exclusif des prochaines évolutions de la culture de la pomme de terre, avec des variétés prometteuses qui pourraient bientôt s'imposer sur le marché. ▶▶

AR 16-0165.



Une variété de pomme de terre de conservation à la peau très attrayante, présentant une bonne tolérance à la chaleur, une large résistance aux nématodes à kystes et un rendement élevé

- ▶ Gros tubercules oblongs uniformes
- ▶ Une chair farineuse, idéale pour des frites ménagères
- ▶ Une plante robuste dotée d'un bon système racinaire et d'une forte résistance au PVY

Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 07-3009 x AR 08-3398
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Tubérisation: - / -
Dormance: moyenne / 6
Poids sous eau: 367

Matière sèche: 20,1%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Nématode doré Ro 1/4: résistante* / 9*
Nématode doré Ro 2/3: résistante* / 9*
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Nématode blanc Pa 2: résistante* / 9*
Nématode blanc Pa 3: résistante* / 9*



* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

CR 13-3717.



Une variété de début de saison principale avec de gros tubercules adaptés au marché de la transformation.

- ▶ Variété Next Generation+
- ▶ Excellent rendement
- ▶ Bonne tolérance à la gale

Caractéristiques principales

Obtenteur: Mts. Crijns-Hop
Croisement: AR 07-3626 x AR 05-3409
Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: assez terne / 5
Tubérisation: - / -
Dormance: moyenne / 6,5

Poids sous eau: 377
Matière sèche: 20,5%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Fritabilité: excellente / 8
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8,5



+ Les variétés marquées de ce symbole sont des variétés de nouvelle génération avec des gènes de résistance empilés.

AR 16-1404.



Une variété de transformation demi-hâtive avec une bonne taille, tubercules de taille et de forme régulières.

- ▶ Bonne résistance naturelle au mildiou du feuillage
- ▶ Résistant au virus Y
- ▶ Bon nombre de tubercules

Caractéristiques principales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 10-4512 x JOLENE
Maturité: demi-hâtive / 6,5
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: moyenne / 6
Tubérisation: - / -
Dormance: assez courte / 5

Poids sous eau: 388
Matière sèche: 21,1%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Fritabilité: excellente / 8
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Galle verruqueuse F1: assez résistante / 9



PL 17-0210.



Variété de conservation féculière avec multiples résistances aux nématodes et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- ▶ Rendement élevé
- ▶ Forte teneur en matière sèche
- ▶ Résistante au mildiou

Caractéristiques principales

Obtenteur: AKV Langholt
Croisement: AVENANCE x PL 08-4010
Maturité: tardive / 5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: terne / 4,5
Tubérisation: moyenne / 6,5
Dormance: assez courte / 5,5
Poids sous eau: 517

Matière sèche: 27,4%
Type de cuisson: très farineuse / CD
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8
Nématode blanc Pa 3: moyennement sensible / 6



SW 15-6459.



Une variété de vente au détail de seconde précocité, avec des tubercules ovales et une belle finition de peau.

- ▶ Adaptée au marché grenaille industrie
- ▶ Nombre élevé de tubercules par plante
- ▶ Chair plutôt ferme à la cuisson

Caractéristiques principales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: REGINA x SA 06-0104
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: assez terne / 5
Tubérisation: - / -
Dormance: assez courte / 5

Poids sous eau: 389
Matière sèche: 21,1%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Nématode doré Ro 1/4: assez résistante / 7
Nématode doré Ro 2/3: assez résistante / 7
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7,5
Galle verruqueuse F1: résistante* / 10*



* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

TW 17-1410.



Variété à peau rouge, de maturité intermédiaire précoce, résistante naturellement au mildiou du feuillage et du tubercule, adaptée aux cultures conventionnelles et bio.

- ▶ Rendement élevé
- ▶ Bonne résistance aux virus
- ▶ Belle couleur de peau

Caractéristiques principales

Obtenteur: G.W. te Winkel
Croisement: ALOUETTE x AR 09-4077
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: - / -
Dormance: assez courte / 5

Poids sous eau: 369
Matière sèche: 19,9%
Type de cuisson: ferme / A
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9
Galle verruqueuse F1: résistante / 10



+ Les variétés marquées de ce symbole sont des variétés de nouvelle génération avec des gènes de résistance empilés.

SW 16-8008.



Une variété de pomme de terre à peau à haut rendement, de précocité moyenne, résistante au mildiou, offrant ainsi de nombreuses opportunités sur le marché du frais

- ▶ Potentiel de rendement très élevé avec des performances régulières
- ▶ Bel aspect de peau, bonne uniformité de calibre et bonne tubérisation
- ▶ Variété de nouvelle génération dotée d'un bon profil de résistances

Caractéristiques principales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: AR 09-5135 x AR 08-3159
Maturité: demi-tardive / 6
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Tubérisation: - / -
Dormance: assez courte / 5

Poids sous eau: 344
Matière sèche: 18,9%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Nématode blanc Pa 2: résistante* / 9*
Nématode blanc Pa 3: assez résistante* / 7*
Galle verruqueuse F1: résistante* / 10*



* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.

TW 18-1401.



Une variété précoce de type chair ferme, dotée d'une résistance naturelle au mildiou du feuillage et des tubercules, adaptée à la production conventionnelle et biologique

- ▶ Type Chair ferme
- ▶ Variété précoce
- ▶ Variété de Next Generation+ pour sa résistance au mildiou dotée d'une bonne résistance aux virus

Caractéristiques principales

Obtenteur: G.W. te Winkel
Croisement: LORELEY x LM 11-0212
Maturité: hâtive / 7,5
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: assez lisse / 6,5
Tubérisation: - / -
Dormance: courte / 4,5

Poids sous eau: 350
Matière sèche: 19,5%
Type de cuisson: ferme / A
Nématode doré Ro 1/4: assez résistante* / 8*
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante* / 10*



* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels.
 + Les variétés marquées de ce symbole sont des variétés de nouvelle génération avec des gènes de résistance empilés.

Partager notre patrimoine génétique et notre expertise à l'échelle mondiale

Agrico offre bien plus que l'exportation de pommes de terre de semence de haute qualité depuis les Pays-Bas. Notre patrimoine génétique, nos connaissances et notre expertise s'étendent à tous les marchés à travers le monde.

Grâce à nos variétés sous licence exclusive*, nous aidons nos clients à développer et à renforcer leurs marchés locaux avec des variétés uniques à forte valeur ajoutée. À partir de la culture de tissus in vitro, nous leur donnons accès à la richesse génétique d'Agrico et les accompagnons tout au long de leur parcours, de la multiplication à la commercialisation.

Nous sommes fiers de vous présenter une sélection de nos meilleures variétés sous licence, développées pour créer de la valeur et avoir un impact sur les marchés du monde entier. ▶▶

** Aux Pays-Bas, ces variétés ne sont pas cultivées comme pommes de terre de semence.*

Agostino.



Allstar.



Almera.



Anouk.



Ardeche.



Basin Russet.



Bellanita.



Bente (SW 14-6968).



Corsica.



Destiny.



Excellency.



Fyone.



Janick.



Maranca.



Nofy.



Palace.



Performer.



Prince.



Roko.



Stacey.



Volare.



Nom	Page	Cultivation	Segment de marché		Next Generation		Caractéristiques								Résistances								
								Maturité	Couleur de la peau		Couleur de la chair	Forme du	Matière sèche	Type de cuisson	Chippabilité	Fritabilité	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Mildiou du feuillage	Mildiou du tubercule
Agata	30		✓	Frais				8	Y		6	O	17,6	AB	4	4	9	-	-	-	-	5	6
Agria	30	✓	✓	Frais	Frites, Chips, 4ème gamme		✓	5	Y		7	OL	21,8	BC	7,5	8	9	-	-	2	2	5,5	7
Alouette	31	✓	✓	Frais	4ème gamme	✓		6	R		7,5	OL	21,1	AB	-	6,5	9	8	4	-	-	9	9
AR 16-1404	58	✓	✓		Frites	✓		6,5	Y		7	O	21,1	AB	-	8	9	-	-	-	-	9	-
AR 16-0165	58	✓	✓			✓		5	Y		6	O	20,1	BC	-	-	9*	9*	9*	9*	9*	9	6
Arizona	31		✓					7	Y		6	O	17	AB	4	4	9	-	-	-	-	4	5
Armedi	32				Frites			5,5	Y		6	OL	21,8	C	7	8	9	7	5	9	8	4	7,5
Arsenal	32				Chips, Flocon			5,5	Y		6	RO	24	BC	7	7,5	9	8	6	9	8	4,5	5,5
Artemis	33		✓	Frais				7	Y		6	OL	20,4	B	6	6	9	-	-	-	-	5	8
Babylon	33		✓	Frais	Frites, Chips, 4ème gamme			5	Y		7	OL	21,7	BC	7	8	8	-	-	-	-	5,5	6,5
Beyonce	34	✓			Chips, Flocon	✓		6	Y		6,5	OR	23,9	BC	8	7	4	-	-	-	-	8,5	7,5
Carolus	34	✓	✓	Frais		✓		6	Y/R		7	O	21,6	BC	7	7	-	-	-	-	-	9	9
Cerisa				Vapeur				7,5	R		7	L	21,3	A	4,5	5	-	-	-	-	-	4	7
Chester (AR 13-2694)	35				Chips, Flocon			6	Y		6,5	OR	24	C	8	-	4*	2*	-	8*	7*	5	5
Constance	35		✓	Frais				7	Y		6,5	OR	19,7	AB	4	5,5	-	-	-	-	-	5	4,5
Corazon	36		✓	Frais				7	R		6	OL	17,8	AB	4	5,5	9	9	8	-	-	4,5	6,5
CR 13-3717	59					✓+													-				
Diamant	36		✓					6	Y		6	O	23	B	6	7	9	-	-	-	-	6	7
Erika	37			Frais, Vapeur				7,5	Y		6	LO	18,6	A	4	5	9	-	-	-	-	3,5	4
Esmeë	37		✓	Frais				6,5	R		7	OL	18	AB	4	6	-	-	-	-	-	4,5	7
Evolution	38		✓					6,5	R		6	OL	18,9	B	4	4,5	9	6	-	7	5	4	6
Fajah	38		✓					5,5	Y		6	LO	19,4	BC	6,5	7	9	-	-	3	2	4	5,5
Feliz (SW 14-7008)	10, 20, 39			Vapeur				7	Y		6,5	OL	19,6	A	-	-	9*	-	3*	6*	3*	3,5	5,5



Nom	Page	Cultivation	Segment de marché		Next Generation		Caractéristiques								Résistances							
								Maturité	Couleur de la peau	Couleur de la chair	Forme du	Matière sèche	Type de cuisson	Chippabilité	Fritabilité	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Mildiou du feuillage	Mildiou du tubercule
Fontane	40				Frites, Chips, Flocon		✓	5,5	Y	6,5	O	23,2	BC	7	7,5	9	-	-	-	-	5	6,5
Jacky	40	✓			4ème gamme		✓	6,5	Y	6,5	RO	20,1	B	5	5,5	9	-	-	-	-	9	9
Jamaica (AR 14-0334)	12		✓					7,5	Y	6,5	OL	18,3	AB	-	-	1*	-	-	-	-	3,5	6
Jolene	41		✓	Frais				6	Y	6	OL	21,1	B	5	7	-	-	-	-	-	4	5
Kuroda	41		✓					6	R	6	O	23	BC	5	5,5	9	-	-	-	-	5	5
Leonore	42				Frites			7,5	Y	7	LO	21,5	BC	-	7	9*	-	-	-	-	3,5	5
Levante	42	✓	✓	Frais			✓	5,5	Y	6	LO	19,9	B	4,5	5,5	9	-	-	-	-	8,5	7,5
Lugano	43		✓		Frites			5,5	Y	6,5	OL	21,4	B	5,5	7	9	9	9	9	9	5	5,5
Manitou	43		✓	Frais				5	R	6	LO	19,4	B	4,5	5,5	9	9	9	-	-	5	6
Markies	44		✓		Frites, Chips		✓	4	Y	6,5	OL	22,8	BC	7,5	8	9	-	-	-	-	6,5	7
Melrose	44			Frais, Spécialité	4ème gamme			6	R	7	O	22	B	5	6,5	-	-	-	-	-	4	-
Meryem	46		✓					5	R	6,5	LO	19,2	B	4	5,5	-	-	-	-	-	4,5	6
Napoleon	26, 45				Chips, Flocon			5	Y	6,5	RO	24,1	BC	8	7	9	-	-	4	2	6	6,5
Oregon (AR 14-3578)	14				Chips			5	Y	6	OR	24,9	BC	8	6,5	9*	-	-	-	-	4,5	5
Paradiso	22, 47		✓					5,5	Y	6	OL	18,2	B	4	4,5	9	-	-	-	-	5,5	6,5
Picasso	46		✓					5	Y/R	6	O	20,8	B	4	5	9	-	-	-	-	5	7
PL 17-0210	59	✓			Starch		✓	5	Y	6	RO	27,4	CD	6,5	-	9	9	4	5	6	9	8
Premiere	48				Frites			8	Y	6	OR	22,4	BC	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Ranomi	48		✓	Frais				7,5	Y	6,5	OL	17,9	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Riviera	49		✓					8	Y	6	OR	17,7	AB	4	4,5	9	-	-	-	-	3	5
Rudolph	49		✓					5,5	R	4	OR	20,5	AB	5,5	6,5	-	-	-	-	-	5,5	5,5
Sevas	50		✓					5,5	Y	6	O	19,2	A	-	6	9*	-	-	-	-	5,5	6
Sevilla	50	✓			Frites, Chips			4,5	Y	7	O	21	C	7	7,5	-	-	-	-	-	9	-
Sidney	24, 51				Frites			6	Y	4,5	LO	21,5	B	-	6,5	9	4	4*	8	6	4	8



Nom	Page	Cultivation	Segment de marché		Next Generation		Caractéristiques								Résistances								
								Maturité	Couleur de la peau		Couleur de la chair	Forme du	Matière sèche	Type de cuisson	Chipabilité	Fritabilité	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Mildiou du feuillage	Mildiou du tubercule
Sinora	52				Frites, Chips		✓	7	Y		6,5	OR	22,6	B	8	7,5	9	-	-	4	2	4,5	5
Spunta	52		✓					6	Y		6	L	21	BC	5,5	6	-	-	-	2	2	5,5	5
SW 15-6459	60				4ème gamme			6	Y		7	RO	21,10%	AB	-	-	7	7	6	-	-	3	7,5
SW 16-8008	60	✓		Frais		✓		6	Y		6	OL	18,9	B	-	-	4*	-	-	9*	7*	9	5
Texas (AR 14-3488)	16				Frites			5,5	Y		6	OL	23	C	-	7	6*	-	-	-	-	4	5,5
TW 17-1410	61					✓+																	
TW 18-1401	61	✓		Spécialité		✓+		7,5	Y		6,5	LO	19,5	A	4	-	8*	-	-	-	-	9	6
Twinner	53	✓	✓	Frais		✓		7,5	Y		7	O	19,7	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	8	9
Twister	53	✓	✓	Frais		✓		7	Y		6,5	RO	19	AB	4	5	9	-	-	-	-	9	9
Vogue	54		✓					6,5	Y		7	OL	17,3	AB	4	5	9	-	-	-	-	4	6

* Les résultats marqués d'un astérisque (*) sont basés sur nos propres recherches et n'ont pas encore été officiellement publiés. ■

Segment de marché

-  Traditionnelle (consommation)
-  Retail
 - Grenailles, frais, vapeur, spécialité
-  Industrie
 - Chips, 4ème gamme, flocon, frites, fécule

Mode de culture

-  Culture biologique

Variétés «Next Generation»

- 

Les variétés marquées du symbole Next Generation présentent une résistance naturelle au mildiou.
- 

Les variétés marquées de ce symbole sont des variétés Next Generation dotées de gènes de résistance combinés.

Agrico Originals

- 

Les variétés marquées du symbole Agrico Originals ont joué un rôle clé dans la culture mondiale de la pomme de terre et ont véritablement fait la différence.

Caractéristiques de la plante et des tubercules

- Maturité**
 - 4 tardive; 4,5 tardive; 5 tardive; 5,5 demi-tardive; 6 demi tardive; 6,5 demi-hâtive; 7 demi-hâtive; 7,5 hâtive; 8 hâtive; 8,5 très hâtive; 9 très hâtive

Couleur du germe	B bleu V vert P rose R rouge V violet C clair F foncé Ainsi que toutes autres combinaisons, par exemple : LBP bleu violet clair ou DRV violet rouge foncé
Couleur de la fleur	B blanche MP mauve pâle V violette BC bleue clair B bleue V violette MF mauve foncé MB mauve bleuté
Nombre de baies	4 très forte; 4,5 forte; 5 assez importante; 5,5 peu importante; 6 moyenne; 6,5 assez faible; 7 faible; 7,5 très faible; 8 nulle
Feuillage - développement initial	4 lent; 4,5 lent; 5 plutôt lent; 5,5 plutôt lent; 6 moyen; 6,5 moyen; 7 plutôt rapide; 7,5 plutôt rapide; 8 rapide
Feuillage - développement final	4 faible; 4,5 faible; 5 faible; 5,5 faible; 6 faible; 6,5 moyen; 7 moyen; 7,5 assez bon; 8 bon
Feuillage - épuration	4 très difficile; 4,5 difficile; 5 plutôt difficile; 5,5 plutôt difficile; 6 normale; 6,5 plutôt facile; 7 plutôt facile; 7,5 facile; 8 très facile
Feuillage - tenue	4 très fragile; 4,5 fragile; 5 plutôt fragile; 5,5 plutôt fragile; 6 moyenne; 6,5 plutôt ferme; 7 plutôt ferme; 7,5 plutôt ferme; 8 ferme
Couleur de la chair	4 blanche; 4,5 blanche; 5 jaune pâle; 5,5 jaune pâle; 6 jaune beurre; 6,5 jaune beurre; 7 jaune; 7,5 jaune; 8 jaune safran; 8,5 orange
Couleur de la peau	J jaune R rouge J/R jaune avec des yeux rouges RÉT réticulée V violette

Finition de la peau	3 réticulée; 3,5 réticulée; 4 très terne; 4,5 terne; 5 assez terne; 5,5 plutôt moyenne; 6 moyenne; 6,5 assez lisse; 7 lisse; 7,5 très lisse; 8 excellente
Taille du tubercule	4 petit; 4,5 petit; 5 assez petit; 5,5 assez petit; 6 moyen; 6,5 moyen; 7 assez gros; 7,5 assez gros; 8 gros
Forme du tubercule	R rond RO oblong rond OR oblong rond O oblong OL oblong long LO oblong long L long
Régularité de la forme	4 irrégulière; 4,5 irrégulière; 5 assez irrégulière; 5,5 assez irrégulière; 6 assez régulière; 6,5 assez régulière; 7 régulière; 7,5 régulière; 8 régulière
Tubérisation	4 faible; 4,5 faible; 5 assez faible; 5,5 assez faible; 6 moyenne; 6,5 moyenne; 7 assez élevée; 7,5 assez élevée; 8 élevée; 8,5 élevée; 9 élevée
Homogénéité de calibre	4 irrégulière; 4,5 irrégulière; 5 assez irrégulière; 5,5 assez irrégulière; 6 assez régulière; 6,5 assez régulière; 7 régulière; 7,5 régulière; 8 très régulière

Sensibilité et qualité

Dormance	4 courte; 4,5 courte; 5 assez courte; 5,5 assez courte; 6 moyenne; 6,5 moyenne; 7 assez longue; 7,5 assez longue; 8 longue
Métribuzine (pré-émergence & post-émergence)	3 très sensible; 3,5 très sensible; 4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 légèrement sensible; 6,5 légèrement sensible; 7 légèrement sensible; 7,5 légèrement sensible; 8 peu sensible; 8,5 peu sensible; 9 pas sensible

Avertissement: Dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché de la substance active métribuzine n'a pas été renouvelée et les produits phytosanitaires contenant de la métribuzine ne sont plus autorisés. Il convient de toujours vérifier si un produit et son usage sont autorisés dans le pays de culture.

Éthylène	4 5% de tubercules en moins 4,5 5% de tubercules en moins 5 5% de tubercules en plus ou en moins 5,5 5% de tubercules en plus ou en moins 6 5 à 15% de tubercules en plus 6,5 5 à 15% de tubercules en plus 7 15 à 25% de tubercules en plus 7,5 15 à 25% de tubercules en plus 8 25% de tubercules en plus
Repousse	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 très peu à pas sensible
Crevasses	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 peu à pas sensible
Coups bleus	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 peu à pas sensible
Endommagement à la récolte	4 très sensible; 4,5 très sensible; 5 sensible; 5,5 sensible; 6 assez sensible; 6,5 assez sensible; 7 peu sensible; 7,5 peu sensible; 8 très peu à pas sensible
Poids sous eau	300 grammes bas, 500 grammes haute
Matière sèche	17% faible; 26,5% élevée
Répartition de la matière sèche	5 plutôt irrégulier; 5,5 plutôt irrégulier; 6 moyen; 6,5 moyen; 7 bon; 7,5 bon; 8 excellent; 8,5 excellent; 9 excellent; 9,5 excellent
Niveau de glyco-alcaloïde	Indique le niveau de TGA (glyco-alcaloïdes) mesuré en mg par 100 grammes.
Chipabilité	4 mauvaise ; 4,5 mauvaise ; 5 mauvaise ; 5,5 moyenne ; 6 moyenne ; 6,5 supérieure à la moyenne ; 7 bonne ; 7,5 très bonne ; 8 excellente

* Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiel. ■

agricopotatoes.fr

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Baby potatoes	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
French fries	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasse	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoehheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodos do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Specials	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengröße	Grosueur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra

Same catalogue, different language?


This variety catalogue is available digitally in the following languages
English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | Português




[agricopotatoes.fr/
catalogue/english](https://agricopotatoes.fr/catalogue/english)



[agricopotatoes.fr/
catalogue/german](https://agricopotatoes.fr/catalogue/german)




[agricopotatoes.fr/
catalogue/spanish](https://agricopotatoes.fr/catalogue/spanish)



[agricopotatoes.fr/
catalogue/french](https://agricopotatoes.fr/catalogue/french)



[agricopotatoes.fr/
catalogue/dutch](https://agricopotatoes.fr/catalogue/dutch)



[agricopotatoes.fr/
catalogue/portuguese](https://agricopotatoes.fr/catalogue/portuguese)

Cultivation recommendations are available in many languages on our website or via our local partner in the relevant country.



Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord

Duit 15, 8305 BB Emmeloord

The Netherlands

T +31 (0)527 639911 / E info@agrico.nl

I agricopotatoes.fr