



Agria.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Βιολογική
καλλιέργεια



Γενικής Χρήσης




Ειδικής Χρήσης
Για τυποποίηση



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/
τηγάνι, Τσιπς,
Προψυγμένες

Κιτρινόσαρκη, κατάλληλη
και για βιομηχανική.

- ▶ Ιδανική για τηγάνι, δε μαλακώνει,
δε μεταχρωματίζεται
- ▶ Ανθεκτική σε ιώσεις και
νηματώδεις Ro 1/4
- ▶ Υψηλή στερεά ουσία, μακρύς
χρόνος αποθήκευσης



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Böhm

Διασταύρωση: QUARTA x SEMLO

Σπορόφυτο: BM 77-0945

Δικαιώματα Δημιουργού: Έληξαν

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 5

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: πολύ υψηλός / 8

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μακρύς / 8

Metribuzin (Sencor): ελάχιστη ευαισθητή / 7,5

Bentazon: αρκετά ευαισθητή / 6,5

Αιθυλένιο: 5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι / 6

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαισθητή / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαισθητή / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαισθητή / 6

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαισθητή / 5

Βάρος εντός νερού: 402

Στερεά ουσία: 21,8%

Κατανομή στερεάς ουσίας: κανονική / 6,5

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστη ευαισθητή / 7

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστη ευαισθητή / 7



agricopotatoes.gr/agria

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Συνιστάται σύντομο θερμικό σοκ ή σωστή προβιάση.

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβιάση είναι ιδανική μέθοδος.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 30 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητα

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 2

Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ακτινομύκωση: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 3

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση - LRV: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - A: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Ίωση - X: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Yn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Καρκίνωση 1: ελάχιστα ευαίσθητη / 9

Καρκίνωση 6: αρκετά ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιερητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.