

Armedi (AR 10-2432).

SEGMENT DE MARCHÉ



Industrie de
transformation
Frites

Variété de conservation précoce,
adaptée à la fabrication de frites.

- » Tubérisation élevée
- » Adaptée au stockage à long terme
- » Résistances multiples aux nématodes
à kyste de la pomme de terre



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : TOPAS x BASIN RUSSET
Numéro de clone : AR 10-2432
Droits d'obteneur : En attente

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : -
Couleur de la fleur : violette
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6,5
Feuillage - tenue : ferme / 8

Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Couleur de la peau : jaune
Finition de la peau : moyenne / 6
Taille du tubercule : assez gros / 7,5
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6,5
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5

Sensibilité et qualité

Dormance : moyenne / 6,5
Métribuzine : très sensible / 4
Bentazone : - / -
Éthylène : - / -

Repousse : assez sensible / 6
Crevasses : peu sensible / 7
Coups bleus : sensible / 5,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6

Poids sous eau : 402
Matière sèche : 21,8%
Répartition de la matière sèche : moyen / 6,5
Niveau de glyco-alcaloïde : 3,3

Chipabilité : bonne / 7
Fritabilité : excellente / 8
Type de cuisson : farineuse / C
Grisaillement : assez sensible / 6,5
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard - 10%.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard + 25%.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (55.000 plantes/ha)

35/55 mm : 34 cm (40.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine (Sencor), car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7°C. Convient à stockage à long terme.



Say potato,
say **Agrico.**

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3 : résistance au champ / 7

Nématode blanc Pa 2 : résistante / 9

Nématode blanc Pa 3 : résistance au champ / 8

Mildiou du feuillage : très sensible / 4

Mildiou du tubercule : peu sensible / 7,5

Gale commune : sensible / 5,5

Gale poudreuse : - / -

Fusariose : peu sensible / 6

Erwinia : - / -

Dartrose : - / -

Virus du mop top : peu sensible / 7,5

Virus - Enroulement : - / -

Virus - A : - / -

Virus - X : - / -

Virus - Y : très sensible / 4,5

Virus - Y nécrotique : - / -

Galle verruqueuse F1 : résistant* / 10*

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -

* = Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiel