

Cerisa.

MARKTSEGMENT



Een vroeg, fijnvallend, roodschillige tafel- en saladespecialiteit met een excellente smaak.

- » Zeer hoge knolzetting
- » Bijzondere smaak- en bereidingseigenschappen
- » Goede virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Desmazières
 Kruising: FRANCINE x LAURA
 Zaailing: DM 99-063-07
 Kwekersrecht: 31-12-2041

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: vroeg / 7,5
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: licht paars
 Hoeveelheid bessen: geen / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: vrij slap / 5,5

Vleeskleur: geel / 7
 Schilkleur: rood
 Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
 Knolgrootte: gemiddeld / 6
 Knolvorm: lang
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: hoog / 9
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
 Metribuzin: gevoelig / 5
 Bentazon: weinig gevoelig / 7
 Ethyleen: - / -
 Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Groeischeuren: gevoelig / 5
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 391
 Drogestofgehalte: 21,3%
 Drogestofverdeling: uitstekend / 8
 TGA-gehalte: 5,5

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
 Kooktype: vastkokend / A
 Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/cerisa

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/50 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: weinig vatbaar* / 6*

Aardappelmoeheid Ro 2/3: weinig vatbaar* / 5*

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: weinig vatbaar / 7

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringrigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.