

# Napoleon (AR 10-4637).

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende  
industrie  
Vlokken, Chips

Een laat chipsras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht

- » Goede chipskwaliteit
- » Geschikt ook voor de verwerking tot vlokken
- » Goede virusresistenties



## KARAKTERISTIEKEN

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
Kruising: ANTINA x ALICANTE  
Zaailing: AR 10-4637  
Kwekersrecht: Aangevraagd

### Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5  
Kiemkleur: rood paars  
Bloemkleur: wit  
Hoeveelheid bessen: geen / 4  
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5  
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5  
Schilkleur: geel  
Schilhoedanigheid: matig / 5  
Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
Knolvorm: rond ovaal  
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7  
Knolzetting: gemiddeld / 6  
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

### Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6  
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8  
Bentazon: - / -  
Ethyleen: - / -  
Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6  
Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5,5  
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 450  
Drogestofgehalte: 24,1%  
Drogestofverdeling: goed / 7  
TGA-gehalte: 5,5

Chipskwaliteit: uitstekend / 8  
Frietkwaliteit: goed / 7  
Kooktype: kruimig / BC  
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6  
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6

# OM TE GROEIEN

## Bemesting<sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 5%.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies + 20%.

<sup>1</sup> Level of fertilization is based on soil analysis

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

## Plantafstand

28/35 mm: 25cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

**Aardappelmoeheid Ro 1/4:** resistent / 9

**Aardappelmoeheid Ro 2/3:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 2:** vatbaar / 4

**Aardappelmoeheid Pa 3:** - / -

**Phytophthora loof:** weinig vatbaar / 6

**Phytophthora knol:** weinig vatbaar / 7,5

**Schurft:** weinig vatbaar / 6

**Poederschurft:** - / -

**Fusarium:** weinig vatbaar / 6,5

**Erwinia:** - / -

**Zwarte spikkel:** - / -

**Kringerigheid:** zeer vatbaar / 4

**Virus - Bladrol:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** weinig tot niet vatbaar / 8

**Virus - Yntn:** - / -

**Wratziekte F1 (D1):** licht vatbaar\* / 7\*

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -

\* Resultaten met een '\*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.