

Kuroda.

MARKTSEGMENT



Een middenlaet, roodschillig consumptieras met een uitstekende hitteresistentie en een goede opbrengst.

- » Grove knollen
- » Goede bewaarbaarheid
- » Brede wratziekte resistentie



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: G. Kuik
 Kruising: AR 76-199-03 x KO 80-1407
 Zaailing: KK 83-0216
 Kwekersrecht: 31-12-2025

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaet / 6
 Kiemkleur: blauw paars
 Bloemkleur: paars
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilkleur: rood
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolgrootte: grof / 8
 Knolvorm: ovaal
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij laag / 5
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
 Metribuzin: gevoelig / 5
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
 Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
 Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
 Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 426
 Drogestofgehalte: 23%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
 Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
 Kooktype: kruimig / BC
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4,5


www.agrico.nl/kuroda

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -