


Nofy.

En sen stärkelsesort med god avkastning och resistenser mot bladmögel och brunröta.

- ▶ Hög TS-halt
- ▶ Bra lagringsduglighet
- ▶ Bra virusresistens

MARKNADSSEGMENT



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: AKV Langholt
Korsning: STAYER x AR 02-3921
Nummersort: PL 08-4007
Förädlarrätt: 31-12-2048

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 5
Ljus groddens färg: grön-röd
Blomfärg: vit
Antal bär: över genomsnittlig / 7
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: ganska lätt / 7
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Köttfärg: ljusgul / 6,5
Skalfärg: gul
Skalfinish: ganska dålig / 5
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Knölform: oval rund
Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6,5

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: ganska lång / 7,5
Metribuzin: något till inte känslig / 8
Bentazon: något till inte känslig / 8
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: något till inte känslig / 8
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Mekaniska skador: ganska känslig / 6

Undervattenvikt: 471
Torrsubstanshalt: 25,2%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 15,37

Chips kvalitet: olämpligt / 4,5
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Koktyp: mjölig / BC
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5

www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 22-25 cm (55.000 plantor/ha)

35/55 mm: 26-28 cm (49.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för lång lagring.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: något mottaglig / 6

Vit nematod Pa 2: något mottaglig / 5

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 2

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 8,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: mycket mottaglig / 4,5

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: något till inte mottaglig / 8

Rost: mycket mottaglig / 4,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6,5

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -