

Amorosa.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg, roodschillig consumptieras met een goede opbrengst.

- » Grove knollen
- » Goede droogtetolerantie
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: ARINDA x IMPALA
 Zaailing: AR 87-0103
 Kwekersrecht: 31-12-2029

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
 Kiemkleur: blauw paars
 Bloemkleur: licht paars
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilkleur: rood
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolgrootte: grof / 8
 Knolvorm: ovaal lang
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: vrij laag / 5
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: kort / 4
 Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: - / -
 Talent: 5% minder knollen / 4

 Doorwas: redelijk gevoelig / 6
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
 Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

 Onderwatergewicht: 349
 Drogestofgehalte: 19,2%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: -

 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5


www.agrico.nl/amorosa

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22-25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 32-35 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -