

Alouette.

Een middenlaat, veelzijdig roodschillig tafelras, met Phytophthora resistentie in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- ▶ Weinig gevoelig voor stootblauw en beschadiging
- ▶ Geschikt voor diverse gerechten
- ▶ Goede droogtetolerantie



MARKTSEGMENT



Biologisch



Traditioneel

Retail
VersVerwerkende
industrie
Koelvers

KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.

Kruising: AR 02-139-1 x LAURA

Zaailing: AR 04-3153

Kwekersrecht: 31-12-2044

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6

Kiemkleur: rood paars

Bloemkleur: licht paars

Hoeveelheid bessen: geen / 4

Loof - ontwikkeling begin: snel / 8

Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8

Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: geel / 7,5

Schilkleur: rood

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolgrootte: vrij grof / 7

Knolvorm: ovaal lang

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: gemiddeld / 6

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6

Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8

Bentazon: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: 5% minder knollen / 4

Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 389

Drogestofgehalte: 21,1%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 3,6

Chipskwaliteit: bovengemiddeld / 6,5

Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7

Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/alouette

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Preventieve bespuitingen zijn niet nodig.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: partieel resistent / 8

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -