

Arizona.

Srednje rana sorta visokih prinosa u različitim klimatskim uvjetima.

- ▶ Ujednačen oblik i veličina gomolja
- ▶ Dobro podnosi sušu
- ▶ Otporan na više tipova virusa

TRŽIŠNA NAMJENA



KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Sjeme: AR 98-0313

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 6,5
Boja klice: crveno ljubičasta
Boja cvijeta: bijela
Broj bobica: ispod prosjeka / 5
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6,5
Lisna masa - čvrstoća: prosječno / 6

Boja mesa: svjetložuta / 6
Boja pokožice: žuta
Glatkoća pokožice: dobar / 7
Krupnoća gomolja: krupan / 8
Oblik gomolja: ovalan
Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7,5
Tuberizacija: prosječan / 6
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: prosječna / 6
Metribuzin: osjetljiv / 5
Bentazon: malo osjetljiv / 7

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7
Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7
Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7
Oštećenje prilikom berbe: malo osjetljiv / 7

Podvodna težina: 301
Postotak suhe tvari: 17%
Raspodjela suhe tvari: - / -
TGA razina: 4,2

Kulinarski tip: umjereno čvrst / AB
Oksidacija sirovog krumpira: - / -
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6,5



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke - 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Postupanje sa sjemenom

Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 4 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje: vrlo osjetljiv / 4

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno do neosjetljiv / 8

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: prilično osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -