

Spunta.

MARKTSEGMENT



Een middenlaat consumptieras met goede hitte- en virusresistenties en een hoge opbrengst.

- » Grove knollen
- » Midden late rijptijd
- » Hoog onderwatergewicht



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: -
Kruising: BEA x USDA 96-56
Zaailing: Oldenburger 57-88
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Knolvorm: lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei-scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: zeer gevoelig / 4

Onderwatergewicht: 387
Drogestofgehalte: 21%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/spunta

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: vatbaar / 2

Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 2

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: vatbaar / 5,5

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -