

Alicante.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Vlokken, Chips

Een laat chipsras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.

- » Goede chipskwaliteit
- » Vrij hoge knolzetting
- » Brede aardappelmoetheid resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 97-3246 x AR 96-1218
Zaailing: AR 04-3799
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: geel / 7
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: weinig gevoelig / 7,5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging: zeer gevoelig / 4,5

Onderwatergewicht: 490
Drogestofgehalte: 26,1%
Drogestofverdeling: goed / 7,5
TGA-gehalte: 14,3

Chipskwaliteit: goed / 7
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Gruwverkleuring (na koken): gevoelig / 5


www.agrico.nl/alicante

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

35/50 mm: 28 cm (47.500 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent / 8

Aardappelmoeheid Ro 2/3: weinig vatbaar / 5

Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 3: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -