


Jolene.

Srednje rana sorta lijepog izgleda
pokožice, pogodna za prženje

- ▶ Svjetlo žuta boja mesa
- ▶ Pogodna sorta za različite
kulinarske namjene
- ▶ Vrlo dobar postotak suhe tvari

MARKET SEGMENT



KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.

Križanje: SAGITTA x AR 03-1491

Sjeme: AR 09-2556

Autorsko pravo: 31-12-2050

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6

Boja klice: crvena

Boja cvijeta: bijela

Broj bobica: iznadprosječan / 7

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7,5

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5

Boja mesa: svjetložuta / 6

Boja pokožice: žuta

Glatkoća pokožice: dobar / 7

Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7,5

Oblik gomolja: ovalno izduženi

Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7

Tuberizacija: umjereno velik / 7

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: prosječna / 6

Metribuzin: umjereno osjetljiv / 6,5

Bentazon: - / -

Etilen: - / -

Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7

Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7

Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6

Podvodna težina: 389

Postotak suhe tvari: 21,1%

Raspodjela suhe tvari: - / -

TGA razina: -

Kvaliteta krumpirića: dobar / 7

Kulinarski tip: umjereno brašnat / B

Oksidacija sirovog krumpira: malo osjetljiv / 7

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6,5



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Tretiranje sjemena

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću i određeno smanjenje prinosa.

Fungidici

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C.

Prikladno za srednje dugo skladištenje.



Say potato,
say **Agrico.**

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: - / -

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): - / -

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 7,5

Prskanje: umjereno osjetljiv / 6

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno do neosjetljiv / 8

Bradavičasta bolest krumpira F1: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -