

Sinora.

TRŽIŠNA NAMJENA



Prerada
Prženi krumpirići,
čips

Srednje rana sorta visokog prinosa koja se lako uzgaja, za prženje ili čips.

- ▶ Rana sorta prikladna za isporuku izravno s polja
- ▶ Visok postotak suhe tvari
- ▶ Dobra otpornost na viruse



KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: J. Schilt

Križanje: AGRIA x AM 70-2166

Sjeme: SI 85-0482

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 7

Boja klice: plavo ljubičasta

Boja cvijeta: bijela

Broj bobica: nema / 4

Lisna masa - početni razvoj: brzo / 8

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5

Boja mesa: svjetložuta / 6,5

Boja pokožice: žuta

Glatkoća pokožice: prosječan / 6

Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7

Oblik gomolja: ovalno okrugli

Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6

Tuberizacija: umjereno velik / 7

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: prosječna / 6

Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8

Bentazon: umjereno osjetljiv / 6,5

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5

Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5

Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6,5

Oštećenje prilikom berbe: vrlo osjetljiv / 4,5

Podvodna težina: 416

Postotak suhe tvari: 22,6%

Raspodjela suhe tvari: dobra / 7

TGA razina: 8,2

Čips kvaliteta: dobar / 7

Kvaliteta prženih krumpirića: vrlo dobar / 7,5

Kulinarski tip: umjereno brašnat / B

Oksidacija sirovog krumpira: osjetljiv / 5

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): osjetljiv / 5



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke + 25%. Ne preporučuje se primjena stajskog gnojiva.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Postupanje sa sjemenom

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanje prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Uklanjanje klice više nego dvaput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C.

Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 7 °C.

Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: osjetljiv / 4

Nematoda Pa 3: osjetljiv / 2

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4,5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: osjetljiv / 5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje: - / -

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno do neosjetljiv / 8,5

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -