

Next Generation

Alouette.

MARKNADSSEGMENT

Ekologisk
odling

Traditional

Matpotatis
FärskpotatisIndustri
Skal

Fastkokande rödskalig sort med hög TS halt samt är bladmögel- och brunrötaresistent, lämplig för både ekologisk och konventionell odling. Alouette är en av våra Next Generation sorter.

- ▶ God tolerans mot stöttblått
- ▶ Lämplig för kokning och hembakade produkter
- ▶ God tolerans mot torka



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.

Korsning: AR 02-139-1 x LAURA

Nummersort: AR 04-3153

Förädlarrätt: 31-12-2044

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6

Ljus groddens färg: röd-violett

Blomfärg: ljuslila

Antal bär: ingen / 4

Blast - inledande utveckling: snabb / 8

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - renshet: genomsnittlig / 6

Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Köttfärg: gul / 7,5

Skalfärg: röd

Skalfinish: bra / 7

Knölstorlek: ganska stora / 7

Knölform: oval lång

Knölens regelbundenhet: jämn / 7

Knölsättning: genomsnittligt / 6

Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6,5

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Metribuzin: något till inte känslig / 8

Bentazon: något känslig / 7

Etylen: 5 % färre knölar / 4

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8

Mekaniska skador: ganska känslig / 6

Undervattenvikt: 389

Torrsustanshalt: 21,1%

Fördelning av torrsustans: - / -

TGA-nivå: 3,6

Chips kvalitet: - / -

Friterings kvalitet: över genomsnittet / 6,5

Koktyp: ganska fast / AB

Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7


www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Plantera helst knölarna i varm jord, eftersom den här sortens utveckling är långsam i början. En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: fältresistent / 8

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 7,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: - / -

Rost: mottaglig / 5,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: något mottaglig / 7

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -