


Romano.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg, roodschillig consumptieras met redelijke virusresistenties en geschikt voor lange bewaring.

- » Uniforme sortering
- » Midden vroege rijptijd
- » Brede wratziekte resistentie



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: DRAGA x DESIREE
Zaailing: MA 63-0062
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: licht paars
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: crème / 5
Schilkleur: rood
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschatting: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 360
Drogestofgehalte: 19,7%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 2,1

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: - / -
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5


www.agrico.nl/romano

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Erwinia: weinig vatbaar / 7

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Virus - Bladrol: vatbaar / 5

Virus - A: weinig vatbaar / 7

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -