

Faluka.

MARKTSEGMENT



Een middenlaat consumptieras met een goede hitteresistentie en een hoge opbrengst.

- » Midden late rijptijd
- » Vrij lange kiemrust
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: F.J. Vos
 Kruising: ARMUNDO x ARIELLE
 Zaailing: VO 96-0077
 Kwekersrecht: 31-12-2037

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: geen / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5

Vleeskleur: crème / 5
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5
 Knolvorm: lang ovaal
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij laag / 5
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7
 Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
 Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
 Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 326
 Drogestofgehalte: 18,3%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 3,6

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
 Kooktype: vrij kruimig / B
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/faluka

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: zeer vatbaar / 4

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -