

2025
2026

variedades.

“STRONGER
BY NATURE”

Say potato,
say **Agrico.**



Stronger by Nature

El cultivo de la patata se enfrenta a grandes desafíos a nivel mundial. El cambio climático, las leyes y normativas en constante evolución y la mayor demanda de prácticas agrícolas sostenibles exigen variedades que destaquen por su resistencia y fiabilidad.

Nuestro lema “Stronger by Nature” naturalmente resistentes, viables y rentables. La prioridad es ofrecer bajos insumos y altos rendimientos.

Nuestras variedades Next Generation son la piedra angular de esta visión, ya que garantizan una resistencia natural al mildiu y han demostrado ser eficaces en el cultivo ecológico y tradicional de la patata. Su resistencia reduce la dependencia de los productores a los productos fitosanitarios, disminuye los costes de cultivo y aumenta los rendimientos. De este modo, nuestras variedades Next Generation promueven un cultivo de patatas más sostenible.

La siguiente fase de desarrollo es el cultivo de variedades con genes apilados de resistencia. Esto implica que se combinan diferentes genes de resistencia en una sola variedad para que la planta se defienda de forma más eficaz contra el mildiu. El apilamiento selectivo de estos genes constituye un mecanismo de defensa más sostenible que reduce notablemente el riesgo de aparición de enfermedades. Este enfoque innovador ya forma parte de nuestros programas de cultivo. Las últimas tecnologías y los amplios ensayos de campo nos permiten seleccionar los brotes más prometedores. Paso a paso, estamos cultivando nuevas variedades de patata que se defiendan de forma más amplia y sostenible contra el mildiu.

Para consolidar este progreso, este año presentamos un nuevo logotipo para Next Generation. Esta identidad actualizada refleja la evolución de la marca como un referente de innovación, fiabilidad y sostenibilidad dentro de nuestro catálogo de variedades. Pero no solo nos centramos en la resistencia. Desarrollamos variedades que son naturalmente más fuertes, resistentes a los nematodos y virus, y con una excelente capacidad de almacenamiento. Esto proporciona mayor tranquilidad a los productores en aspectos claves como el rendimiento, la calidad y la seguridad en los ingresos. Son variedades perfectamente viables que logran despuntar en un mundo en constante cambio.

Al margen de nuestras innovaciones, también están nuestros clásicos de siempre. Con la nueva etiqueta de calidad Agrico Originals, destacamos las variedades que han demostrado sobradamente su valía. Las referencias Agria, Fontane, Markies y Sinora han tenido una gran repercusión mundial y son variedades totalmente consolidadas en nuestro catálogo.

De este modo, combinamos la fuerza innovadora de nuestras últimas variedades con la fiabilidad de Agrico Originals, que llevan demostrando su resistencia en la práctica durante décadas. Esta poderosa combinación configura un catálogo de variedades sólido y viable, que nos permite ofrecer a nuestros socios, productores y clientes justo lo que necesitan en un mercado que sigue evolucionando a gran velocidad.

Para mantener nuestra ventaja competitiva en este panorama cambiante, estamos destinando muchos fondos para ampliar Agrico Research, nuestro centro de cultivo. Nuestra política actual tiene por objetivo seguir dando pasos firmes en el desarrollo de variedades innovadoras que puedan afrontar los retos presentes y futuros.

Las últimas tecnologías nos permiten ofrecer variedades de patata robustas, saludables, sostenibles y perfectamente adaptadas a las condiciones del mundo real. Solo así podemos dar respuesta a los retos actuales de cultivo y de mercado.

Estamos orgullosos de lo que hemos logrado junto a nuestros socios y aliados, y encaramos el futuro con confianza. Con variedades resistentes, productores rentables y relaciones sólidas, estamos labrando el futuro del cultivo de la patata con la fuerza de la propia naturaleza. ■



Mark Zuidhof
Director general

Contenido.



2	Introducción	24	Nuestras variedades	70	Leyenda
4	Stronger by Nature	54	Brotes verdes	74	Términos técnicos
10	Novedades 2025	62	Con licencia		
16	Variedades destacadas	64	Índice		

Exención de responsabilidad
Agrico ha puesto todo el cuidado razonable en la elaboración de estas descripciones de variedades. Sin embargo, toda la información está sujeta a cambios y Agrico no aceptará responsabilidad alguna por errores u omisiones. En ningún caso será Agrico responsable de cualesquiera daños que se deriven de la información contenida en estas descripciones o que estén relacionados con ella.

STRONGER BY NATURE

El sector agrícola se enfrenta a grandes desafíos. El cambio climático, las leyes y normativas cada vez más estrictas, los cambios en las demandas de mercado y la creciente presión social tensionan a nuestros productores, compradores y socios. En tiempos tan inciertos como estos, se necesita seguridad y confianza con variedades de patata que puedan soportar el carácter imprevisible de la naturaleza y, al mismo tiempo, ofrecer un alto rendimiento, una excelente calidad y unos ingresos estables. ►►

Stronger by Nature refleja a la perfección la filosofía de Agrico, que se basa en nutrirse de la fuerza de la propia naturaleza. A través de Agrico Research, desarrollamos variedades que son naturalmente resistentes y viables a largo plazo gracias a sus características genéticas. La selección que realizamos se basa en métodos naturales de hibridación para conseguir variedades que puedan afrontar los retos presentes y futuros.

Además de nuestra línea Next Generation, muy asentada en el mercado y conocida por su gran resistencia al mildiu, Agrico también ofrece otras variedades con características destacables en otras áreas. Desarrollamos patatas mediante hibridación natural, con una importante resistencia intrínseca a las enfermedades, que requieren pocos insumos y ofrecen altos rendimientos. Nuestro catálogo ofrece seguridad en aspectos de máxima relevancia como el rendimiento, la calidad y la rentabilidad. Ya sea por su resistencia a los nematodos y virus o por su excelente capacidad de almacenamiento, Agrico siempre tiene la variedad adecuada para cada condición de cultivo.



Con **Stronger by Nature**, no solo demostramos la solidez de nuestra genética, sino también la versatilidad de nuestro catálogo. Cada una de nuestras variedades contribuye de un modo u otro a impulsar un cultivo de patatas saludable, rentable y sostenible.

Fortaleza genética sostenible

En un escenario en el que el cultivo de la patata plantea tantos interrogantes, nuestra ambición es ofrecer respuestas adecuadas en cualquier parte del mundo. Nos centramos en desarrollar soluciones sostenibles e invertimos en variedades resistentes a enfermedades y plagas, como nematodos, virus y hongos como el mildiu, así como en variedades con una excelente capacidad de almacenamiento para garantizar la calidad y la disponibilidad.

Innovación en armonía con la naturaleza

La mejora genética en Agrico Research es mucho más que una técnica, es el fruto de colaborar con la naturaleza. Basamos nuestra selección

en lo mejor que nos ofrece la naturaleza y combinamos en nuestras variedades las características más deseables. Nuestras innovaciones se apoyan en procesos naturales que son respetuosos con las personas y el medioambiente.

Seguridad para el futuro

Nuestro catálogo ofrece seguridad donde más se necesita. **Stronger by Nature**, demuestra que la innovación y la naturaleza pueden reforzarse mutuamente. Nuestras variedades son el resultado de años de investigación y visión de futuro y se han desarrollado para hacer frente a los retos de hoy y mañana, con el objetivo de que productores y compradores puedan mirar el futuro con confianza.

Junto con nuestros socios, clientes y aliados, estamos construyendo un futuro sostenible, saludable y rentable para el sector de la patata a las generaciones presentes y futuras. ■

UN ENFOQUE CLARO

Apostamos por la hibridación natural para ofrecer variedades con altos rendimientos y una calidad superior que aseguren beneficios y garanticen la seguridad alimentaria.



RESISTENCIA A LOS NEMATODOS

Suelos saludables, plantas fuertes, rendimientos estables

La resistencia a los nematodos es una condición indispensable para la gestión sostenible del suelo. No se trata solo de mantener los niveles adecuados de materia orgánica y la capacidad de retención de agua, sino también de mantener los campos en un estado sanitario óptimo. A medida que el cultivo profesional de la patata se concentra en áreas específicas con rotaciones cada vez más intensivas, la resistencia a los nematodos se convierte en un factor crítico. La protección del suelo garantiza rendimientos estables y un cultivo de patata sostenible a largo plazo.

Lugano. 

¡Grande, amarilla y fritástica!



RESISTENCIA A LOS VIRUS

Fortaleza genética para una calidad constante con menos insumos

Producir patatas de siembra lo más saludables posible con una mínima protección de los cultivos empieza por una sólida resistencia a los virus. Esto reduce la necesidad de productos fitosanitarios y minimiza el riesgo de infección. Es una forma proactiva de proteger tanto el cultivo como el medioambiente y de garantizar un alto rendimiento y una calidad constante.

Napoleon. 

Patata fiable para patatas fritas de bolsa de calidad superior



EXCELENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Patatas resistentes con una excelente capacidad de almacenamiento para garantizar calidad y disponibilidad

Una buena capacidad de almacenamiento permite que las patatas estén disponibles durante todo el año con la máxima calidad. Esto permite ampliar los plazos de entrega, reducir los costes de almacenamiento y asegurar un suministro constante. Una buena capacidad de almacenamiento también implica menos pérdidas durante este periodo, limita las mermas en producción y mejora la rentabilidad.

Armedi. 

¡Increíble perfección que se mantiene durante el almacenamiento!



RESISTENCIA NATURAL AL MILDIU

Next Generation: la mejor defensa contra el mildiu

Nuestras variedades de patata Next Generation resisten naturalmente al mildiu (causado por *Phytophthora infestans*). Así, son resistentes al mildiu durante más tiempo tras la siembra, lo que permite asegurar el rendimiento y ahorrar en productos fitosanitarios.

Levante. 

Cantidad y calidad: ¡preciosa y abundante!



Nuevo!

Nuevas variedades

Nos complace compartir un adelanto de nuestras prometedoras nuevas variedades de patata. Actualmente se encuentran en los test finales y aún no están disponibles para la venta. Aquí podrá obtener en exclusiva un “avance del futuro” del cultivo de la patata. ▶▶

Chester

(AR 13-2694).



Transformación
Patatas fritas de bolsa
(chips) Copos

Variedad semi temprana para chips resistente al G. Pallida, tamaño uniforme de los tubérculos, buen contenido de materia seca y buena tolerancia a los golpes.

- » Buena tuberización y rendimiento alto
- » Buena calidad de frito, incluso tras una larga conservación
- » Apta para copos

General characteristics

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamiento: AR 07-4052 x ALICANTE

Plántula: AR 13-2694

Derechos de obtentor: Pendiente

Nuevo!



Chester (AR 13-2694) es una nueva y prometedora variedad para patatas de bolsa procedente del programa de mejora genética de Agrico Research. Esta variedad es el resultado de la hibridación entre AR 07-4052 y Alicante, y destaca por el tamaño uniforme de sus tubérculos, su alto rendimiento y su excelente calidad de procesamiento.

Su característica más notable es su carácter temprano y alto rendimiento. Chester (AR 13-2694) produce un gran número de tubérculos uniformes, de forma redonda u ovalada y con una carne de color amarillo claro.

Esta variedad está especialmente indicada para la industria transformadora por su alto contenido en materia seca (24 %) y su excelente calidad para patatas de bolsa, que se mantiene incluso después del almacenamiento. Es idónea para la producción de patatas de bolsa y copos, por lo estamos ante una variedad muy versátil.

Chester (AR 13-2694) es parcialmente resistente a Pallida 2 y Pallida 3 (7/7). A pesar de su alto contenido en materia seca, la variedad muestra una baja sensibilidad a las magulladuras.

En definitiva, Chester (AR 13-2694) combina unas excelentes características de cultivo, un alto rendimiento y una excelente calidad para patatas de bolsa. Sin duda, esta variedad aportará valor al segmento de las patatas de bolsa, con un gran potencial tanto para el cultivo como para la transformación.

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6

Color claro del brote: -

Color de la flor: blanca

Número de bayas: - / -

Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla

Color de la carne: amarilla clara / 6,5

Finura de la piel: bastante pobre / 5

Forma de los tubérculos: oval redondo

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5

Tuberización: media / 6,5

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5

Dormancia: bastante corta / 5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6

Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7,5

Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7

Daños de recolección: sensible / 5

Metribuzin pre-emergencia: sensible / 5

Metribuzin post-emergencia: bastante sensible / 6,5

Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

CÓMO CULTIVAR

Fertilization¹

Nitrógeno: recomendación estándar.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 10%.

Tratamiento de semilla

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

30/40 mm: 25-27 cm (51.000 plantas/ha)

40/50 mm: 30-32 cm (43.000 plantas/ha)

50/60 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 9 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

agricopotatoes.es/chester

Peso bajo agua: 446

Contenido de materia seca: 24%%

Tipo de cocción: harinosa / C

Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7

Coloración en crudo: muy sensible / 4,5

Calidad para patatas fritas: - / -

Distribución de la materia seca: media / 6

Calidad para chips: buena / 7

Nivel de TGA: 10,9

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5

Mildiu de la hoja: sensible / 5

Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: sensible / 5

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: moderadamente sensible* / 5*

Nematodo dorado Ro 2/3: moderadamente sensible / 5

Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo* / 7*

Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo* / 7*

**Say potato,
say Agrico.**



Sivas

(KO 13-2242).



Variedad de consumo semi tardía, de grandes tubérculos ovales, buena dormancia y buena tolerancia a los golpes.

- ▶ Rendimiento alto
- ▶ Buena resistencia a las virosis y a la sarna
- ▶ Bonita piel fina

General characteristics

Obtento:Konst Research B.V.

Cruzamiento: KO 06-1457 x SAVANNA

Plántula: KO 13-2242

Derechos de obtentor: Pendiente



Sivas es la novedad de este año en el segmento tradicional. Desarrollada por Konst Research B.V. tras cruzar las variedades KO 06-1457 y Savanna, Sivas destaca por sus tubérculos grandes y ovalados, su atractiva piel y su excelente capacidad de almacenamiento.

Esta variedad combina un fuerte crecimiento, un gran desarrollo de las hojas y un alto rendimiento constante. Produce tubérculos grandes y uniformes con piel amarilla y carne de color amarillo claro. Gracias a su larga dormancia, Sivas (KO 13-2242) se adapta muy bien al almacenamiento a largo plazo.

En cuanto a la calidad culinaria, Sivas (KO 13-2242) es una variedad de cocción firme, con un peso medio bajo el agua de 350 gramos y un contenido en materia seca del 19,2 %. Son características que encajan especialmente bien en el mercado tradicional local, donde su aspecto atractivo y su alto rendimiento son siempre grandes ventajas competitivas.

Sivas (KO 13-2242) también presenta una gran resistencia a las enfermedades. Es resistente a Ro 1/4 y a la sarna verrugosa F1, y también muestra una buena tolerancia a la sarna común.

Por su alto rendimiento, su excelente resistencia y su aspecto atractivo, Sivas (KO 13-2242) tiene todas las cualidades necesarias para convertirse en una variedad ideal para la exportación.

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5

Color claro del brote: -

Color de la flor: blanca

Número de bayas: medio / 6

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - firmeza: firme / 8

Color de la piel: amarilla

Color de la carne: amarilla clara / 6

Finura de la piel: por encima de la media / 6,5

Forma de los tubérculos: oval

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5

Tuberización: bastante baja / 5,5

Tamaño de los tubérculos: grande / 8

Regularidad del tamaño: regular / 7

Dormancia: bastante larga / 7,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5

Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible a no sensible / 8

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5

Daños de recolección: - / -

Metribuzin pre-emergencia: - / -

Metribuzin post-emergencia: - / -

Etileno: - / -

CÓMO CULTIVAR

Fertilization¹

Nitrógeno: recomendación estándar - 10%. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Quitar los brotes más de dos veces puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 31 cm (42.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

agricopotatoes.es/sivas

Peso bajo agua: 350

Contenido de materia seca: 19,2%%

Tipo de cocción: firme / A

Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6

Coloración en crudo: - / -

Calidad para patatas fritas: media / 6

Distribución de la materia seca: - / -

Calidad para chips: - / -

Nivel de TGA: 7,4

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): - / -

Mildiu de la hoja: sensible / 5,5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6

Fusarium: ligeramente sensible / 6

Sarna común: ligeramente sensible / 6,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -

Say potato,
say **Agrico.**



Disponibles en todos los mercados

Cada año seleccionamos una serie de variedades que merecen nuestra atención. Estas “variedades destacadas” son selecciones innovadoras que están teniendo una gran repercusión en el mercado o que ya gozan de una buena reputación. Gracias a nuestra amplia gama de variedades, este año hemos decidido dar a conocer dos variedades: una del segmento de transformación y otra del segmento tradicional. ▶▶



Lugano.

Variedad semitardía de transformación, de carne amarilla, con una buena resistencia a los nematodos del quiste de la patata.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Resistencia múltiple
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento

General characteristics

Obtendor:F.J. Vos
Cruzamiento: AR 00-2211 x AR 99-0669
Plántula: VO 07-0289
Derechos de obtendor: 31-12-2048



VARIEDADES DESTACADAS



Transformación
Patatas fritas



Tradicional

CÓMO CULTIVAR

Fertilization¹

Nitrógeno: recomendación estándar.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar + 20%. Se recomienda aplicar el cloruro de potasio con precaución, ya que afecta el contenido de materia seca de los tubérculos.

Tratamiento de semilla

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla. Quitar los brotes más de dos veces puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 22 cm (60.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)
50/55 mm: 36 cm (37.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 °C. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

agricopotatoes.es/lugano

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5
Color claro del brote: rojo
Color de la flor: blanca
Número de bayas: por debajo de la media / 7
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: media / 6
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6
Tuberización: bastante baja / 5
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: larga / 8

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: muy sensible / 4,5

Metribuzin pre-emergencia: ligeramente sensible a no sensible / 8
Metribuzin post-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 394
Contenido de materia seca: 21,4%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5
Coloración en crudo: bastante sensible / 6
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Distribución de la materia seca: buena / 7,5
Calidad para chips: por debajo de la media / 5,5
Nivel de TGA: 6,4

Resistencias

Virus del enrollado: - / -
Virus - Yn: sensible / 5,5
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5,5
Mildiu de la hoja: sensible / 5
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: ligeramente sensible / 6,5
Sarna común: sensible / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 7,5
Antracnosis: ligeramente sensible / 6

Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 3: resistente / 9

Say potato,
say Agrico.



Douwe Werkman
Product Manager

“ Descubra el poder de Lugano, la variedad de patata popular por su impresionante resistencia al nematodo. Con unos grandes tubérculos y excelentes propiedades de procesamiento, Lugano es una gran elección para la industria de las patatas fritas y los mercados tradicionales. Esta variedad, que cuenta con una planta robusta y resistente al nematodo del quiste de la patata y a la sarna verrugosa, así como con una excelente dormancia, es una de las favoritas de los productores y la industria patatera. ¡Obtenga fabulosos resultados con Lugano! ”

Napoleon.

VARIEDADES
DESTACADAS



Transformación
Patatas fritas de
bolsa (chips) Copos

Variedad tardía para patatas fritas de bolsa (chips) con un tamaño uniforme y un alto contenido de materia seca.

- ▶ Buena calidad para patatas fritas de bolsa (chips)
- ▶ Adecuada para la elaboración de copos
- ▶ Buena resistencia a virus

General characteristics

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: ANTINA x ALICANTE
Plántula: AR 10-4637
Derechos de obtentor: 31-12-2051



CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 5
Color claro del brote: rojo violeta
Color de la flor: blanca
Número de bayas: muy alto / 4
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Forma de los tubérculos: redondo oval
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): sensible / 5,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6
Daños de recolección: muy sensible / 4,5

Metribuzin pre-emergencia: ligeramente sensible / 7
Metribuzin post-emergencia: ligeramente sensible / 7
Etileno: 5% menos a 5% más tubérculos / 5

Peso bajo agua: 450
Contenido de materia seca: 24,1%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6
Coloración en crudo: bastante sensible / 6
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Distribución de la materia seca: buena / 7
Calidad para chips: excelente / 8
Nivel de TGA: 4,0

Resistencias

Virus del enrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

CÓMO CULTIVAR

Fertilization¹

Nitrógeno: recomendación estándar - 10%.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar + 20%.

Tratamiento de semilla

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos.

Distancia de plantación

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 9 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.



agricopotatoes.es/napoleon

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.



Adrie Omtzigt
Product Manager

“ Descubra Napoleon, ¡la variedad de patata por excelencia para unas patatas fritas de bolsa de alta calidad! Con su excelente calidad para freír, una distribución uniforme de la materia seca y un mínimo de puntas de azúcar, Napoleon proporciona un producto final magnífico y constante. Esta variedad produce buenos rendimientos y un tamaño muy uniforme, lo que es ideal para el segmento de las patatas fritas de bolsa. Su excepcional resistencia a virus y su adaptación a diferentes condiciones de cultivo hacen de Napoleon una variedad muy robusta. Cuando elige Napoleon, elige calidad y fiabilidad. ”

Say potato,
say **Agrico.**



Paradiso.

VARIEDADES
DESTACADAS

Tradicional

Variedad semitardía con grandes tubérculos y con un excelente rendimiento para el mercado tradicional.

- » Tubérculos grandes
- » Bonita apariencia
- » Buena tolerancia a magulladuras

General characteristics

Obtentor: M. Pot & M. Klaver
Cruzamiento: RODEO x VALOR
Plántula: PK 06-0108
Derechos de obtentor: 31-12-2048



CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6
Color claro del brote: rojo
Color de la flor: morada
Número de bayas: por debajo de la media / 6,5
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5
Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5
Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: ligeramente sensible / 7
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: bastante sensible / 6,5

Metribuzin pre-emergencia: ligeramente sensible a no sensible / 8
Metribuzin post-emergencia: bastante sensible / 6,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 329
Contenido de materia seca: 18,2%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4,5
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: inadecuada / 4
Nivel de TGA: 4,8

Resistencias

Virus del enrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente sensible / 6
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

CÓMO CULTIVAR

Fertilization¹

Nitrógeno: recomendación estándar - 20%. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



agricopotatoes.es/paradiso

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.



Douwe Werkman
Product Manager

“ ¡Paradiso lo tiene todo! Esta variedad da unas cosechas impresionantes con gran cantidad de tubérculos, y también destaca por su consistencia. Su planta robusta hace que Paradiso sea una elección de confianza, incluso en zonas más calurosas. Paradiso es sinónimo de éxito año tras año, rendimientos constantes y patatas preciosas. Únase al resto de clientes satisfechos y descubra la constancia y la calidad que ofrece esta variedad. ¡Cosechas infalibles con Paradiso! ”

Say potato,
say Agrico.



Nuestras variedades 2025/2026

Una visión general de nuestro catálogo

Este catálogo muestra nuestras principales variedades ordenadas por orden alfabético. Cada variedad está marcada con un icono de color para identificar claramente el mercado al que se destina: tradicional, minorista o de transformación. Esta visión general también incluye varias variedades sin licencia que siguen siendo muy valoradas y apreciadas por nuestros clientes.

Con el nuevo sello de calidad Agrico Originals también destacamos las variedades que han demostrado su valor en la práctica durante mucho tiempo y que han transformado para siempre el cultivo de la patata. Se trata de auténticos clásicos que han marcado la diferencia en todo el mundo y que son los pilares de nuestro amplio y diverso catálogo de variedades. ▶▶



Ecológico



Tradicional



Agrico Originals



Al por menor
Frescos, patatas baby, ensalada, especialidades



Transformación
Fécula, patatas fritas de bolsa, copos, patatas fritas, precocinados



Next Generation
Resistencia natural al mildiu

Adato.



Variedad semitardía para la venta al por menor, con tubérculos bastante grandes y un contenido de materia seca bastante alto.

- ▶ Piel de buena calidad
- ▶ Buena tolerancia a la sequía
- ▶ Adecuada para cocer y para frito casero



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: NICOLA x RED BARON
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: crema / 5,5
Finura de la piel: muy buena / 7,5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 374

Contenido de materia seca: 20,4%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9



agricopotatoes.es

Agria.



Variedad tardía de transformación, de carne amarilla, con un buen rendimiento y una calidad muy estable.

- ▶ Excelente calidad para freír
- ▶ Resistencia a múltiples virus
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento



Caractéristiques principales

Obtentor: Böhm
Cruzamiento: QUARTA x SEMLO
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 402
Contenido de materia seca: 21,8%

Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6



agricopotatoes.es/agria

Agata.



Variedad muy temprana de consumo, con un tipo de cocción bastante firme, una atractiva piel lisa y un alto rendimiento.

- ▶ Tubérculos de forma y tamaño uniformes
- ▶ Buena resistencia a virus
- ▶ Buena tolerancia a magulladuras y daños



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: BM 72-0052 x SIRCO
Madurez: muy temprana / 8
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: alta / 8
Dormancia: corta / 4

Peso bajo agua: 316
Contenido de materia seca: 17,6%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/agata

Alouette.



Variedad semitardía de consumo, versátil, de piel roja, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo, adecuada para la producción convencional y ecológica.

- ▶ Buena tolerancia a magulladuras
- ▶ Adecuada para cocer y para frito casero
- ▶ Buena tolerancia a la sequía



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 02-139-1 x LAURA
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 389
Contenido de materia seca: 21,1%

Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 8
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/alouette

Arizona.



Tradicional

Variedad semitemprana de consumo que produce altos rendimientos en diversas condiciones climáticas.

- ▶ Tubérculos de forma y tamaño uniformes
- ▶ Buena tolerancia a la sequía
- ▶ Resistencia a múltiples virus



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 301
Contenido de materia seca: 17%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: /
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6



agripotatoes.es/arizona

Arsenal.



Transformación
 Patatas fritas
 de bolsa (chips),
 Copos

Variedad semitardía, para patatas fritas de bolsa (chips), con una amplia resistencia a los nematodos del quiste de la patata y un buen rendimiento.

- ▶ Resistencia múltiple
- ▶ Adecuada para patatas fritas de bolsa (chips) y copos
- ▶ Alto contenido de materia seca



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 92-1146 x SILVESTER
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 447
Contenido de materia seca: 24%

Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 8
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 8
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agripotatoes.es/arsenal

Armedi.



Transformación
 Patatas fritas

Variedad semitardía de transformación, adecuada para la industria de las patatas fritas.

- ▶ Buena tuberización
- ▶ Adecuada para el almacenamiento a largo plazo
- ▶ Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: TOPAS x BASIN RUSSET
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 402
Contenido de materia seca: 21,8%

Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 7
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5
Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 8
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9



agripotatoes.es/armedi

Artemis.



Tradicional



Al por menor
 Frescas

Variedad semitemprana de consumo, con un excelente rendimiento e ideal para patatas fritas caseras.

- ▶ Excelente calidad para freír
- ▶ Buena tolerancia a magulladuras y daños
- ▶ Múltiples resistencias



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: RIANITA x RENSKA
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5

Peso bajo agua: 375
Contenido de materia seca: 20,4%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: media / 6
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agripotatoes.es/artemis

Babylon.



Variedad tardía de transformación, de carne amarilla, con un buen rendimiento y una calidad muy estable.

- ▶ Excelente calidad para freír
- ▶ Resistencia a múltiples virus
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento



Caractéristiques principales

Obtentor: R.K. Bakker
Cruzamiento: AGRIA MUTANT
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 401

Contenido de materia seca: 21,7%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistencia de campo / 8
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/babylon

Carolus.



Variedad semitardía de consumo, versátil, con atractivos ojos rojos y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- ▶ Para diversos usos
- ▶ Alto contenido de materia seca
- ▶ Tipo de cocción harinoso



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AGRIA x AR 00-94-17
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5

Peso bajo agua: 398
Contenido de materia seca: 21,6%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/carolus

Beyonce.



Variedad semitardía para patatas fritas de bolsa (chips), con un buen contenido de materia seca, adecuada para el almacenamiento a medio plazo y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Buena dormancia
- ▶ Tuberización bastante alta



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 94-2061 x LADY JO
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante larga / 7

Peso bajo agua: 446
Contenido de materia seca: 23,9%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para chips: excelente / 8
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5



agricopotatoes.es/beyonce

Cerisa.



Patata temprana de consumo y especial para ensaladas, de piel roja, con tubérculos pequeños y con un excelente sabor.

- ▶ Tuberización muy alta
- ▶ Excelentes propiedades de sabor y cocción
- ▶ Buena resistencia a virus



Caractéristiques principales

Obtentor: Desmazières
Cruzamiento: FRANCINE x LAURA
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: alta / 9

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 391
Contenido de materia seca: 21,3%
Tipo de cocción: firme / A
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7



agricopotatoes.es/cerisa

Chester

(AR 13-2694).

 **Transformación**
Patatas fritas
de bolsa (chips),
Copos



Variedad semi temprana para chips resistente al G. Pallida, tamaño uniforme de los tubérculos, buen contenido de materia seca y buena tolerancia a los golpes.

- » Buena tuberización y rendimiento alto
- » Buena calidad de frito, incluso tras una larga conservación
- » Apta para copos

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 07-4052 x ALICANTE
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 446

Contenido de materia seca: 24%
Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para chips: buena / 7
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo* / 7*
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo* / 7*
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/chester

Corazon.

 Tradicional
 Al por menor
Frescas



Variedad semitemprana de consumo, de piel roja y con un buen rendimiento precoz.

- » Piel de excelente calidad
- » Tipo de cocción bastante firme
- » Resistencia múltiple

Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: EVOLUTION x MANITOU
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 321

Contenido de materia seca: 17,8%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9



agricopotatoes.es/corazon

Constance.

 Tradicional
 Al por menor
Frescas



Variedad semitemprana de consumo, de piel amarilla brillante y carne de color amarillo claro.

- » Bonita apariencia
- » Tubérculos de tamaño uniforme
- » Tipo de cocción bastante firme

Caractéristiques principales

Obtentor: J.L. Spijkman
Cruzamiento: MARABEL x AR 93-1243
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: excelente / 8

Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 358
Contenido de materia seca: 19,7%
Tipo de cocción: bastante firme / AB



agricopotatoes.es/constance

Diamant.

 Tradicional



Variedad semitardía, versátil, con una buena tolerancia al calor, un alto rendimiento y adecuada para patatas fritas caseras.

- » Excelente calidad para freír
- » Buena resistencia a los virus
- » Adecuada para una segunda cosecha

Caractéristiques principales

Obtentor: Precardi
Cruzamiento: CARDINAL MUTANT
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 420

Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 8
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6



agricopotatoes.es/diamant

Ditta.



Patata semitardía, versátil, de consumo y para ensaladas, adecuada para el cultivo convencional y ecológico.

- ▶ Excelente calidad para el consumo
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento
- ▶ Múltiples resistencias



Caractéristiques principales

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Cruzamiento: BINTJE x QUARTA
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante larga / 7

Peso bajo agua: 369
Contenido de materia seca: 20,2%
Tipo de cocción: firme / A
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/ditta

Esmee.



Variedad semitemprana de consumo, de bonita piel roja, con buena tolerancia al calor y un buen rendimiento.

- ▶ Bonita apariencia
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Resistencia a múltiples virus



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LAURA x RODEO
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: media / 6

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 326
Contenido de materia seca: 18%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/esmee

Erika.



Variedad temprana para ensaladas y para la venta al por menor, con un tipo de cocción firme y buena resistencia a la sarna común.

- ▶ Bonita apariencia
- ▶ Tuberización alta
- ▶ Buena resistencia al virus Y



Caractéristiques principales

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Cruzamiento: MARABEL x AR 88-0156
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: bastante alta / 7

Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 337
Contenido de materia seca: 18,6%
Tipo de cocción: firme / A
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 2: /
Nematodo blanco Pa 3: /



agricopotatoes.es/erika

Evolution.



Variedad semitemprana de consumo, con una atractiva piel roja oscura y un buen rendimiento precoz.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Buena tolerancia a la sequía
- ▶ Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 94-0807 x AMOROSA
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: corta / 4
Peso bajo agua: 343
Contenido de materia seca: 18,9%

Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: moderadamente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 7
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 8
Sarna verrugosa F6: resistente / 10



agricopotatoes.es/evolution

Fajah.



Tradicional

Variedad temprana y robusta para consumo, de tubérculos grandes y forma regular, y un contenido de materia seca relativamente alto.

- ▶ Tubérculos grandes y alto rendimiento.
- ▶ Tubérculos de forma oval larga y de tamaño uniforme.
- ▶ Dormancia corta, adecuada para una segunda cosecha.



Caractéristiques principales

Obtentor: R. Rispens
Cruzamiento: LANORMA x AMBITION
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: media / 6
Dormancia: bastante corta / 5,5

Peso bajo agua: 354
Contenido de materia seca: 19,4%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5



agricopotatoes.es/fajah

Jacky.



Ecológico



Al por menor
Patatas baby



Transformación
Precocinadas



next
GENERATION

Variedad semitemprana de consumo, de tamaño pequeño, con un alto rendimiento y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- ▶ Tipo de cocción bastante harinoso
- ▶ Tuberización alta
- ▶ Buena tolerancia a magulladuras y daños



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: ANOUK x ATHLETE
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: alta / 9
Dormancia: bastante corta / 5,5

Peso bajo agua: 368
Contenido de materia seca: 20,1%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9



agricopotatoes.es/jacky

Fontane.



Transformación
Patatas fritas,
Patatas fritas
de bolsa (chips),
Copos



Variedad semitardía de transformación, de alto rendimiento, para la producción de patatas fritas y copos.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Alto contenido de materia seca
- ▶ Adecuada para diferentes tipos de suelo



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: AGRIA x AR 76-034-03
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 430

Contenido de materia seca: 23,2%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: muy buena / 7,5
Calidad para chips: media / 6
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Sarna verrugosa F1: bastante sensible / 6
Sarna verrugosa F6: moderadamente sensible / 8



agricopotatoes.es/fontane

Jolene.




Tradicional



Al por menor
Frescas

Variedad semitardía, con una bonita piel y adecuada para frito casero.

- ▶ Carne de color amarillo claro
- ▶ Adecuada para diferentes platos
- ▶ Buen contenido de materia seca



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: SAGITTA x AR 03-1491
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 389
Contenido de materia seca: 21,1%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: buena / 7



agricopotatoes.es/jolene

Kuroda.



Tradicional

Variedad semitardía de consumo, de piel roja, con una excelente tolerancia al calor y un muy buen rendimiento.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento
- ▶ Resistencia múltiple a la sarna verrugosa

Características principales

Obtenteor: G. Kuik
Cruzamiento: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 426

Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9



agricopotatoes.es/kuroda



Lugano.

¡Grande, amarilla y fritástica!

El poder de la innovación

Variedad semitardía de transformación, de carne amarilla, con una buena resistencia a los nematodos del quiste de la patata.



Transformación
Patatas fritas



Tradicional

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Resistencia múltiple
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento

Encontrará toda la información y los platos técnicos de la variedad spotlight en **página 18** o escanee el código QR.



agricopotatoes.es/lugano

Leonore. (AR 13-1059)



Transformación
Patatas fritas

Variedad temprana para frito, de buen rendimiento precoz y contenido de materia seca.

- ▶ Temprana
- ▶ Buena resistencia a las virosis
- ▶ Tubérculos largo-ovales de piel fina

Características principales

Obtenteor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: EXCELLENCY x AR 06-3754
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 397
Contenido de materia seca: 21,5%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/leonore



Levante.



Variedad semitardía de consumo, de alto rendimiento, con una bonita piel amarilla y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- » Tuberización alta
- » Bonita piel
- » Buena capacidad de almacenamiento

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 01-3218 x ALMERA
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: alta / 8
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 365

Contenido de materia seca: 19,9%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Calidad para chips: /
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5



agricopotatoes.es/levante



Markies.



Variedad tardía, versátil y de alto rendimiento, para patatas fritas y de bolsa (chips), el sector de comida rápida (QSR) y el consumo en fresco.

- » Tubérculos grandes
- » Resistencia múltiple a virus
- » Buena capacidad de almacenamiento

Caractéristiques principales

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamiento: FIANNA x AGRIA
Madurez: tardía / 4
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 427

Contenido de materia seca: 22,8%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 6,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7



agricopotatoes.es/markies



Manitou.



Variedad tardía de consumo, con una atractiva piel roja y un alto rendimiento.

- » Tubérculos grandes
- » Buena tolerancia a la sequía
- » Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata

Caractéristiques principales

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamiento: LAURA x MARANCA
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 351

Contenido de materia seca: 19,4%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/manitou



Melrose.



Semitardía y polivalente. Se caracteriza por su sabor intenso.

- » Tipo de cocción bastante harinoso
- » Carne amarilla
- » Piel roja clara

Caractéristiques principales

Obtentor: C.R.A.
Cruzamiento: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: alta / 8
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 406
Contenido de materia seca: 22%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 7



agricopotatoes.es/melrose



Meryem.



Variedad tardía de consumo, de alto rendimiento y con una bonita piel roja.

- Buena tolerancia a la sequía
- Buena tuberización
- Buena resistencia a virus



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LUSA x AR 01-0420
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: corta / 4

Peso bajo agua: 349
Contenido de materia seca: 19,2%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9



agricopotatoes.es/meryem

Milva.



Variedad tardía de consumo, con una buena resistencia a la sarna común y un rendimiento muy alto.

- Tipo de cocción bastante harinoso
- Tubérculos grandes
- Tuberización alta



Caractéristiques principales

Obtentor: Saatzucht Berding
Cruzamiento: NENA x DUNJA
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: alta / 8

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 380
Contenido de materia seca: 20,7%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6



agricopotatoes.es/milva

Napoleon.

Patata fiable para patatas fritas de bolsa de calidad superior

El poder de la innovación

Variedad tardía para patatas fritas de bolsa (chips) con un tamaño uniforme y un alto contenido de materia seca.



Transformación
Patatas fritas de bolsa (chips) Copos

- Excelente calidad para patatas fritas de bolsa
- Robusta en cualquier circunstancia
- Buena resistencia a virus

Encontrará toda la información y los platos técnicos de la variedad spotlight en **página 20** o escanee el código QR.



agricopotatoes.es/napoleon

Palace.

Variedad tardía de transformación, de alto rendimiento, para la industria de las patatas fritas y apta para el cultivo en diferentes tipos de suelos.

- ▶ Alto contenido de materia seca
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Bonita piel

Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Madurez: tardía / 4,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6

Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 430
Contenido de materia seca: 23,2%
Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5



agricopotatoes.es/palace

Picasso.

Variedad tardía de consumo, de piel amarilla, prominentes ojos rojos, buena resistencia a la sarna común y adecuada para el almacenamiento a largo plazo.

- ▶ Alto rendimiento
- ▶ Buena tolerancia a la sequía
- ▶ Buena tolerancia a magulladuras y daños

Características principales

Obtentor: Duoplant V.O.F.
Cruzamiento: CARA x AUSONIA
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: larga / 8

Peso bajo agua: 381
Contenido de materia seca: 20,8%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: inadecuada / 5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/picasso

Paradiso.

El triplete perfecto: ¡fuerte, fabulosa y abundante!

El poder de la innovación

Variedad semitardía con grandes tubérculos y con un excelente rendimiento para el mercado tradicional.



- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Bonita apariencia
- ▶ Buena tolerancia a magulladuras



Encontrará toda la información y los datos técnicos de la variedad spotlight en **plapágina 22** o escanee el código QR.



agricopotatoes.es/paradiso

Premiere.



Variedad muy temprana para la industria de las patatas fritas, con un buen rendimiento precoz.

- ▶ Para suministro temprano, directamente desde el campo
- ▶ Alto contenido de materia seca
- ▶ Buena distribución de la materia seca



Caractéristiques principales

Obtentor: Precardi
Cruzamiento: CIVA x PROVITA
Madurez: muy temprana / 8
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 416

Contenido de materia seca: 22,4%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas:
por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/premiere

Riviera.



Variedad muy temprana de consumo, de piel atractiva, excelente tolerancia al calor, una buena resistencia a los virus y un buen rendimiento precoz.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Bonita apariencia
- ▶ Buena resistencia a virus



Caractéristiques principales

Obtentor: Mts. Boerhave
Cruzamiento: MINERVA x ALCMARIA
Madurez: muy temprana / 8
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: bastante baja / 5

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 318
Contenido de materia seca: 17,7%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/riviera

Ranomi.



Variedad temprana de consumo, con cierta resistencia a la sarna común y un buen rendimiento precoz.

- ▶ Bonita piel
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Tipo de cocción bastante firme



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 322
Contenido de materia seca: 17,9%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/ranomi

Rudolph.



Variedad semitardía de consumo, con una atractiva piel roja, una buena tolerancia al calor y un rendimiento muy alto.

- ▶ Carne blanca
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: CHIEFTAIN x STIRLING
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: blanca / 4
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: bastante larga / 7
Peso bajo agua: 376

Contenido de materia seca: 20,5%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas:
por encima de la media / 6,5
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5/
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: moderadamente sensible / 8



agricopotatoes.es/rudolph

Sevilla.



Variedad tardía de materia seca alta, delicioso sabor y resistente al mildiu de la hoja.

- ▶ Resistente al mildiu
- ▶ Necesidad de Nitrógeno baja
- ▶ Buena tolerancia a la sequía



Caractéristiques principales

Obtentor: N. Vos
Cruzamiento: AGRIA x DOB 1997-507-015
Madurez: tardía / 4,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: bastante alta / 7

Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 385
Contenido de materia seca: 21%
Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para patatas fritas: muy buena / 7,5
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9



agricopotatoes.es/sevilla

Sinora.



Variedad semitemprana, fácil de cultivar y de alto rendimiento, apta para la recolección temprana para la industria de las patatas fritas o las patatas fritas de bolsa (chips).

- ▶ Para suministro temprano, directamente desde el campo
- ▶ Alto contenido de materia seca
- ▶ Buena resistencia a virus



Caractéristiques principales

Obtentor: J. Schilt
Cruzamiento: AGRIA x AM 70-2166
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 416
Contenido de materia seca: 22,6%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: muy buena / 7,5
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9



agricopotatoes.es/sinora

Sidney.

(AR 12-1680)



Semi tardía, carne blanca, variedad apta para la industria de french fries.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Buena resistencia a las virosis
- ▶ Buena dormancia



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LADY ANNA x AR 05-3392
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: blanca / 4,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 396
Contenido de materia seca: 21,5%

Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 8
Nematodo blanco Pa 3: moderadamente sensible / 6



agricopotatoes.es/sidney

Sivas.

(KO 13-2242)



Variedad de consumo semi tardía, de grandes tubérculos ovales, buena dormancia y buena tolerancia a los golpes.

- ▶ Rendimiento alto
- ▶ Buena resistencia a las virosis y a la sarna
- ▶ Bonita piel fina



Caractéristiques principales

Obtentor: Konst Research B.V.
Cruzamiento: KO 06-1457 x SAVANNA
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: bastante baja / 5,5
Dormancia: bastante larga / 7,5
Peso bajo agua: 350

Contenido de materia seca: 19,2%
Tipo de cocción: firme / A
Calidad para patatas fritas: media / 6
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/sivas

Spectra.



Variedad semitemprana de consumo, de alto rendimiento, con tubérculos de forma muy regular y una atractiva piel lisa.

- » Tubérculos grandes
- » Buena tuberización
- » Tubérculos de tamaño uniforme

Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: ARIELLE x SOFIA
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: muy buena / 7,5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5

Peso bajo agua: 324
Contenido de materia seca: 17,9%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/spectra

Thalia.



Variedad semitardía de consumo, de carne amarilla, con resistencia a los nematodos del quiste de la patata y una buena dormancia.

- » Carne de atractivo color amarillo
- » Tipo de cocción firme
- » Buen contenido de materia seca

Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: BELANA x AR 01-3576
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: larga / 8

Peso bajo agua: 385
Contenido de materia seca: 21%
Tipo de cocción: firme / A
Nematodo dorado Ro 1/4: sensible /
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 8
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 7



agricopotatoes.es/thalia

Spunta.



Variedad semitardía de consumo, de alto rendimiento y con una buena tolerancia al calor.

- » Tubérculos grandes
- » Tubérculos de tamaño uniforme
- » Alto contenido de materia seca

Caractéristiques principales

Obtentor: J. Oldenburger
Cruzamiento: BEA x USDA 96-56
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 387
Contenido de materia seca: 21%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: media / 6
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/spunta

Twinner.



Variedad temprana de consumo, para cultivo convencional y ecológico, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- » Tubérculos grandes
- » Bonita apariencia
- » Tipo de cocción bastante firme

Caractéristiques principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamiento: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 359
Contenido de materia seca: 19,7%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10



agricopotatoes.es/twinner

Twister.

Variedad semitemprana de consumo, para cultivo convencional y ecológico, con un buen rendimiento y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- ▶ Bonita apariencia
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento
- ▶ Tipo de cocción bastante firme

Caractéristiques principales

Obtendor: G.W. te Winkel
Cruzamiento: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: bastante larga / 7

Peso bajo agua: 345
Contenido de materia seca: 19%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 8



agricopotatoes.es/twister

Vogue.

Variedad semitemprana de consumo, con tubérculos grandes y de tamaño uniforme.

- ▶ Tipo de cocción bastante firme
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Tuberización temprana

Caractéristiques principales

Obtenitor: Konst Research B.V.
Cruzamiento: MARABEL x AMOROSA
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante baja / 5,5
Dormancia: bastante corta / 5

Peso bajo agua: 311
Contenido de materia seca: 17,3%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9



agricopotatoes.es/vogue

Notas.

Una mirada al futuro del cultivo de la patata

Nos complace compartir un adelanto de nuestras variedades de patata más recientes y prometedoras. Actualmente se encuentran en la fase final de pruebas y aún no están disponibles para la venta. Aquí tiene un avance exclusivo del “futuro próximo” del cultivo de la patata. »»

AR 14-0334.



Una variedad temprana tradicional y comercial con buen acabado de piel y tamaño.

- ▶ Buena producción
- ▶ Buen acabado de la piel
- ▶ Buen tamaño



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: OS 07-0020 x SAVIOLA
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: bastante corta / 5,5

Peso bajo agua: 332
Contenido de materia seca: 18,3%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: - / -
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

AR 14-3488.



Variedad de ciclo principal, de alto rendimiento, para la industria de papas fritas francesas, adecuada para crecer en diferentes tipos de suelo.

- ▶ Alta producción
- ▶ Alto contenido de materia seca
- ▶ Múltiples resistencias a enfermedades de verrugas



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x AR 07-4113
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 427

Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: moderadamente sensible* / 6*
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*
Sarna verrugosa F6: resistente* / 10*
Sarna verrugosa F18: moderadamente sensible* / 7*


Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

AR 14-2127.



Una variedad semitemprana de procesamiento con buen tamaño y contenido de materia seca.

- ▶ Buena producción y tamaño
- ▶ Muy buena calidad para freír
- ▶ Buen contenido de materia seca



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 07-2176 x AR 08-3491
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 438
Contenido de materia seca: 23,6%
Tipo de cocción: harinosa / C

Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente* / 9*
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo* / 8*
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo* / 7*
Nematodo blanco Pa 3: moderadamente sensible* / 6*
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible* / 7*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

AR 14-3578.



Variedad de ciclo principal para chips, con buena uniformidad en la forma, tamaño de los tubérculos y buen contenido de materia seca.

- ▶ Forma y tamaño regulares
- ▶ Buena calidad para chips, también después de un almacenamiento prolongado
- ▶ Pocos defectos en los tubérculos



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x VR 808
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5

Peso bajo agua: 465
Contenido de materia seca: 24,9%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente* / 9*


Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

AR 16-1404.



Una variedad semitemprana de procesamiento con buen tamaño y forma regular de los tubérculos.

- ▶ Buena tolerancia al tizón en el follaje
- ▶ Resistente al virus Y
- ▶ Buen número de tubérculos



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 10-4512 x JOLENE
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: - / -
Dormancia: bastante corta / 5,5

Peso bajo agua: 389
Contenido de materia seca: 21,20%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: muy buena / 7,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente* / 9*
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 8
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

SW 14-6968.



Variedad de alto rendimiento con calidad para papas fritas caseras y buena tolerancia a la sarna.

- ▶ Buena producción temprana
- ▶ Buen acabado de la piel
- ▶ Buena resistencia a virus



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: LAUDINE x AR 05-1847
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 386

Contenido de materia seca: 21%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistencia de campo* / 8*
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

CR 13-3717.



Una variedad de ciclo principal temprano con tubérculos grandes, adecuada para el mercado de procesamiento.

- ▶ Variedad de nueva generación
- ▶ De alto rendimiento
- ▶ Buena tolerancia a la sarna



Caractéristiques principales

Obtentor: Mts. Crijns-Hop
Cruzamiento: AR 07-3626 x AR 05-3409
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: - / -
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 378

Contenido de materia seca: 20,40%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente* / 9*
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8,5

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

⊕ Las variedades marcadas con este símbolo son variedades de Nueva Generación con genes de resistencia apilados.

SW 14-7008.



Variedad semitemprana de ensalada con tubérculos ovalados y largos, tipo de cocción A y fuerte resistencia al PVY.

- ▶ Buen acabado de la piel
- ▶ Tipo de cocción A
- ▶ Buena resistencia al PVY



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: LORELEY x SW 06-0296
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: alta / 8
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 358
Contenido de materia seca: 19,60%
Tipo de cocción: firme / A
Calidad para patatas fritas: - / -
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente* / 9*
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

SW 14-8034.



Variedad especial temprana para venta minorista, de alto rendimiento, con tubérculos regulares y buen acabado de piel.

- ▶ Variedad temprana y tubérculos regulares
- ▶ Buena resistencia a virus y sarna
- ▶ Buen acabado de la piel



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.	Peso bajo agua: 360
Cruzamiento: CHATEAU x FINESSA	Contenido de materia seca: 19,7%
Madurez: muy temprana / 8	Tipo de cocción: bastante firme / AB
Color de la carne: amarilla clara / 6	Calidad para patatas fritas: - / -
Finura de la piel: muy buena / 7,5	Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Tuberización: bastante alta / 7	Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*
Dormancia: media / 6	

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

TW 17-1410.



Variedad de ciclo principal temprano con piel roja, resistente al tizón tardío en follaje y tubérculo, adecuada para producción convencional y orgánica.

- ▶ Alta producción
- ▶ Buena resistencia a virus
- ▶ Color de piel hermoso



Caractéristiques principales

Obtentor: G.W. te Winkel	Contenido de materia seca: 20%
Cruzamiento: ALOUETTE x AR 09-4077	Tipo de cocción: bastante firme / AB
Madurez: semitardía / 5,5	Calidad para patatas fritas: - / -
Color de la carne: amarilla clara / 6,5	Nematodo dorado Ro 1/4: resistencia de campo* / 8*
Finura de la piel: buena / 7	Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Tuberización: - / -	Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Dormancia: bastante corta / 5	Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*
Peso bajo agua: 366	

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Las variedades marcadas con este símbolo son variedades de Nueva Generación con genes de resistencia apilados.

SW 15-6459.



Variedad semitemprana para venta minorista con tubérculos ovalados y buen acabado de piel.

- ▶ Buen acabado de la piel
- ▶ Buena producción
- ▶ Cocción bastante firme



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.	Contenido de materia seca: 21,50%
Cruzamiento: REGINA x SA06-0104	Tipo de cocción: bastante firme / AB
Madurez: semitemprana / 6,5	Calidad para patatas fritas: - / -
Color de la carne: amarilla / 7	Nematodo dorado Ro 1/4: moderadamente sensible* / 6*
Finura de la piel: bastante pobre / 5	Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5
Tuberización: - / -	Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*
Dormancia: bastante corta / 5,5	
Peso bajo agua: 397	

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Genética y experiencia compartidas en todo el mundo

Agrico no solo exporta patatas de siembra desde los Países Bajos. También nuestra genética y nuestros conocimientos germinan en todo el mundo. Nuestras variedades exclusivas con licencia* ayudan a nuestros clientes a desarrollar sus mercados con variedades de alto valor añadido a partir del cultivo in vitro de tejidos. Nos enorgullece presentar nuestras mejores variedades con licencia. ▶▶

** En los Países Bajos, estas variedades no se cultivan como patatas de siembra.*

Agostino.



Allstar.



Almera.



Anouk.



Ardeche.



Arrow.



Bellanita.



Chateau.



Corsica.



Excellency.



Fyone.



Gourmandine.



Janick (PL 13-0304).



Nofy.



Prince.



Rousseau.



Volare.



Nombre	Página	Cultivo	Segmento de mercado				Sellos	Características								Resistances							
								Madurez	Color de la piel		Color de la carne	Forma de los tubérculos	Contenido de materia seca	Tipo de cocción	Calidad para chips	Calidad para patatas fritas	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Mildiu de la hoja	Mildiu del tubérculo	
Adato	26		✓	Frescas				6	A	5,5	OL	20,4		BC	6,5	9	-	-	-	5	7,5		
Agata	26		✓	Frescas				8	A	6	O	17,6		AB		9	-	-	-	5	6		
Agria	27	✓	✓	Frescas	Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa (chips), Precocinadas		✓	5	A	7	OL	21,8		BC	8	9	-	2	2	5,5	7		
Alouette	27	✓	✓	Frescas	Precocinadas	✓		6	R	7,5	OL	21,1		AB	6,5	9	8	-	-	9	9		
AR 14-0334	56		✓					7,5	A	6,5	OL	18,3		AB		1*	-	-	-	3,5	6		
AR 14-2127	56				Patatas fritas			7	A	6	O	23,6		C	8	9*	-	4*	5*	4,5	-		
AR 14-3488	57				Patatas fritas			5,5	A	6	OL	23		C	7	6*	-	-	-	4	5,5		
AR 14-3578	57				Patatas fritas de bolsa (chips)			5	A	6	OR	24,9		BC		9*	-	-	-	4,5	5		
AR 16-1404	58		✓		Patatas fritas	✓		6,5	A	7	O	21,2		AB	7,5	9*	-	-	-	8	-		
Arizona	28		✓					7	A	6	O	17		AB		9	-	-	-	4	5		
Armedi	28				Patatas fritas			5,5	A	6	OL	21,8		C	8	9	7	9	8	4	7,5		
Arsenal	29				Patatas fritas de bolsa (chips), Copos			5,5	A	6	RO	24		BC		9	8	9	8	4,5	5,5		
Artemis	29		✓	Frescas				7	A	6	OL	20,4		B	6	9	-	-	-	5	8		
Babylon	30		✓	Frescas	Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa (chips), Precocinadas			5	A	7	OL	21,7		BC	8	8	-	-	-	5,5	6,5		
Beyonce	30	✓			Patatas fritas de bolsa (chips), Copos	✓		6	A	6,5	OR	23,9		BC		4	-	-	-	8,5	7,5		
Carolus	31	✓	✓	Frescas		✓		6	A/R	7	O	21,6		BC	7	-	-	-	-	9	9		
Cerisa	31			Ensaladas				7,5	R	7	L	21,3		A		-	-	-	-	4	7		
Chester (AR 13-2694)	12, 32				Patatas fritas de bolsa (chips), Copos			6	A	6,5	OR	24		C		4*	2*	8*	7*	5	5		
Constance	32		✓	Frescas				7	A	6,5	OR	19,7		AB		-	-	-	-	5	4,5		
Corazon	33		✓	Frescas				7	R	6	OL	17,8		AB		9	9	-	-	4,5	6,5		



Nombre	Página	Cultivo	Segmento de mercado				Sellos	Características								Resistances							
								Madurez	Color de la piel		Color de la carne	Forma de los tubérculos	Contenido de materia seca	Tipo de cocción	Calidad para chips	Calidad para patatas fritas	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Mildiu de la hoja	Mildiu del tubérculo	
CR 13-3717	58	✓			Patatas fritas		✓+	6,5	A		6	LO	20,4		B	6,5	9*	-	-	-	8,5	8,5	
Diamant	33		✓					6	A		6	O	23		B	7	9	-	-	-	6	7	
Ditta	34	✓			Frescas, Ensaladas			6	A		6,5	LO	20,2		A		9	-	-	-	5,5	7	
Erika	34				Frescas, Ensaladas			7,5	A		6	LO	18,6		A		9	-	-	-	3,5	4	
Esmee	35		✓		Frescas			6,5	R		7	OL	18		AB		-	-	-	-	4,5	7	
Evolution	35		✓					6,5	R		6	OL	18,9		B		9	6	7	5	4	6	
Fajah	36		✓					5,5	A		6	LO	19,4		BC	7	9	-	3	2	4	5,5	
Fontane	36				Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa (chips), Copos		✓	5,5	A		6,5	O	23,2		BC	7,5	9	-	-	-	5	6,5	
Jacky	37	✓			Patatas baby	Precocinadas	✓	6,5	A		6,5	RO	20,1		B		9	-	-	-	9	9	
Jolene	37		✓		Frescas			6	A		6	OL	21,1		B	7	-	-	-	-	4	5	
Kuroda	38		✓					6	R		6	O	23		BC	5,5	9	-	-	-	5	5	
Leonore (AR 13-1059)	38				Patatas fritas			7,5	A		7	LO	21,5		BC	7	9*	-	-	-	3,5	5	
Levante	40	✓	✓		Frescas		✓	5,5	A		6	LO	19,9		B	5,5	9	-	-	-	8,5	7,5	
Lugano	18, 39		✓		Patatas fritas			5,5	A		6,5	OL	21,4		B	7	9	9	9	9	5	5,5	
Manitou	40		✓		Frescas			5	R		6	LO	19,4		B	5,5	9	9	-	-	5	6	
Markies	41		✓		Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa (chips)		✓	4	A		6,5	OL	22,8		BC	8	9	-	-	-	6,5	7	
Melrose	41				Frescas, Especiales	Precocinadas		6	R		7	O	22		B	6,5	-	-	-	-	4	-	
Meryem	42		✓					5	R		6,5	LO	19,2		B		-	-	-	-	4,5	6	
Milva	42				Frescas			5	A		7	O	20,7		B		9	-	-	-	4,5	6	
Napoleon	20, 43				Chips, Flocken			5	A		6,5	RO	24,1		BC		9	-	4	2	6	6,5	
Palace	44		✓		Frescas	Patatas fritas de bolsa (chips) Copos		4,5	A		6	O	23,2		C	8	-	-	2	2	5	6,5	



Nombre	Página	Cultivo	Segmento de mercado				Sellos		Características								Resistances							
								Madurez	Color de la piel	Color de la carne	Forma de los tubérculos	Contenido de materia seca	Tipo de cocción	Calidad para chips	Calidad para patatas fritas	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Mildiu de la hoja	Mildiu del tubérculo			
Paradiso	22, 45		✓						5,5	A	6	OL	18,2		B		9	-	-	-	5,5	6,5		
Picasso	44		✓						5	A/R	6	O	20,8		B	5	9	-	-	-	5	7		
Premiere	46				Patatas fritas				8	A	6	OR	22,4		BC	6,5	9	-	-	-	4	6		
Ranomi	46		✓	Frescas					7,5	A	6,5	OL	17,9		AB		9	-	-	-	4	6		
Riviera	47		✓						8	A	6	OR	17,7		AB		9	-	-	-	3	5		
Rudolph	47		✓						5,5	R	4	OR	20,5		AB	6,5	-	-	-	-	5,5	5,5		
Sevilla	48	✓			Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa (chips)				4,5	A	7	O	21		C	7,5	-	-	-	-	9	-		
Sidney (AR 12-1680)	48				Patatas fritas				6	A	4,5	LO	21,5		B	6,5	9	4	8	6	4	8		
Sinora	49				Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa (chips)	✓			7	A	6,5	OR	22,6		B	7,5	9	-	4	2	4,5	5		
Sivas (KO 13-2242)	14, 49		✓						5,5	A	6	O	19,2		A	6	9*	-	-	-	5,5	6		
Spectra	50		✓	Frescas					7	A	6	OR	17,9		AB		9	-	-	-	4,5	6		
Spunta	50		✓						6	A	6	L	21		BC	6	-	-	2	2	5,5	5		
SW 14-6968	59			Frescas					7	A	6,5	O	21		B		8*	-	-	-	4	5,5		
SW 14-7008	59			Ensaladas					7	A	6,5	OL	19,6		A		9*	-	6*	3*	3,5	5,5		
SW 14-8034	60			Ensaladas					8	A	6	OL	19,7		AB		1*	-	-	-	3,5	6,5		
SW 15-6459	60				Fertigprodukten				6,5	A	7	RO	21,5		AB		6*	5*	-	-	3	7,5		
Thalia	51			Frescas					5,5	A	7	O	21		A		3	2	8	7	5	7,5		
TW 17-1410	61	✓		Frescas		✓+			5,5	R	6,5	OR	20		AB		8*	-	-	-	9	9		
Twinner	51	✓	✓	Frescas		✓			7,5	A	7	O	19,7		AB		9	-	-	-	8	9		
Twister	52	✓	✓	Frescas		✓			7	A	6,5	RO	19		AB		9	-	-	-	9	9		
Vogue	52		✓						6,5	A	7	OL	17,3		AB		9	-	-	-	4	6		

* Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente. ■

Segmento de mercado

-  Tradicional
-  Retalho
 - Frescas, Patatas baby, Ensaladas, Especiales
-  Transformación
 - Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa, Copos, Fécula

Método de cultivo

-  Ecológico (Apta para el cultivo ecológico)

Variedades Next Generation

- 

Las variedades señaladas con el símbolo Next Generation tienen resistencia natural al mildiu.
- 

Las variedades señaladas con el símbolo Next Generation tienen resistencia natural al mildiu.

Agrico Originals

- 

Las variedades señaladas con el símbolo Agrico Originals, han desempeñado un papel clave en el cultivo mundial de la patata, marcando las diferencias.

Características de la planta y del tubérculo

Madurez	4 Tardía; 4,5 Tardía; 5 Tardía; 5,5 Semitardía; 6 Semitardía; 6,5 Semitemprana; 7 Semitemprana; 7,5 Temprana; 8 Muy temprana; 8,5 Muy temprana; 9 Muy temprana
---------	--

Color claro del brote	RV	rojo violeta
	R	rojo
	AV	azul violeta
	V	violeta
	VV	verde violeta
	V	verde
	VRV	verde rojo violeta
	VR	verde rojo
	RVV	rojo verde violeta
Color de la flor	B	blanca
	MC	morada clara
	M	morada
	AC	azul clara
	A	azul
	V	violeta
	MO	morada oscura
	AM	azul morada
Número de bayas	4 Muy alto; 4,5 Alto; 5 Por encima de la media; 5,5 Por encima de la media; 6 medio; 6,5 Por debajo de la media; 7 Por debajo de la media; 7,5 Bajo; 8 Ninguno	
Follaje - desarrollo inicial	4 Lento; 4,5 Lento; 5 Bastante lento; 5,5 Bastante lento; 6 Medio; 6,5 Medio; 7 Bastante rápido; 7,5 Bastante rápido; 8 Rápido	
Follaje - desarrollo final	4 Insuficiente; 4,5 Insuficiente; 5 Insuficiente; 5,5 Insuficiente; 6 Insuficiente; 6,5 Moderado; 7 Medio; 7,5 Bastante bueno; 8 Bueno	
Follaje - firmeza	4 Frágil; 4,5 Frágil; 5 Bastante frágil; 5,5 Bastante frágil; 6 Media; 6,5 Media; 7 Bastante firme; 7,5 Bastante firme; 8 Firme	
Color de la piel	A	amarilla
	R	roja
	A/R	amarilla con ojos rojos
	ROJ	rojiza
	P	morada

Color de la carne	4 Blanca; 4,5 Blanca; 5 Crema; 5,5 Crema; 6 Amarilla clara; 6,5 Amarilla clara; 7 Amarilla; 7,5 Amarilla; 8 Amarilla intensa; 8,5 Naranja	
Finura de la piel	3 Rojiza; 3,5 Rojiza; 4 Muy pobre; 4,5 Pobre; 5 Bastante pobre; 5,5 Por debajo de la medi; 6 Media; 6,5 Por encima de la media; 7 Buena; 7,5 Muy buena; 8 Excelente	
Forma de los tubérculos	R	redondo
	RO	redondo oval
	OR	oval redondo
	O	oval
	OL	oval largo
	LO	largo oval
	L	largo
Regularidad de la forma de los tubérculos	4 Irregular; 4,5 Irregular; 5 Bastante irregular; 5,5 Bastante irregular; 6 Bastante regular; 6,5 Bastante regular; 7 Regular; 7,5 Regular; 8 Regular	
Tuberización	4 Baja; 4,5 Baja; 5 Bastante baja; 5,5 Bastante baja; 6 Media; 6,5 mMedia; 7 Bastante alta; 7,5 Bastante alta; 8 Alta; 8,5 Alta; 9 Alta	
Tamaño de los tubérculos	4 Pequeño; 4,5 Pequeño; 5 Bastante pequeño; 5,5 Bastante pequeño; 6 Medio; 6,5 Medio; 7 Bastante grande; 7,5 Bastante grande; 8 Grande	
Regularidad del tamaño	4 Irregular; 4,5 Irregular; 5 Bastante irregular; 5,5 Bastante irregular; 6 Bastante regular; 6,5 Bastante regular; 7 Regular; 7,5 Regular; 8 Regular	
Dormancia	4 Corta; 4,5 Corta; 5 Bastante corta; 5,5 Bastante corta; 6 Media; 6,5 Media; 7 Bastante larga; 7,5 Bastante larga; 8 Larga	

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario; Antracnosis; Grietas de crecimiento; Daños de recolección	3 Muy sensible; 3,5 Muy sensible; 4 Muy sensible; 4,5 Muy sensible; 5 Sensible; 5,5 Sensible; 6 Bastante sensible; 6,5 Bastante sensible; 7 Ligeramente sensible; 7,5 Ligeramente sensible; 8 Ligeramente sensible a no sensible	
	Metribuzin pre-emergencia; Metribuzin post-emergencia	
	3 very sensitive; 3,5 very sensitive; 4 very sensitive; 4,5 very sensitive; 5 sensitive; 5,5 sensitive; 6 quite sensitive; 6,5 quite sensitive; 7 slightly sensitive; 7,5 slightly sensitive; 8 slightly to not sensitive	
Etileno	4	5% menos tubérculos
	4,5	5% menos tubérculos
	5	5% menos a 5% más tubérculos
	5,5	5% menos a 5% más tubérculos
	6	5% a 15% más tubérculos
	6,5	5% a 15% más tubérculos
	7	15% a 25% más tubérculos
	7,5	15% a 25% más tubérculos
	8	25% más tubérculos



Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestras propias investigaciones y aún no se han publicado oficialmente. ■

agricopotatoes.es

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Baby potatoes	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
French fries	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasses	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoehheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodes do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Specials	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengröße	Grosseur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra



Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord

Duit 15, 8305 BB Emmeloord

The Netherlands

T +31 (0)527 639911 / E info@agrico.nl

I agricopotatoes.es