


Ditta.

Mångsidig medelsen sort som mat- och salladspotatis, lämplig för konventionell och ekologisk odling.

- ▶ Utmärkt konsumtionskvalitet
- ▶ God lagringsduglighet
- ▶ Flera resistenser

MARKNADSSEGMENT



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Korsning: BINTJE x QUARTA
Nummersort: SW 80-0540
Förädlarrätt: 31-12-2023

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Ljus groddens färg: blå-violett
Blomfärg: vit
Antal bär: ingen / 4
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensharhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7

Köttfärg: ljusgul / 6,5
Skalfärg: gul
Skalfinish: bra / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Knölform: lång oval
Knölens regelbundenhet: jämn / 7
Knölsättning: ganska hög / 7
Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6,5

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: ganska lång / 7
Metribuzin: något känslig / 7
Bentazon: ganska känslig / 6,5
Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): något känslig / 7
Mekaniska skador: känslig / 5,5

Undervattenvikt: 369
Torrsubstanshalt: 20,2%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: -

Chips kvalitet: olämpligt / 4
Friterings kvalitet: under genomsnittet / 5,5
Koktyp: fast / A
Missfärgning efter råskalad: mycket känslig / 4
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6


www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: mottaglig / 5,5

Brunröta: något mottaglig / 7

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 7

Svartpricksjuka: något mottaglig / 6

Rost: mottaglig / 5

Virus - Bladrull: något mottaglig / 7

Virus - A: något till inte mottaglig / 9

Virus - X: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yn: något mottaglig / 7,5

Virus - Yntn (knöl): mottaglig / 5

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -