

Sinora.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Chips, Frites

Een midden vroeg, goed opbrengend en gemakkelijk te telen industrieras voor de vroege frites- en chipsteelt.

- ▶ Vroeg afluand te verwerken
- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Goede virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: J. Schilt
Kruising: AGRIA x AM 70-2166
Zaailing: SI 85-0482
Kwekersrecht: 31-12-2027

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groescheuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschatiging: zeer gevoelig / 4,5

Onderwatergewicht: 416
Drogstofgehalte: 22,6%
Drogstofverdeling: goed / 7
TGA-gehalte: 8,2

Chipskwaliteit: goed / 7
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5



www.agrico.nl/sinora

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 25%. Het gebruik van organische mest wordt afgeraden.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C.

Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: vatbaar / 4

Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 2

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -