

Arnova.

SEGMENT DE MARCHÉ



Une pomme de terre primeur de consommation tolérante à la chaleur, et au rendement élevé sur différents types de sols.

- » Gros tubercules
- » Tubercules de taille très uniforme
- » Très peu sensible aux endommagements à la récolte



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : OBELIX x AR 76-168-01
Numéro de clone : AR 86-0192
Droits d'obteneur : 31-12-2027

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : vert rouge violet
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : nul / 4
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt difficile / 5
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Couleur de la peau : jaune
Finition de la peau : lisse / 7
Taille du tubercule : gros / 8
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : assez faible / 5
Homogénéité de la taille : régulière / 7

Sensibilité et qualité

Dormance : courte / 4
Métribuzine : assez sensible / 6
Bentazone : - / -
Éthylène : - / -

Repousse : assez sensible / 6
Crevasses : peu sensible / 7
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7

Poids sous eau : 331
Matière sèche : 18,3%
Répartition de la matière sèche : - / -
Niveau de glyco-alcaloïde : 2,5

Chipabilité : mauvaise / 4
Fritabilité : mauvaise / 5
Type de cuisson : assez ferme / AB
Grisaillement : - / -
Noircissement après cuisson : sensible / 5


www.agrico.nl/fr/arnova

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard - 10%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)

35/55 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

La température de stockage conseillée est de 5 °C.

Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Say potato,
say **Agrico.**

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3 : - / -

Nématode blanc Pa 2 : - / -

Nématode blanc Pa 3 : - / -

Mildiou du feuillage : sensible / 5,5

Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : sensible / 5

Gale poudreuse : peu sensible / 7

Fusariose : peu sensible / 6

Erwinia : sensible / 5

Dartrose : - / -

Virus du mop top : très sensible / 4,5

Virus - Enroulement : peu sensible / 7

Virus - A : très sensible / 4

Virus - X : peu sensible / 6

Virus - Y : peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique : peu sensible / 7,5

Galle verruqueuse F1 : - / -

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -