


# Rousseau.

Een midden vroeg roodschillig salade ras met een prachtige vorm en een regelmatige sortering.

- ✓ Hoge knolzetting
- ✓ Goede schilhoedanigheid
- ✓ Predikaat chair ferme



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2049
- ⊙ **Kruising:** CECILE x ROSAGOLD
- ⊙ **Zaailingnummer:** SW 08-0012

## Marktsegment

- ⊙ **Retail** | Salade

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	paars
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	5% minder knollen / 4

Doorwas	gevoelig / 5,5
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	378
Drogestofgehalte	20,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	5,9

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

# Rousseau.

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies  
 Fosfaat: standaard advies  
 Kalium: standaard advies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Niet afkiemen.  
 Rousseau kan direct uit de koeling worden gepoot, liefst met een warmtestoot.

## Plantafstand

30/40: 20-22 cm (65000 planten/ha)  
 40/50: 22-26 cm (55000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief schema tegen Phytophthora is nodig, omdat Rousseau zeer vatbaar is.

## Oogst

Rousseau is vrij gevoelig voor rooibeschadiging en weinig gevoelig voor stootblauw, wacht in ieder geval 2 weken na de loofvernietiging voor het rooien.

## Bewaring

Rousseau heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say  
 growth,  
 say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
 Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
 T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)