

# Corsica.


SEGMENTO DE MERCADO

T

**Transformación**  
Patatas fritas de  
bolsa (chips)

Variedad semitardía para patatas fritas de bolsa (chips), con un buen rendimiento y un alto contenido de materia seca.

- ▶ Excelente calidad para patatas fritas de bolsa (chips)
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento
- ▶ Tubérculos de tamaño uniforme



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtendor:** Agrico Research B.V.

**Cruzamiento:** LADY CLAIR x ARG 96-0865

**Plántula:** AR 05-1887

**Derechos de obtendor:** 31-12-2046

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitardía / 5,5

**Color claro del brote:** rojo violeta

**Color de la flor:** blanca

**Número de bayas:** ninguno / 4

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7

**Follaje - desarrollo final:** bueno / 8

**Follaje - selectividad:** bastante fácil / 7

**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7,5

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5

**Color de la piel:** amarilla

**Finura de la piel:** por debajo de la media / 5,5

**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7,5

**Forma de los tubérculos:** redondo oval

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7

**Tuberización:** bastante alta / 7

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** bastante larga / 7

**Metribuzina:** ligeramente sensible / 7

**Bentazona:** ligeramente sensible a no sensible / 8

**Etileno:** 15% a 25% más tubérculos / 7

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6

**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6,5

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible / 7

**Daños de recolección:** bastante sensible / 6

**Peso bajo agua:** 441

**Contenido de materia seca:** 23,7%

**Distribución de la materia seca:** media / 6,5

**Nivel de TGA:** 5,33

**Calidad para chips:** excelente / 8

**Calidad para patatas fritas:** media / 6

**Tipo de cocción:** harinosa / C

**Coloración en crudo:** sensible / 5

**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6



[www.agricopotatoes.com/es/corsica](http://www.agricopotatoes.com/es/corsica)

# CÓMO CULTIVAR

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar - 10%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes una vez es opcional.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 9 °C. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** sensible / 5,5

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente sensible / 6,5

**Sarna común:** ligeramente sensible / 7

**Sarna pulverulenta:** muy sensible / 4,5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 7

**Erwinia:** - / -

**Antracnosis:** sensible / 5,5

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** muy sensible / 4

**Virus del enrollado:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 6

**Virus - Yntn (tubérculo):** sensible / 5,5

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -