

Premiere.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Frites

Een zeer vroeg verwerkingsras met vroeg een goede opbrengst.

- » Vroeg afluand te verwerken
- » Hoog onderwatergewicht
- » Goede drogestofverdeling



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Precardi
Kruising: CIVA x PROVITA
Zaailing: Brands 68-15
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: zeer vroeg / 8
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: gemiddeld / 6,5
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5
Metribuzin: gevoelig / 5
Bentazon: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: - / -
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 416
Drogestofgehalte: 22,4%
Drogestofverdeling: goed / 7,5
TGA-gehalte: 2,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/premiere

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan een ernstige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels


Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -