

Next Generation

Twinner.

Variedade precoce, resistente ao míldio da folha e do tubérculo, para cultivo convencional e biológico.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Polpa bastante firme após cozedura

SEGMENTO DE MERCADO



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

Obtentor: G.W. te Winkel

Cruzamento: MA 98-0032 x AR 00-87-22

Clone: TW 07-0807

Direito do obtentor: 31-12-2046

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5

Brolho de cor clara: violeta vermelha

Cor da flor: branca

Número de bagas: baixo / 4,5

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: médio / 7

Folhagem - seletividade: média / 6

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da polpa: amarela / 7

Cor da pele: amarela

Acabamento de pele: boa / 7

Calibre dos tubérculos: muito grande / 7,5

Forma dos tubérculos: oval redonda

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: muito baixa / 5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Sensibilidade e qualidade

Dormência: média / 6

Metribuzina: bastante sensível / 6,5

Bentazona: ligeiramente sensível / 7,5

Etileno: 15% a 25% mais tubérculos / 7

Segundos crescimentos: bastante sensível / 6,5

Rachamentos: ligeiramente sensível / 7

Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5

Danos mecânicos: bastante sensível / 6,5

Peso debaixo de água: 359

Teor de matéria seca: 19,7%

Distribuição da matéria seca: - / -

Nível TGA: 7,8

Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 5

Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5

Grupo culinário: bastante firme / AB

Descoloração em cru: bastante sensível / 6

Descoloração após cozedura: bastante sensível / 6,5


www.agricopotatoes.com/pt/twinner

COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão + 15%. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberação.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Preferencialmente, plantar os tubérculos em solo quente, uma vez que o desenvolvimento desta variedade é lento.

Distância de plantação

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

Apesar da resistência ao míldio, deve estar-se alerta a possíveis infeções.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistências

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 4

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Erwinia: - / -

Antracnose: ligeiramente suscetível / 6,5

TRV: ligeiramente suscetível / 6

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus - A: - / -

Vírus - X: - / -

Vírus - Yn: ligeiramente suscetível / 7

Vírus - Yntn (tubérculo): muito suscetível / 4

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -