

Severina.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg consumptieras met een goede opbrengst en een mooie heldere schil.

- » Grove knollen
- » Vrij vastkokend
- » Goede schilhoedanigheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
 Kruising: AR 00-0093 x MARIANNE
 Zaailing: KO 08-1715
 Kwekersrecht: 31-12-2049

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
 Kiemkleur: blauw paars
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: geen / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
 Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolgrootte: grof / 8
 Knolvorm: ovaal
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: gemiddeld / 6
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5
 Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: 5% minder knollen / 4
 Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
 Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 326
 Drogestofgehalte: 18%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 7,61

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/severina

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 25%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (54.000 plants /ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -