

Ardeche.

MARKNADSSEGMENT



Ekologisk
odling



Industri
Fingor,
Stärkelse

Tidig stärkelsesort med bra nematod-, bladmögel- och brunrötaresistens. Ardeche är en av våra Next Generation sorter.

- ▶ Bra TS-halter
- ▶ Flera resistenser mot potatiscystnematoder
- ▶ Bra virusresistens



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: STAYER x AR 02-2139
Nummersort: AR 07-2451
Förädlarrätt: 31-12-2048

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Ljus groddens färg: grön-röd
Blomfärg: vit
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: snabb / 8
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Köttfärg: ljusgul / 6,5
Skalfärg: gul
Skalfinish: mycket dålig / 4
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Knölform: rund oval
Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6,5
Knölsättning: ganska låg / 5
Regelbundenhet i storleken: jämn / 7

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: ganska kort / 5,5
Metribuzin: något till inte känslig / 8
Bentazon: något till inte känslig / 8
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6
Stöttblått (inre blåmärken): mycket känslig / 4,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6

Undervattenvikt: 474
Torrsubstanshalt: 25,3%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 4,7

Chips kvalitet: genomsnittligt / 6
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Koktyp: mjölig / C
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5

www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgroddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 20-22 cm (60.500 plantor/ha)

35/55 mm: 25-27 cm (50.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 8 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: resistent / 9

Vit nematod Pa 2: resistent / 9

Vit nematod Pa 3: fältresistent / 7

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 8,5

Potatiskräfta ras 1: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 6: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 18: - / -