



Επόμενης Γενιάς

Levante.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής χρήσης, υψηλής απόδοσης,
κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.

- » Υψηλή κονδυλοποίηση και απόδοση, ιδανική για τηγάνι
- » Υποκίτρινη, ανθεκτική στον περονόσπορο
- » Πολύ καλή αποθήκευση



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.

Διασταύρωση: AR 01-3218 x ALMERA

Σπορόφυτο: AR 07-3009

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2048

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 5,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7

Σχήμα κονδύλου: μακρύ οβάλ

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5

Κονδυλοποίηση: υψηλή / 8

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μέτριος / 6,5

Metribuzin (Sencor): ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Bentazon: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αιθυλένιο: 5% λιγότεροι κόνδυλοι / 4

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6

Βάρος εντός νερού: 365

Στερεά ουσία: 19,9%


Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4,5

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ευαίσθητη / 5,5

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7



agricopotatoes.gr/levante

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Συνιστάται φύτευση σε ζεστό έδαφος, καθώς η αρχική ανάπτυξη είναι αργή. Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 27 cm (49.500 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περωνόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Περωνόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -