ANBAU**EMPFEHLUNG**

Constance.

Mittelfrühe Speisesorte mit hellgelber Schale und hellgelber Fleischfarbe.

- **Ansprechendes Äußeres**
- **Einheitliche Knollengröße**
- **Relativ festkochend**

VERWENDUNGSZWECK

T **Traditionell**

E **Einzelhandel**
Frisch

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: J.L. Spijkman
Kreuzung: MARABEL x AR 93-1243
Setzling: SA 02-0020
Züchterrecht: 31-12-2044

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: blau-violett
Blütenfarbe: weiß
Anzahl Beeren: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Selektierbarkeit: durchschnittlich / 6,5
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7

Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenfarbe: gelb
Schalenqualität: hervorragend / 8
Knollengröße: relativ groß / 7
Knollenform: ovalrund
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7

Empflindlichtkeit und Qualität

Keimruhe: durchschnittlich / 6,5
Metribuzin: leicht empfindlich / 7
Bentazon: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ernteschäden: sehr empfindlich / 4,5

Unterwassergewicht: 358
Trockenmassegehalt: 19,7%
Trockenmasseverteilung: - / -
Gehalt an Glykoalkaloiden: 4,3

Chipsqualität: ungeeignet / 4
Pommes-frites-Qualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6,5
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstelt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

www.agrico.nl/de/constance

PFLANZVORBEREITUNG

Düngung[1]
Stickstoff: Standardempfehlung + 15%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 15%.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen

Pflanzgutbehandlung
Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand
28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 36 cm (37.000 Pflanzen/ha)

Unkraut
Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringerung ergeben.

Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagerung
Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

Say potato, say Agrico.

Resistenzen
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Krautfäule: anfällig / 5
Knollenfäule: sehr anfällig / 4,5

Schorf: etwas anfällig / 6
Pulverschorf: sehr anfällig / 3
Fusarium: etwas anfällig / 6,5
Erwinia: etwas anfällig / 6
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: etwas anfällig / 7
Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8
Virus - Yntn: etwas anfällig / 6,5

Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl www.agrico.nl