

Allstar.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Zetmeel

Een laat zetmeelras met een goede zetmeelopbrengst en brede wratziekte-resistenties.

- » Vrij grove knollen
- » Hoog onderwatergewicht
- » Zeer brede resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: KURAS x SERESTA
Zaailing: SA 05-0204
Kwekersrecht: 31-12-2045

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 4,5
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: crème / 5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: zeer gevoelig / 4
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 508
Drogestofgehalte: 27%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 10,1

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Kooktype: kruimig / C
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4


www.agrico.nl/allstar

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Allstar heeft lange stolonen, hierom het ras niet te diep poten.

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: vatbaar / 4

Aardappelmoeheid Pa 2: weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 4

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8

Fusarium: - / -

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): resistent / 10

Wratziekte F18 (T1): weinig vatbaar / 9