

# Adato.


SEGMENTO DE MERCADO

**T**  
Tradicional

**R**  
Retalho  
Fresco

Variedade de retalho, semitardia, de tubérculos muito grandes e teor de matéria seca bastante elevado.

- ▶ Boa qualidade da pele
- ▶ Boa tolerância à seca
- ▶ Adequada para cozer e assar no forno



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

**Obtento:** Lantmännen Seed B.V.  
**Cruzamento:** NICOLA x RED BARON  
**Clone:** SW 04-0087  
**Direito do obtento:** 31-12-2046

### Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** semitardia / 6  
**Brolho de cor clara:** violeta vermelha  
**Cor da flor:** branca  
**Número de bagas:** superior à média / 6,5  
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** bastante rápido / 7,5  
**Folhagem - desenvolvimento final:** bom / 8  
**Folhagem - seletividade:** média / 6  
**Firmeza da folhagem:** firme / 8

**Cor da polpa:** cremosa / 5,5  
**Cor da pele:** amarela  
**Acabamento de pele:** muito boa / 7,5  
**Calibre dos tubérculos:** muito grande / 7,5  
**Forma dos tubérculos:** oval alongada  
**Regularidade da forma:** bastante regular / 6,5  
**Tuberização:** muito alta / 7  
**Regularidade do calibre:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidade e qualidade

**Dormência:** bastante curta / 5,5  
**Metribuzina:** ligeiramente sensível / 7,5  
**Bentazona:** ligeiramente sensível a não sensível / 8  
**Etileno:** 5% a 15% mais tubérculos / 6

**Segundos crescimentos:** bastante sensível / 6,5  
**Rachamentos:** bastante sensível / 6,5  
**Manchas negras:** bastante sensível / 6,5  
**Danos mecânicos:** bastante sensível / 6

**Peso debaixo de água:** 374  
**Teor de matéria seca:** 20,4%  
**Distribuição da matéria seca:** - / -  
**Nível TGA:** 4,56

**Qualidade para fritura em rodelas:** média / 6  
**Qualidade para fritura em palitos:** superior à média / 6,5  
**Grupo culinário:** farinhenta / BC  
**Descoloração em cru:** ligeiramente sensível / 7  
**Descoloração após cozedura:** bastante sensível / 6,5



[www.agricopotatoes.com/pt/adato](http://www.agricopotatoes.com/pt/adato)

# COMO CULTIVAR

## Fertilização<sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão + 20%. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberação.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão + 10%.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar uma vez é opcional.

## Distância de plantação

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



# Say potato, say Agrico.

## Resistências

**Nemátode dourado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

**Míldio da folha:** suscetível / 5

**Míldio do tubérculo:** ligeiramente suscetível / 7,5

**Sarna comum:** ligeiramente suscetível / 6

**Sarna pulverulenta:** muito suscetível / 2

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Erwinia:** - / -

**Antracnose:** suscetível / 5

**TRV:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus do enrolamento:** - / -

**Vírus - A:** - / -

**Vírus - X:** - / -

**Vírus - Yn:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível / 6

**Verruga negra F1:** ligeiramente suscetível / 9

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -