

Ranomi.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een vroeg consumptieras met een goede schurftresistentie en vroeg een goede opbrengst.

- » Goede schilhoedanigheid
- » Grove knollen
- » Vrij vastkokend



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Zaailing: AR 03-0221
Kwekersrecht: 31-12-2044

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 322
Drogestofgehalte: 17,9%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,08

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/ranomi

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -