

# Kuroda.

TRŽIŠNA NAMJENA



Tradicionalna

Maloprodaja  
Svježa

Srednje kasna sorta crvene boje pokožice, izvrsno podnosi visoke temperature, jako dobrog prinosa.

- ▶ Krupni gomolji
- ▶ Dobro skladištenje
- ▶ Otporna na više tipova bradavičaste bolesti krumpira



## KARAKTERISTIKE

### Opće karakteristike

Uzgajivač: G. Kuik

Križanje: AR 76-199-03 x KO 80-1407

Sjeme: KK 83-0216

### Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6

Boja klice: plavo ljubičasta

Boja cvijeta: ljubičasta

Broj bobica: prosječan / 6

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5

Boja mesa: svjetložuta / 6

Boja pokožice: crvena

Glatkoća pokožice: dobar / 7

Krupnoća gomolja: krupan / 8

Oblik gomolja: ovalan

Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5

Tuberizacija: umjereno mali / 5

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

### Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: duga / 8

Metribuzin: osjetljiv / 5

Bentazon: - / -

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7

Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7

Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6

Oštećenje prilikom berbe: osjetljiv / 5

Podvodna težina: 426

Postotak suhe tvari: 23%

Raspodjela suhe tvari: - / -

TGA razina: -

Kulinarski tip: brašnast / BC

Oksidacija sirovog krumpira: - / -

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): vrlo osjetljiv / 4,5



# KAKO UZGOJITI

## Gnojidba<sup>1</sup>

Dušik: standardne preporuke + 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 20%.

<sup>1</sup> Gnojidba se temelji na analizi tla

## Postupanje sa sjemenom

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Proizvoljno jednokratno uklanjanje klice.

## Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

## Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

## Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za dugotrajno skladištenje.



# Say potato, say Agrico.

## Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Obična krastavost: osjetljiv / 5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Fusarium (suha trulež): umjereno do neosjetljiv / 8

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje: - / -

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 6

Virus - A: umjereno do neosjetljiv / 9

Virus - X: osjetljiv / 5,5

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: malo osjetljiv / 9

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -