



Prince.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/
τηγάνι

Όψιμη, υψηλής απόδοσης λευκόσαρκη ποικιλία, ιδανική και για τη βιομηχανία.

- ▶ Σταθερή περιεκτικότητα σε σάκχαρα
- ▶ Πολύ καλή για τηγάνι
- ▶ Πολύ καλή αποθήκευση



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Lantmännen Seed B.V.

Διασταύρωση: ARG 96-0738 x SW 98-2723

Σπορόφυτο: SW 08-1984

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2049

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί

Χρώμα άνθους: ανοικτό μωβ

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 4

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: κανονική / 6

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα σάρκας: λευκό / 4,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: αρκετά πτωχή / 5

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μακρύς / 8

Metribuzin (Sencor): ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Bentazon: - / -

Αιθυλένιο: 5% λιγότεροι κόνδυλοι / 4

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5

Βάρος εντός νερού: 433

Στερεά ουσία: 23,3%


Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / C

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5



agricopotatoes.gr/prince

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +25%.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 22-25 cm (55.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 30-34 cm (42.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 37-39 cm (35.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C.

Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 8

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περωνόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5

Περωνόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ακτινομύκωση: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -