

Corsica.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Chips

Een middenlaat chipsras met een goede opbrengst en een goed onderwatergewicht.

- » Goede chipskwaliteit
- » Goede bewaarbaarheid
- » Midden late rijptijd



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY CLAIR x ARG 96-0865
Zaailing: AR 05-1887
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 441
Drogestofgehalte: 23,7%
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
TGA-gehalte: 5,33

Chipskwaliteit: uitstekend / 8
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: kruimig / C
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/corsica

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -