

Next Generation

Twinner.

MARKTSEGMENT



Biologisch



Traditioneel

Retail
Vers

Een vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met vroeg een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Grove knollen
- » Mooie presentatie
- » Vrij vastkokend



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel

Kruising: MA 98-0032 x AR 00-87-22

Zaailing: TW 07-0807

Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: vroeg / 7,5

Kiemkleur: rood paars

Bloemkleur: wit

Hoeveelheid bessen: weinig / 4,5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5

Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7

Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: geel / 7

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolgrootte: vrij grof / 7,5

Knolvorm: ovaal

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: vrij laag / 5

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6

Metribuzin: redelijk gevoelig / 6,5

Bentazon: weinig gevoelig / 7,5

Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7

Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groei scheuren: weinig gevoelig / 7

Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5

Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 359

Drogestofgehalte: 19,7%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 7,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5

Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/twinner

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 5%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Preventieve bespuitingen zijn niet nodig.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: zeer vatbaar / 4

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -