

Next Generation

Jacky.

Variedade semiprecoce de pequeno calibre (babies), elevado rendimento e resistência ao míldio da folha e do tubérculo.

- » Polpa bastante farinhenta
- » Tuberização elevada
- » Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos



SEGMENTO DE MERCADO



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.

Cruzamento: ANOUK x ATHLETE

Clone: SW 09-0557

Direito do obtentor: 31-12-2049

Características da planta e dos tubérculos

Maduração: semiprecoce / 6,5

Brolho de cor clara: vermelha verde

Cor da flor: roxa clara

Número de bagas: superior à média / 6,5

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5

Folhagem - seletividade: bastante fácil / 7

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Cor da pele: amarela

Acabamento de pele: superior à média / 6,5

Calibre dos tubérculos: médio / 6,5

Forma dos tubérculos: redonda oval

Regularidade da forma: bastante regular / 6,5

Tuberização: alta / 9

Regularidade do calibre: bastante regular / 6

Sensibilidade e qualidade

Dormência: bastante curta / 5,5

Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Bentazona: - / -

Etileno: 15% a 25% mais tubérculos / 7

Segundos crescimentos: bastante sensível / 6

Rachamentos: bastante sensível / 6,5

Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Danos mecânicos: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Peso debaixo de água: 368

Teor de matéria seca: 20,1%

Distribuição da matéria seca: boa / 7

Nível TGA: 12,74

Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 5

Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5

Grupo culinário: bastante farinhenta / B

Descoloração em cru: bastante sensível / 6

Descoloração após cozedura: bastante sensível / 6,5


www.agricopotatoes.com/pt/jacky

COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

Apesar da resistência ao míldio, deve estar-se alerta a possíveis infeções.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistências

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 2

Fusarium: suscetível / 5,5

Erwinia: - / -

Antracnose: ligeiramente suscetível / 6

TRV: ligeiramente suscetível / 6

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus - A: - / -

Vírus - X: - / -

Vírus - Yn: suscetível / 5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Verruga negra F1: - / -

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -