

# Jolene.

SEGMENT DE MARCHÉ

Variété de conservation précoce, avec une belle peau et adaptée aux frites maison.

**T**  
Traditionnelle  
(consommation)

**R**  
Retail  
Frais

- ▶ Excellente qualité de friture
- ▶ Convient pour différents plats
- ▶ Bonne teneur en matière sèche



## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques générales

**Obtenteur** : Agrico Research B.V.  
**Croisement** : SAGITTA x AR 03-1491  
**Numéro de clone** : AR 09-2556  
**Droits d'obteneur** : 31-12-2051

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

**Maturité** : demi-tardive / 6  
**Couleur du germe** : rouge  
**Couleur de la fleur** : blanche  
**Nombre de baies** : assez élevé / 7  
**Feuillage - développement initial** : plutôt rapide / 7,5  
**Feuillage - développement final** : bon / 8  
**Feuillage - épuration** : normale / 6  
**Feuillage - tenue** : plutôt ferme / 7,5

**Couleur de la chair** : jaune beurre / 6  
**Couleur de la peau** : jaune  
**Finition de la peau** : lisse / 7  
**Taille du tubercule** : assez gros / 7,5  
**Forme du tubercule** : oblong long  
**Régularité de la forme** : régulière / 7  
**Tubérisation** : assez élevée / 7  
**Homogénéité de la taille** : régulière / 7

### Sensibilité et qualité

**Dormance** : moyenne / 6  
**Métribuzine** : assez sensible / 6  
**Bentazone** : - / -  
**Éthylène** : - / -

**Repousse** : peu sensible / 7  
**Crevasses** : peu sensible / 7  
**Coups bleus** : peu sensible / 7  
**Endommagement à la récolte** : assez sensible / 6

**Poids sous eau** : 389  
**Matière sèche** : 21,1%  
**Répartition de la matière sèche** : - / -  
**Niveau de glyco-alcaloïde** : -

**Chipabilité** : mauvaise / 5  
**Fritabilité** : bonne / 7  
**Type de cuisson** : légèrement farineuse / B  
**Grisaillement** : peu sensible / 7  
**Noircissement après cuisson** : assez sensible / 6,5



[www.agrico.nl/fr/jolene](http://www.agrico.nl/fr/jolene)

# PRODUCTION

## Fertilisation<sup>1</sup>

**Azote** : conseil standard.

**Phosphore** : conseil standard.

**Potasse** : conseil standard + 10%.

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

## Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)

35/55 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)

## Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

## Fongicides


Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

## Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

## Conservation

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



**Say potato,  
say Agrico.**

## Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : - / -

Nématode doré Ro 2/3 : - / -

Nématode blanc Pa 2 : - / -

Nématode blanc Pa 3 : - / -

Mildiou du feuillage : très sensible / 4

Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 6

Gale poudreuse : peu sensible / 6,5

Fusariose : peu sensible / 6

Erwinia : - / -

Dartrose : - / -

Virus du mop top : peu sensible / 6

Virus - Enroulement : - / -

Virus - A : - / -

Virus - X : - / -

Virus - Y : peu à pas sensible / 8

Virus - Y nécrotique : peu à pas sensible / 8

Galle verruqueuse F1 : - / -

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -