



Vogue.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης

Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, ιδανική για όλους τους τύπους μαγειρέματος. Κατάλληλη και για θερμοκηπιακή και δεύτερη καλλιέργεια, αρκετά ανθεκτική στην ακτινομύκωση και τους νηματώδεις.

- ▶ Κιτρινόσαρκη, με υψηλές αποδόσεις
- ▶ Ωραία λαμπερή εμφάνιση, μεγάλοι ομοιόμορφοι κόνδυλοι
- ▶ Εξαιρετική γεύση



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Konst Research B.V.

Διασταύρωση: MARABEL x AMOROSA

Σπορόφυτο: KO 03-2027

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2046

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 6,5

Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 4

Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5

Metribuzin (Sencor): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Bentazon: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αιθυλένιο: 5% λιγότεροι έως 5% περισσότεροι κόνδυλοι / 5

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6

Βάρος εντός νερού: 311

Στερεά ουσία: 17,3%

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5



agricopotatoes.gr/vogue

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτερου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτερων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για άμεση χρήση ή μετά από σύντομο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περωνόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4

Περωνόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 2

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5

Καρκίνωση 1: ελάχιστα ευαίσθητη / 9

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

