

Allstar.

MARKNADSSEGMENT


Industri
Stärkelse

Stärkelsesort med väldigt högt stärkelseinnehåll och bra resistenser mot potatiskräfta F1, F6 och F18.

- ▶ Ganska stora knölar
- ▶ Hög TS-halt
- ▶ Flera resistenser



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: J.L. Spijkman

Korsning: KURAS x SERESTA

Nummersort: SA 05-0204

Förädlarrätt: 31-12-2045

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4,5

Ljus groddens färg: blå-violett

Blomfärg: vit

Antal bär: ingen / 4

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - renshet: genomsnittlig / 6

Blast - styrka: ganska tålig / 7

Köttfärg: ljusgul / 5

Skalfärg: gul

Skalfinish: ganska dålig / 5

Knölstorlek: ganska stora / 7

Knölform: rund oval

Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6

Knölsättning: ganska hög / 7

Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Metribuzin: något till inte känslig / 8

Bentazon: något till inte känslig / 8

Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: något känslig / 7

Stöttblått (inre blåmärken): mycket känslig / 4

Mekaniska skador: känslig / 5

Undervattenvikt: 508

Torrsubstanshalt: 27%

Fördelning av torrsubstans: - / -

TGA-nivå: 10,1

Chips kvalitet: olämpligt / 5

Friterings kvalitet: olämpligt / 4

Koktyp: mjölig / C

Missfärgning efter råskalad: - / -

Grå missfärgning (efter kokning): mycket känslig / 4


www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 5 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgröddning rekommenderas. En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Föredras att avgroddas en gång.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantor/ha)

Allstar har långa stoloner, så plantera sorten inte för djupt.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: mottaglig / 4

Vit nematod Pa 2: något mottaglig / 6

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 4

Bladmögel: något mottaglig / 6

Brunröta: något mottaglig / 6,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: något till inte mottaglig / 8

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: mottaglig / 5,5

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 1: något mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 6: resistent / 10

Potatiskräfta ras 18: något mottaglig / 9