

# Constance.

Srednje rana sorta jarkožute žute boje pokožice i svjetložute boje mesa.

- ▶ Lijep izgled
- ▶ Ujednačena veličina gomolja
- ▶ Čvrst pri kuhanju

TRŽIŠNA NAMJENA



Tradicionalna



Maloprodaja  
Svježa



## KARAKTERISTIKE

### Opće karakteristike

Uzgajivač: J.L. Spijkman

Križanje: MARABEL x AR 93-1243

Sjeme: SA 02-0020

### Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 7

Boja klice: plavo ljubičasta

Boja cvijeta: bijela

Broj bobica: prosječan / 6

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6,5

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7

Boja mesa: svjetložuta / 6,5

Boja pokožice: žuta

Glatkoća pokožice: izvrstan / 8

Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7

Oblik gomolja: ovalno okrugli

Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7

Tuberizacija: prosječan / 6

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

### Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: prosječna / 6,5

Metribuzin: malo osjetljiv / 7

Bentazon: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7

Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7

Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8

Oštećenje prilikom berbe: vrlo osjetljiv / 4,5

Podvodna težina: 358

Postotak suhe tvari: 19,7%

Raspodjela suhe tvari: - / -

TGA razina: 4,3

Kulinarski tip: umjereno čvrst / AB

Oksidacija sirovog krumpira: umjereno osjetljiv / 6,5

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6,5



# KAKO UZGOJITI

## Gnojidba<sup>1</sup>

**Dušik:** standardne preporuke + 15%.

**Fosfat:** standardne preporuke.

**Kalij:** standardne preporuke + 15%.

<sup>1</sup> Gnojidba se temelji na analizi tla

## Postupanje sa sjemenom

Pravilno naklijavanje nakon ukljanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

## Razmak sadnje

28/35 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 36 cm (37.000 biljaka/ha)

## Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću, ali rijetko utječe na smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

## Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.



# Say potato, say Agrico.

## Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: - / -

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: vrlo osjetljiv / 4,5

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 3

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6,5

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 7

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 6,5

Bradavičasta bolest krumpira F1: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -