

Loreley.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg saladeras met een goede knolzetting en een goed onderwatergewicht.

- » Vastkokend
- » Mooie presentatie
- » Goede Y-virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: MA 98-0322 x AR 98-0341
 Zaailing: AR 05-1440
 Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenvroeg / 7
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: geen / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: geel / 7,5
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
 Knolgrootte: vrij grof / 7
 Knolvorm: lang ovaal
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: vrij hoog / 7
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
 Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
 Bentazon: weinig gevoelig / 7
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 359
 Drogestofgehalte: 19,7%
 Drogestofverdeling: uitstekend / 8
 TGA-gehalte: 8,45

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
 Kooktype: vastkokend / A
 Rauwverkleuring: gevoelig / 5
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/loreley

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/40 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -