

Gourmandine.


MARKNADSSEGMENT



Matpotatis
Matpotatis

En tidig matpotatissort och salladsspecialitet med ett attraktivt slätt skal och en behaglig fyllig smak.

- ▶ Fast kokning
- ▶ Snygg presentation
- ▶ God lagringsduglighet



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Bretagne Plants
Korsning: CHARLOTTE x ESTIMA
Nummersort: 92 F 229-11
Förädlarrätt: 31-12-2032

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 7
Ljus groddens färg: röd-violett
Blomfärg: lila
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: normal / 6
Blast - slutlig utveckling: medel / 7
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7

Köttfärg: ljusgul / 6,5
Skalfärg: gul
Skalfinish: bra / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Knölform: lång oval
Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6,5

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: lång / 8
Metribuzin: något till inte känslig / 8
Bentazon: ganska känslig / 6,5
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6

Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblått (inre blåmärken): något känslig / 7
Mekaniska skador: något känslig / 7

Undervattenvikt: 354
Torrsubstanshalt: 19,4%
Fördelning av torrsubstans: utmärkt / 8
TGA-nivå: 5,2

Chips kvalitet: olämpligt / 4
Friterings kvalitet: genomsnittligt / 6
Koktyp: fast / A
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6

www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

30/40 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för lång lagring.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: mycket mottaglig / 4,5

Brunröta: något mottaglig / 6

Vanlig skorv: mycket mottaglig / 4,5

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: mycket mottaglig / 4

Svartpricksjuka: mottaglig / 5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: något mottaglig / 6

Virus - A: något till inte mottaglig / 9

Virus - X: mycket mottaglig / 4

Virus - Yn: något mottaglig / 6

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 1: resistent* / 10*

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -

* Resultat markerade med en asterisk (*) är baserade på vår egen forskning och har ännu inte publicerats officiellt.