2026
2027

# Portfolio



VARIETIES
OF LIFE

Say potato,
say Agrico.

AGRICO

# VARIETIES **OF LIFE**

**Die Welt, in der wir Kartoffeln anbauen und vermarkten, verändert sich kontinuierlich. Der Klimawandel, neue gesetzliche Vorgaben und der zunehmende Wunsch nach einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion stellen die gesamte Kartoffellieferkette vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig wächst weltweit die Nachfrage nach ausreichenden Mengen gesunder, bezahlbarer Lebensmittel**

Foür Agrico beginnt die Antwort auf diese Entwicklungen bei der Sorte. Weil eine Sorte für Agrico weit mehr als nur eine Kartoffel ist. Sie leistet einen Beitrag zu guten Erträgen, liefert marktgerechte Lösungen und hilft letztendlich dabei, die Ernährungssicherheit für die wachsende Weltbevölkerung zu gewährleisten. Dafür steht „Varieties of Life“.

Märkte, Klima und Anbaubedingungen sind weltweit verschieden. Deshalb entwickeln und liefern wir ein umfangreiches Sortiment an Kartoffelsorten, deren Eigenschaften jeweils auf spezifische Bedingungen, Absatzmärkte und Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, kontinuierlich auf die Wünsche von Erzeugern, Kunden und Verbrauchern rund um den Globus einzugehen.

Sorten, die von Natur aus robust sind, sind ein wichtiger Bestandteil unseres Sortiments. Mit „Stronger by Nature“ konzentrieren wir uns auf innovative Sorten, die von Natur aus leistungsstark sind und Agrico dabei helfen, die Herausforderungen von heute und morgen zu meistern. Sie benötigen weniger Pflanzenschutzmittel, gewährleisten aber hohe Erträge. So entwickeln wir Sorten, die einen Beitrag zu einer starken und zukunftsfähigen Landwirtschaft leisten.

Unsere Next Generation-Sorten sind hierfür ein gutes Beispiel. Ihre natürliche Phytophthora-Resistenz senkt den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln im Anbau und bietet Erzeugern wie Abnehmern größere Sicherheit. Gleichzeitig blicken wir nach vorn und entwickeln neue Sortengenerationen, die noch besser auf veränderte Bedingungen abgestimmt sind.

„Varieties of Life“ umfasst weit mehr als Genetik und Produkteigenschaften. Es steht auch für Wissensaustausch, die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, Erzeugern und Partnern sowie das internationale Netzwerk, in dem wir tätig sind. Es steht für Sorten, die vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Teilen der Welt bieten und dabei stets dasselbe Ziel verfolgen: einen Beitrag zu einem zukunftsfähigen Kartoffelanbau und zur Ernährungssicherheit für künftige Generationen zu leisten.

Auf diese Weise bauen wir Tag für Tag ein Sortiment an Sorten auf, die für unterschiedliche Klimazonen, Märkte und Generationen geeignet sind. Sorten, die sich heute bewähren und zu den Lösungen von morgen beitragen. ■



**Mark Zuidhof**
Geschäftsführer



# Inhalt.














2 Vorwort
4 Varieties of Life
8 Neue Sorten 2026
18 Spotlight-Sorten
28 Unsere Sortens
56 Künftige Sorten
62 Lizenzsorten
64 Index
70 Legende
74 Fachbegriffes
79 Andere Sprachen


**Disclaimer**
Die vorliegenden Sortenbeschreibungen wurden von Agrico mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dessen ungeachtet können Angaben geändert werden und Agrico übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. In keinem Fall haftet Agrico für Schäden, die sich aus den Angaben in den vorliegenden Beschreibungen ergeben oder damit zusammenhängen.

# VARIETIES OF LIFE




**Die Welt ist von Unterschieden geprägt. Unsere Sorten müssen diesen Unterschieden gerecht werden. Jede Sorte hat einen spezifisches Zweck: Sie muss den Anforderungen der Menschen, die mit ihr arbeiten, des Marktes, für den sie bestimmt ist, und der Bedingungen, unter denen sie angebaut wird, entsprechen. Von der lokalen Verwendung bis hin zu Ertrag, Qualität und Zuverlässigkeit: Jede Sorte wurde entwickelt, um ganz bestimmte Anforderungen zu erfüllen.**

Denn bei Agrico entwickeln wir bloß Kartoffelsorten. Wir entwickeln Sorten, die ihren Wert genau dort unter Beweis stellen, wo es zählt: bei den Menschen, die mit ihnen arbeiten, auf den Märkten, für die sie bestimmt sind, und unter den Bedingungen, unter denen sie wachsen.

## Dafür steht „Varieties of Life“

Seit über 50 Jahren reicht unser Blick weit über die einzelne Kartoffel hinaus. Mit unserer Züchtung und Forschung zielen wir darauf ab, Sorten zu entwickeln, die den Anforderungen einer sich ständig verändernden Welt gerecht werden. Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein umfangreiches Sortensortiment für verschiedene Anbaubedingungen, Verwendungszwecke und Marktanforderungen auf der ganzen Welt.

Wir richten den Fokus dabei nicht nur auf die Anforderungen von heute. Unsere Sorten müssen auch den Herausforderungen von morgen gewachsen sein. Deshalb investieren wir kontinuierlich in starke Genetik, Wissen und Züchtung. „Stronger by Nature“ zeigt, wie wir dieses Ziel erreichen: mit Sorten, die von Natur aus robust sind, Pflanzenschutzmittel effizient nutzen und unter den unterschiedlichsten Bedingungen zuverlässige Erträge bieten.

Der Wert einer Sorte ergibt sich jedoch nicht nur aus der Züchtung allein. Auch in der Praxis muss er sich beweisen. Deshalb setzen wir auf weltweite Zusammenarbeit sowie Wissensaustausch und verbinden lokale Erfahrung mit internationalem Know-how. So schaffen wir gemeinsam eine starke Kartoffellieferkette.

„Varieties of Life“ hat überall auf der Welt eine andere Bedeutung, verfolgt aber immer dasselbe Ziel: Sorten zu entwickeln, die für Menschen, Märkte und die Welt von morgen einen Mehrwert bieten.

Wir entwickeln nicht bloß Kartoffelsorten. Wir entwickeln Sorten für Menschen, Kulturen, Märkte und Klimazonen.

**Bei unseren Sorten geht es um mehr als nur um die Knollen selbst. Im Zusammenspiel mit unserem Wissen, unserer Erfahrung und unseren weltweiten Kooperationen leisten sie einen Beitrag zur Ernährungssicherheit, zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft und zu robusten Kartoffellieferketten. So nimmt „Varieties of Life“ in der Praxis Gestalt an.**

## Zukunftsfähige Landwirtschaft

Unsere Sorten sind für die sich verändernden Bedingungen geeignet und leisten einen Beitrag zu einem robusten, effizienten und nachhaltigen Kartoffelanbau.

## Ernährungssicherheit

Unsere Sorten tragen zu einem zuverlässigen Kartoffelanbau bei und ermöglichen es, den künftigen Bedarf an ausreichend gesunden und erschwinglichen Lebensmitteln zu decken.

## Weltweite Zusammenarbeit

Durch die Verknüpfung internationaler Expertise mit dem Wissen und der Erfahrung vor Ort entwickeln wir Sorten, die auf unterschiedliche Märkte, Anbaubedingungen und Verwendungszwecke zugeschnitten sind.

## Wissensaustausch & Entwicklung der Wertschöpfungskette

Wissensaustausch und Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützen unsere Sorten dabei, ihren Wert in der Praxis unter Beweis zu stellen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer robusten Kartoffellieferkette zu leisten.



FELIZ

SW 14-7008

JAMAICA

AR 14-0334

OREGON

AR 14-3578

TEXAS

AR 14-3488

NEU!

# Neue sorten

**Wir freuen uns, vier vielversprechende neue Sorten in unser Sortiment aufnehmen zu können: Feliz (SW 14-7008), Jamaica (AR 14-0334), Texas (AR 14-3488) und Oregon (AR 14-3578).**

Nach umfangreichen Feldversuchen und Prüfungen haben alle vier Sorten die offizielle Marktzulassung erhalten. Mit der Aufnahme in die niederländische Sortenliste 2026 können Feliz, Jamaica, Oregon und Texas nun unter ihrem jeweiligen Namen vermarktet werden.

# Feliz
(SW 14-7008).

**Einzelhandel**
Salatsorten

**Eine zweitfrühe Salatsorte mit oval-langen Knollen, Kochtyp A und starker PVY-Resistenz.**

- **Gute Schalenoptik**
- **Kochtyp A**
- **Gute PVY-Resistenz**




## Allgemeine Eigenschaften
**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** LORELEY x SW 06-0296
**Setzling:** SW 14-7008
**Züchterrecht:** Bevorstehend



**Adrie Omtzigt**
*Product Manager*

“Entdecken Sie Feliz (SW 14-7008), die perfekte Kartoffel für frische, köstliche Salate. Feliz (SW 14-7008) verbindet ein ansprechendes Äußeres mit zuverlässigen Erträgen. Die langovale Knollenform, die ansprechende Schale und der gute Geschmack machen die festkochende Kartoffel Feliz (SW 14-7008) zu einer hervorragenden Wahl für den Frischkartoffelmarkt und das Salatsegment im Einzelhandel. Erzeugern bietet die Sorte Feliz mit ihrem hohen Knollenansatz und ihrer guten Resistenz gegen das Y-Virus eine attraktive Kombination aus Produktivität und Zuverlässigkeit. Eine ausgewogene Sorte, die ein ansprechendes Äußeres mit Speisequalität und starken Anbaueigenschaften vereint.”

# ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

### Saatgutbehandlung
Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

### Pflanzabstand
30/50 mm: 20 cm (67.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/feliz

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Lichtkeim:** -
**Blütenfarbe:** weiß
**Anzahl Beeren:** - / -
**Laub - Entwicklung Anfang:** schnell / 8
**Laub - Entwicklung Ende:** gut / 8
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollengröße:** durchschnittlich / 6,5
**Knollenform:** ovallang
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** relativ regelmäßig / 6,5
**Knollenansatz:** viele / 8
**Größenregelmäßigkeit:** relativ regelmäßig / 6,5
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5

## Empfindlichtkeit und Qualität
**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6
**Schwarzfleckigkeit:** leicht bis nicht empfindlich / 8
**Wachstumsrisse:** leicht empfindlich / 7
**Ernteschäden:** leicht bis nicht empfindlich / 8

**Ethylen:** 5% bis 15% mehr Knollen / 6

**Unterwassergewicht:** 358
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** festkochend / A
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** leicht empfindlich / 7
**Rohverfärbung:** sehr empfindlich / 4
**Pommes-frites-Qualität:** - / -
**Trockenmasseverteilung:** - / -
**Chipsqualität:** - / -
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** -

## Resistenzen
**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** etwas anfällig / 7
**Virus - Yntn (Knolle):** kaum bis nicht anfällig / 8

**Pfropfenbildung:** sehr anfällig / 4
**Krautfäule:** sehr anfällig / 3,5
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5

**Fusarium:** - / -
**Schorf:** anfällig / 5
**Pulverschorf:** - / -
**Schwarze Flecken:** - / -

**Warzenkrankheit F1:** resistent* / 10*
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** anfällig* / 4*
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** anfällig* / 3*
**Weiße Nematoden Pa 2:** moderat anfällig* / 5*
**Weiße Nematoden Pa 3:** anfällig* / 3*

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

Say potato, say Agrico.



# Jamaica (AR 14-0334).

Konventionell

Einzelhandel
Frisch

**Eine frühe Handelssorte mit guter Schalenoptik und Größe.**

- **Gute Erträge**
- **Gute Schalenoptik**
- **Gute Größe**




## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** OS 07-0020 x SAVIOLA
**Setzling:** AR 14-0334
**Züchterrecht:** Bevorstehend



**Adrie Omtzigt**
*Product Manager*

“Lernen Sie Jamaica (AR 14-0334) kennen, eine frühe Sorte mit guten Eigenschaften für den Frischkartoffelmarkt. Mit ihren hohen Erträgen, ihrer langovalen Knollenform und ihrer ansprechenden Schale ist Jamaica (AR 14-0334) eine hervorragende Wahl für den Frischkartoffelmarkt und das konventionelle Einzelhandelssegment. Ihre einheitliche Knollenform und -größe tragen zu einem einheitlichen, ansprechenden Aussehen bei. Einen zusätzlichen Vorteil für Erzeuger stellt die starke Resistenz gegen das Y-Virus dar. Jamaica (AR 14-0334) vereint hohe Erträge mit ansprechenden Knollen und zuverlässiger Leistung. Eine vielversprechende Sorte mit großem Potenzial auf dem Frischkartoffelmarkt.”

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** früh / 7,5
**Lichtkeim:** -
**Blütenfarbe:** weiß
**Anzahl Beeren:** überdurchschnittlich / 5
**Laub - Entwicklung Anfang:** schnell / 8
**Laub - Entwicklung Ende:** relativ gut / 7,5
**Laub - Festigkeit:** durchschnittlich / 6,5

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollengröße:** groß / 8
**Knollenform:** ovallang
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** regelmäßig / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Größenregelmäßigkeit:** regelmäßig / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5

## Empflindlichkeit und Qualität

**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6,5
**Schwarzfleckigkeit:** leicht bis nicht empfindlich / 8
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6,5
**Ernteschäden:** relativ empfindlich / 6

**Ethylen:** - / -

**Unterwassergewicht:** 332
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** relativ empfindlich / 6
**Rohverfärbung:** - / -
**Pommes-frites-Qualität:** - / -
**Trockenmasseverteilung:** - / -
**Chipsqualität:** - / -
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** -

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Virus - Yntn (Knolle):** etwas anfällig / 6

**Pfropfenbildung:** etwas anfällig / 6,5
**Krautfäule:** sehr anfällig / 3,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6

**Fusarium:** - / -
**Schorf:** anfällig / 5,5
**Pulverschorf:** - / -
**Schwarze Flecken:** - / -

**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** anfällig* / 1*
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 3:** - / -

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

# ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

### Saatgutbehandlung
Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.

### Pflanzabstand
28/35 mm: 23 cm (58.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.500 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für Auslieferung direkt vom Feld oder für kurze Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/jamaica

Say potato, say Agrico.



# Oregon (AR 14-3578).

**Verarbeitung**
Chips

**Eine gleichmäßige Haupternte-Chips-Sorte mit guter der Knollenform und -größe und hohem Trockenmassegehalt.**

- **Gleichmäßige Form und Größe**
- **Gute Chipsqualität, auch nach Langzeitlagerung**
- **Wenige Knollenfehler**

**NEU!**



## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** LEANDRA x VR 808
**Setzling:** AR 14-3578
**Züchterrecht:** Bevorstehend



**Adrie Omtzigt**
*Product Manager*

“Oregon (AR 14-3578) ist eine zuverlässige Sorte für qualitativ hochwertige Chips. Ihre einheitliche Knollenform und -größe, ihr hoher Trockenmassegehalt und die geringe Anfälligkeit für Flecken machen Oregon (AR 14-3578) zu einer hervorragenden Wahl für das Chipssegment. Auch nach langer Lagerung zeichnet sich die Sorte noch durch ihre Chipsqualität aus und bietet Verarbeitern somit die ganze Saison über wertvolle Flexibilität. Mit ihrer konsistenten Knollenqualität und ihren guten Verarbeitungseigenschaften vereint Oregon (AR 14-3578) Einheitlichkeit, Lagerfähigkeit und zuverlässige Leistung für die Produktion von Chips. Qualität, die bleibt: Oregon (AR 14-3578).”

## ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung + 10%.

### Saatgutbehandlung
Knollen vorzugsweise in angewärmten Boden pflanzen, da die Entwicklung bei dieser Sorte anfangs langsam verläuft.

### Pflanzabstand
30/40 mm: 26 cm (51.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 Pflanzen/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Die optimale Lagertemperatur beträgt 9 °C. Geeignet für mittel- bis langfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/oregon

## EIGENSCHAFTEN

### Kraut- und Knolleneigenschaften
**Reifegruppe:** spät / 5
**Lichtkeim:** -
**Blütenfarbe:** helllila
**Anzahl Beeren:** - / -
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7
**Laub - Entwicklung Ende:** gut / 8
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7,5

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Knollengröße:** relativ groß / 7,5
**Knollenform:** ovalrund
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** relativ regelmäßig / 6,5
**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6
**Größenregelmäßigkeit:** regelmäßig / 7
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5

### Empflindlichtkeit und Qualität
**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6
**Schwarzfleckigkeit:** leicht empfindlich / 7
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6,5
**Ernteschäden:** empfindlich / 5

**Ethylen:** - / -

**Unterwassergewicht:** 465
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** empfindlich / 5
**Rohverfärbung:** relativ empfindlich / 6,5
**Pommes-frites-Qualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Trockenmasseverteilung:** relativ schlecht / 5,5
**Chipsqualität:** gut / 7
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** -

### Resistenzen
**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Virus - Yntn (Knolle):** - / -

**Pfropfenbildung:** anfällig / 5
**Krautfäule:** sehr anfällig / 4,5
**Knollenfäule:** anfällig / 5

**Fusarium:** - / -
**Schorf:** etwas anfällig / 6,5
**Pulverschorf:** - / -
**Schwarze Flecken:** - / -

**Warzenkrankheit F1:** sehr anfällig* / 1*
**Warzenkrankheit F6:** sehr anfällig* / 1*
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 3:** - / -

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

Say potato, say Agrico.



# Texas (AR 14-3488).

**Verarbeitung**
Pommes frites

**Eine ertragreiche Haupternte Verarbeitungssorte für die Pommes-frites-Industrie.**

- **Hoher Ertrag**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Mehrfache Resistenz gegen Kartoffelkrebs**




## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** LEANDRA x AR 07-4113
**Setzling:** AR 14-3488
**Züchterrecht:** Bevorstehend



**Roeland Jensma**
*Product Manager*

“Texas (AR 14-3488) ist eine außergewöhnlich ertragreiche Sorte für die Pommes-frites-Industrie. Mit ihrem hohen Trockenmassegehalt, ihrer guten Pommes-frites-Qualität und ihren großen, gleichmäßig geformten Knollen bietet Texas (AR 14-3488) hervorragende Eigenschaften für die Verarbeitung. Im Zusammenspiel mit der Resistenz gegen mehrere Typen von Kartoffelkrebs vereint Texas (AR 14-3488) Ertragspotenzial und Verarbeitungsqualität mit einem breiten geografischen Anwendungsgebiet. Eine starke, vielseitige Sorte für die Pommes-frites-Produktion.”

# ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

### Saatgutbehandlung
Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.

### Pflanzabstand
28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/texas

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Lichtkeim:** -
**Blütenfarbe:** weiß
**Anzahl Beeren:** durchschnittlich / 6
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7,5
**Laub - Entwicklung Ende:** gut / 8
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7,5

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Knollengröße:** relativ groß / 7,5
**Knollenform:** ovallang
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** regelmäßig / 7
**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6
**Größenregelmäßigkeit:** relativ regelmäßig / 6,5
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

## Empfindlichkeit und Qualität

**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6,5
**Schwarzfleckigkeit:** leicht empfindlich / 7
**Wachstumsrisse:** leicht empfindlich / 7
**Ernteschäden:** empfindlich / 5

**Ethylen:** - / -

**Unterwassergewicht:** 427
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** mehlig / C
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** empfindlich / 5,5
**Rohverfärbung:** sehr empfindlich / 4,5
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Trockenmasseverteilung:** durchschnittlich / 6,5
**Chipsqualität:** - / -
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** -

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** etwas anfällig / 6,5
**Virus - Yntn (Knolle):** etwas anfällig / 6

**Pfropfenbildung:** anfällig / 5
**Krautfäule:** sehr anfällig / 4
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5

**Fusarium:** - / -
**Schorf:** anfällig / 5,5
**Pulverschorf:** - / -
**Schwarze Flecken:** - / -

**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10
**Warzenkrankheit F6:** resistent* / 10*
**Warzenkrankheit F18:** resistent / 10

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 3:** - / -

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

Say potato, say Agrico.



# Auf jedem Markt zu Hause

**Jedes Jahr wählen wir einige Sorten aus, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Diese Sorten überzeugen durch eine starke Marktperformance sowie bewährte Qualität und erfüllen die Anforderungen von Erzeugern und Kunden gleichermaßen.**

Dank unseres umfangreichen, vielfältigen Sortiments gibt es immer eine große Auswahl. In diesem Jahr stellen wir vier Sorten ins Rampenlicht, die sich durch herausragende Eigenschaften auszeichnen: zwei aus dem Verarbeitungssegment, eine aus dem konventionellen Segment und eine aus dem Einzelhandelssegment. Jede hat ihre eigenen Stärken, zeichnet sich durch nachweislich gute Leistungen aus und verfügt über eine etablierte Marktposition.



# Feliz (SW 14-7008).

**Eine zweitfrühe Salatsorte mit oval-langen Knollen, Kochtyp A und starker PVY-Resistenz.**

- **Gute Schalenoptik**
- **Kochtyp A**
- **Gute PVY-Resistenz**

**Einzelhandel**
Salads




## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** LORELEY x SW 06-0296
**Setzling:** SW 14-7008
**Züchterrecht:** Bevorstehend

## ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

### Saatgutbehandlung
Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

### Pflanzabstand
30/50 mm: 20 cm (67.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/feliz

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Lichtkeim:** -
**Blütenfarbe:** weiß
**Anzahl Beeren:** - / -
**Laub - Entwicklung Anfang:** schnell / 8
**Laub - Entwicklung Ende:** gut / 8
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollengröße:** durchschnittlich / 6,5
**Knollenform:** ovallang
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** relativ regelmäßig / 6,5
**Knollenansatz:** viele / 8
**Größenregelmäßigkeit:** relativ regelmäßig / 6,5
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5

## Empflindlichtkeit und Qualität

**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6
**Schwarzfleckigkeit:** leicht bis nicht empfindlich / 8
**Wachstumsrisse:** leicht empfindlich / 7
**Ernteschäden:** leicht bis nicht empfindlich / 8

**Ethylen:** 5% bis 15% mehr Knollen / 6

**Unterwassergewicht:** 358
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** festkochend / A
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** leicht empfindlich / 7
**Rohverfärbung:** sehr empfindlich / 4
**Pommes-frites-Qualität:** - / -
**Trockenmasseverteilung:** - / -
**Chipsqualität:** - / -
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** -

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** etwas anfällig / 7
**Virus - Yntn (Knolle):** kaum bis nicht anfällig / 8

**Pfropfenbildung:** sehr anfällig / 4
**Krautfäule:** sehr anfällig / 3,5
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5


**Fusarium:** - / -
**Schorf:** anfällig / 5
**Pulverschorf:** - / -
**Schwarze Flecken:** - / -

**Warzenkrankheit F1:** resistent* / 10*
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** anfällig* / 4*
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** anfällig* / 3*
**Weiße Nematoden Pa 2:** moderat anfällig* / 5*
**Weiße Nematoden Pa 3:** anfällig* / 3*

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

Say potato, say Agrico.





**Adrie Omtzigt**
*Produktmanager*


“Entdecken Sie Feliz (SW 14-7008), die perfekte Kartoffel für frische, köstliche Salate. Feliz (SW 14-7008) verbindet ein ansprechendes Äußeres mit zuverlässigen Erträgen. Die langovale Knollenform, die ansprechende Schale und der gute Geschmack machen die festkochende Kartoffel Feliz (SW 14-7008) zu einer hervorragenden Wahl für den Frischkartoffelmarkt und das Salatsegment im Einzelhandel. Erzeugern bietet die Sorte Feliz mit ihrem hohen Knollenansatz und ihrer guten Resistenz gegen das Y-Virus eine attraktive Kombination aus Produktivität und Zuverlässigkeit. Eine ausgewogene Sorte, die ein ansprechendes Äußeres mit Speisequalität und starken Anbaueigenschaften vereint.”

# Paradiso.

Konventionell

**Mittelspäte Sorte mit groß wachsenden Knollen und hervorragendem Ertrag für den konventionellen Markt.**

- **Große Knollen**
- **Ansprechendes Äußeres**
- **Gute Hitze- und Trockenheitstoleranz**



## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** M. Pot & M. Klaver
**Kreuzung:** RODEO x VALOR
**Setzling:** PK 06-0108
**Züchterrecht:** 31-12-2048

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Lichtkeim:** rot
**Blütenfarbe:** lila
**Anzahl Beeren:** unterdurchschnittlich / 6,5
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7,5
**Laub - Entwicklung Ende:** relativ gut / 7,5
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollengröße:** groß / 8
**Knollenform:** ovallang
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** relativ regelmäßig / 6,5
**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6
**Größenregelmäßigkeit:** relativ regelmäßig / 6,5
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

## Empflindlichtkeit und Qualität

**Durchwuchs:** leicht empfindlich / 7
**Schwarzfleckigkeit:** leicht empfindlich / 7,5
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6,5
**Ernteschäden:** relativ empfindlich / 6,5

**Ethylen:** 5% bis 15% mehr Knollen / 6

**Unterwassergewicht:** 329
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** relativ empfindlich / 6,5
**Rohverfärbung:** - / -
**Pommes-frites-Qualität:** /
**Trockenmasseverteilung:** - / -
**Chipsqualität:** ungeeignet / 4
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** 4,8 mg/100g

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** etwas anfällig / 6
**Virus - Yntn (Knolle):** etwas anfällig / 7,5

**Pfropfenbildung:** sehr anfällig / 4
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6,5

**Fusarium:** anfällig / 5
**Schorf:** anfällig / 5,5
**Pulverschorf:** etwas anfällig / 7,5
**Schwarze Flecken:** anfällig / 5,5

# ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung - 10%. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

### Saatgutbehandlung
Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

### Pflanzabstand
28/35 mm: 23 cm (58.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 35 cm (38.000 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/paradiso

**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 3:** - / -

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.



**Douwe Werkman**
*Produktmanager*

“Paradiso ist das ideale Gesamtpaket! Diese Sorte ist nicht nur außergewöhnlich ertragreich und bietet eine hohe Knollenzahl, sondern sticht auch bei Ertragssicherheit hervor. Dank der robusten Pflanzen ist die Sorte auch für wärmere Gebiete eine zuverlässige Wahl. Paradiso ist das Synonym für alljährlichen Erfolg: Ertragssicherheit und schöne Kartoffeln sind garantiert. Werden auch Sie Teil der zufriedenen Kunden und entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Qualität von Paradiso.”

Say potato, say Agrico.



# Sidney.

**Verarbeitung**
Pommes frites

**Frühe Haupternte Sorte, cremefleischig, Verarbeitungssorte für die Pommes Frites Industrie.**

- **Grobfallende Knollen**
- **Gute Virusresistenz**
- **Gute Trockenmasseverteilung und geeignet für QSR**



## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** LADY ANNA x AR 05-3392
**Setzling:** AR 12-1680
**Züchterrecht:** 31-12-2054

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Lichtkeim:** -
**Blütenfarbe:** weiß
**Anzahl Beeren:** - / -
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7
**Laub - Entwicklung Ende:** relativ gut / 7,5
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7,5

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** cremefarben / 5
**Schalenqualität:** relativ schlecht / 5
**Knollengröße:** relativ groß / 7,5
**Knollenform:** langoval
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** relativ regelmäßig / 6,5
**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6
**Größenregelmäßigkeit:** relativ regelmäßig / 6,5
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5

## Empflindlichtkeit und Qualität

**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6,5
**Schwarzfleckigkeit:** leicht empfindlich / 7,5
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6,5
**Ernteschäden:** leicht empfindlich / 7

**Ethylen:** 5% weniger bis 5% mehr Knollen / 5

**Unterwassergewicht:** 396
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** leicht empfindlich / 7
**Rohverfärbung:** leicht empfindlich / 7,5
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Trockenmasseverteilung:** hervorragend / 8,5
**Chipsqualität:** - / -
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** 4,3 mg/100g

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Virus - Yntn (Knolle):** etwas anfällig / 7,5

**Pfropfenbildung:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Krautfäule:** sehr anfällig / 4
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8

**Fusarium:** etwas anfällig / 6
**Schorf:** anfällig / 5,5
**Pulverschorf:** etwas anfällig / 6
**Schwarze Flecken:** anfällig / 5,5



# ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung. Vorzugsweise eine höhere Startgabe, eine Nachdüngung je nach Jahr ist optional.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

### Saatgutbehandlung
Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

### Pflanzabstand
28/35 mm: 26 cm (51.000 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 37 cm (36.000 Pflanzen/ha)
50/60 mm: 24 cm (39.000 Pflanzen/ha)3

### Fungizide
Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**
[3] **Sofern das Schneiden von Pflanzkartoffeln für die Speisekartoffelproduktion zulässig ist, sind eine sachgemäße Wundheilung und strenge Hygienemaßnahmen unerlässlich, um Krankheitsrisiken zu minimieren. Das Schneiden und die anschließende Verwendung der Pflanzkartoffeln erfolgen auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung des Anwenders.**

agricopotatoes.de/sidney

**Warzenkrankheit F1:** sehr anfällig* / 1*
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** anfällig / 4
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** anfällig / 4
**Weiße Nematoden Pa 2:** teilweise resistent / 8
**Weiße Nematoden Pa 3:** moderat anfällig / 6

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.






**Roeland Jensma**
*Produktmanager*

“Sidney – auf der Welt für Pommes frites! Mit ihren großen, langovalen Knollen, ihrer hervorragenden Trockenmasseverteilung, ihrem cremefarbenen Fleisch und ihrer überdurchschnittlichen Pommes-frites-Qualität ist Sidney eine perfekte Wahl für das Fast-Food-Segment (QSR-Markt). Diese frühe Hauptfruchtsorte vereint wertvolle Verarbeitungseigenschaften mit guter Virus- und Kartoffelnematoden-Resistenz. Damit gewährleistet sie für Erzeuger einen zuverlässigen Anbau und für Verarbeiter die gewünschte Qualität. Entscheiden Sie sich für erstklassige Qualität, entscheiden Sie sich für Sidney!”

# Napoleon.

**Verarbeitung**
Chips

**Späte Chipssorte mit guter einheitlicher Größe und hohem Trockenmassegehalt.**

- **Gute Chipsqualität**
- **Geeignet für die Verarbeitung von Flocken.**
- **Gute Virusresistenzen**



## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** ANTINA x ALICANTE
**Setzling:** AR 10-4637
**Züchterrecht:** sehr anfällig / 4

## ANBAU

### Fertilization[1]
**Stickstoff:** Standardempfehlung - 10%.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung + 20%.

### Saatgutbehandlung
Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

### Pflanzabstand
30/40 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/60 mm: 38 cm (35.000 Pflanzen/ha)

### Fungizide
Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

### Ernte
Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/ oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

### Lager
Für Verarbeitungszwecke nicht unter 9 °C lagern. Geeignet für mittel- bis langfristige Lagerung.

[1] **Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.**

agricopotatoes.de/napoleon

# EIGENSCHAFTEN

## Kraut- und Knolleneigenschaften
**Reifegruppe:** spät / 5
**Lichtkeim:** rot-violett
**Blütenfarbe:** weiß
**Anzahl Beeren:** sehr viele / 4
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7
**Laub - Entwicklung Ende:** gut / 8
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7,5

**Schalenfarbe:** gelb
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** relativ schlecht / 5
**Knollengröße:** relativ groß / 7,5
**Knollenform:** rundoval
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** regelmäßig / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Größenregelmäßigkeit:** regelmäßig / 7
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

## Empflindlichtkeit und Qualität
**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6,5
**Schwarzfleckigkeit:** empfindlich / 5,5
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6
**Ernteschäden:** sehr empfindlich / 4,5

**Ethylen:** 5% weniger bis 5% mehr Knollen / 5

**Unterwassergewicht:** 450
**Trockenmassegehalt:** %
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** relativ empfindlich / 6
**Rohverfärbung:** relativ empfindlich / 6
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7
**Trockenmasseverteilung:** gut / 7
**Chipsqualität:** hervorragend / 8
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** 4,0 mg/100g

## Resistenzen
**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Virus - Yntn (Knolle):** kaum bis nicht anfällig / 8

**Pfropfenbildung:** anfällig / 5
**Krautfäule:** etwas anfällig / 6
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6,5

**Fusarium:** etwas anfällig / 6,5
**Schorf:** etwas anfällig / 6
**Pulverschorf:** - / -
**Schwarze Flecken:** etwas anfällig / 6

**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -

**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** anfällig / 4
**Weiße Nematoden Pa 3:** anfällig / 2

* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

Say potato, say Agrico.





**Adrie Omtzigt**
*Produktmanager*

“Entdecken Sie Napoleon, die Kartoffelsorte schlechthin für hochwertige Chips! Dank der guten Backqualität, der gleichmäßigen Trockenmasseverteilung und der minimalen Verzuckerung liefert Napoleon kontinuierlich ein hervorragendes Endprodukt. Die Sorte ermöglicht gute Erträge und eine sehr regelmäßige Sortierung, ideal für das Chipssegment. Die hervorragende Virusresistenz und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wachstumsbedingungen machen Napoleon zu einer sehr starken Sorte. Entscheiden Sie sich für Napoleon, dann entscheiden Sie sich für Qualität und Zuverlässigkeit.”

## Unsere sorten 2026/2027

# Eine umfassende Sortimentsübersicht

**In diesem Katalog werden die Hauptsorten aus unserem umfangreichen, vielfältigen Sortiment zur einfachen Orientierung in alphabetischer Reihenfolge präsentiert. Jede Sorte ist mit einem farbigen Symbol versehen, das auf einen Blick klar macht, für welchen Markt sie am besten geeignet ist: Konventionell, Einzelhandel oder Verarbeitung.**

Neben unseren Lizenzsorten umfasst der Katalog auch einige nicht lizenzierte Sorten, die von unseren Kunden immer noch sehr geschätzt werden.

**Biologisch**

**Konventionell**

**Agrico Originals**

**Einzelhandel**
*Frisch, Salat, Spezielle*

**Verarbeitung**
*Stärke, Chips, Flocken, Pommes frites, Fertigprodukten*

**Next Generation**
*Natürliche Phytophthora-Resistenz*

# Agata.

Konventionell | Einzelhandel Frisch

**Sehr frühe, relativ festkochende Speisesorte mit attraktiver glatter Schale und hohen Erträgen.**

- **Gute Lagereigenschaften**
- **Gute Virusresistenzen**
- **Gute Toleranz gegen Flecken und Schäden**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** BM 72-0052 x SIRCO
**Reifegruppe:** sehr früh / 8
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** hervorragend / 8
**Knollenansatz:** viele / 8
**Keimruhe:** kurz / 4
**Unterwassergewicht:** 316
**Trockenmassegehalt:** 17,6%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/agata

# Agria.

Biologisch | Konventionell | Einzelhandel Frisch | Verarbeitung Pommes frites, chips, fertigprodukten

**Späte, gelbfleischige Haupternte-Sorte mit guten Erträgen und sehr konstanter Qualität.**

- **Hervorragende Backqualität**
- **Mehrfache Virusresistenzen**
- **Gute Lagereigenschaften**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Böhm
**Kreuzung:** QUARTA x SEMLO
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5
**Keimruhe:** lang / 8
**Unterwassergewicht:** 402
**Trockenmassegehalt:** 21,8%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Chipsqualität:** sehr gut / 7,5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7
**Wart disease F1:** etwas anfällig / 9
**Wart disease F6:** relativ anfällig / 6

agricopotatoes.de/agria



# Alouette.

Biologisch | Konventionell | Einzelhandel Frisch | Verarbeitung Fertigprodukten

**Mittelfrühe, vielseitige Speisesorte mit roter Schale, Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule und somit geeignet für den konventionellen und biologischen Anbau ist.**

- **Gute Toleranz gegen Flecken**
- **Geeignet zum Kochen und Backen zu Hause**
- **Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 02-139-1 x LAURA
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** gelb / 7,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 389
**Trockenmassegehalt:** 21,1%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Pommes-frites-Qualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** teilweise resistent / 8
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/alouette

# Arizona.

Konventionell

**Mittelfrühe Speisesorte, die bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen hohe Erträge produziert.**

- **Einheitliche Knollenform und -größe**
- **Gute Trockenheitstoleranz**
- **Mehrfache Virusresistenzen**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** UK 150-19D22 x MASCOTTE
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 301
**Trockenmassegehalt:** 17%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** relativ anfällig / 6

agricopotatoes.de/arizona

# Armedi.

Verarbeitung
Pommes frites

**Mittelspäte Wirtschaftssorte für die Pommes-frites-Industrie.**

- **Nicht anfällig für Stipp**
- **Geeignet für langfristige Lagerung.**
- **Mehrfachresistenzen gegen Kartoffelnematoden**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** TOPAS x BASIN RUSSET
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6,5
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5
**Unterwassergewicht:** 402
**Trockenmassegehalt:** 21,8%

**Kochtyp:** mehlig / C
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** teilweise resistent / 7
**White nematode Pa 2:** resistent / 9
**White nematode Pa 3:** teilweise resistent / 8
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7,5
**Wart disease F1:** etwas anfällig / 9

agricopotatoes.de/armedi

# Arsenal.

Verarbeitung
Chips Flocken

**Mittelspäte Chipssorte mit umfassenden Resistenzen gegen Kartoffelnematoden und gutem Ertrag.**

- **Mehrfache Resistenzen**
- **Geeignet für Chips und Flocken**
- **Hoher Trockenmassegehalt**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 92-1146 x SILVESTER
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** relativ schlecht / 5
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5
**Unterwassergewicht:** 447
**Trockenmassegehalt:** 24%

**Kochtyp:** mehlig / BC
**Chipsqualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** teilweise resistent / 8
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** moderat anfällig / 6
**White nematode Pa 2:** resistent / 9
**White nematode Pa 3:** teilweise resistent / 8
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/arsenal



# Artemis.

Konventionell
Einzelhandel
Frisch

**Mittelfrühe Speisesorte mit hervorragendem Ertrag, ideal für die Pommes-frites-Zubereitung zu Hause.**

- **Hervorragende Backqualität**
- **Späte, gelbfleischige Haupternte-Sorte mit guten Erträgen und sehr konstanter Qualität.**
- **Mehrfache Resistenzen**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** RIANTA x RENSKA
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5

**Unterwassergewicht:** 375
**Trockenmassegehalt:** 20,4%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** durchschnittlich / 6
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/artemis

# Babylon.

Konventionell
Einzelhandel
Frisch
Verarbeitung
Pommes frites, fertigprodukten

**Späte, gelbfleischige Haupternte-Sorte mit guten Erträgen und sehr konstanter Qualität.**

- **Hervorragende Backqualität**
- **Mehrfache Virusresistenzen**
- **Gute Lagereigenschaften**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** R.K. Bakker
**Kreuzung:** AGRIA MUTANT
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** lang / 8
**Unterwassergewicht:** 401
**Trockenmassegehalt:** 21,7%

**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Chipsqualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** teilweise resistent / 8
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6,5
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/babylon

# Beyonce.

Biologisch | Verarbeitung
Chips, flocken

**Mittelfrühe Chipssorte mit gutem Trockenmassegehalt, geeignet für mittelfristige Lagerung und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**




- **Große Knollen**
- **Früh Trockenmassegehalt**
- **Hervorragende Chipqualität**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 94-2061 x LADY JO
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** relativ lang / 7

**Unterwassergewicht:** 446
**Trockenmassegehalt:** 23,9%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Chipsqualität:** hervorragend / 8
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7,5

agricopotatoes.de/beyonce

# Carolus.

Biologisch | Konventionell | Einzelhandel
Frisch

**Mittelspäte vielseitige Speisesorte mit ansprechenden roten Augen und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**




- **Vielseitige Verwendung**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Mehlig kochend**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AGRIA x AR 00-94-17
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5
**Unterwassergewicht:** 398

**Trockenmassegehalt:** 21,6%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7
**Chipsqualität:** gut / 7
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/carolus



# Chester
## (AR 13-2694).

Verarbeitung
Chips, flocken

**Eine frühe Chipssorte mit Pallida Resistenz, gleichmäßiger Knollengröße, gutem Trockenmassegehalt und guter Toleranz gegen Druckstellen/ Rodebeschädigungen.**



- **Sehr ertragreiche Sorte mit hohen Knollenansatz**
- **Sehr gute Eignung für die Herstellung zu Pommes Frites auch nach Langzeitlagerung**
- **Früh Trockenmassegehalt**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 07-4052 x ALICANTE
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6,5
**Keimruhe:** relativ kurz / 5
**Unterwassergewicht:** 446

**Trockenmassegehalt:** 24%
**Kochtyp:** mehlig / C
**Chipsqualität:** hervorragend / 8
**White nematode Pa 2:** teilweise resistent / 8
**White nematode Pa 3:** teilweise resistent / 8
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/chester

# Constance.

Konventionell | Einzelhandel
Frisch

**Mittelfrühe Speisesorte mit hellgelber Schale und hellgelber Fleischfarbe.**



- **Ansprechendes Äußeres**
- **Einheitliche Knollengröße**
- **Relativ festkochend**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** J.L. Spijkman
**Kreuzung:** MARABEL x AR 93-1243
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** hervorragend / 8

**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5
**Unterwassergewicht:** 358
**Trockenmassegehalt:** 19,7%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB

agricopotatoes.de/constance

# Corazon.

Konventionell
Einzelhandel
Frisch

**Eine mittelfrühe Sorte mit roter Schale und früher Ertragsbildung.**

- **Sehr gute Schalenqualitäten**
- **Festkochend**
- **Guter Knollenansatz**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** EVOLUTION x MANITOU
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5
**Unterwassergewicht:** 321
**Trockenmassegehalt:** 17,8%

**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** teilweise resistent / 8
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6,5
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** etwas anfällig / 9

agricopotatoes.de/corazon

# Diamant.

Konventionell

**Vielseitige mittelspäte Sorte mit guter Hitzetoleranz und hohen Erträgen, für die Pommes-frites-Zubereitung zu Hause.**

- **Hervorragende Backqualität**
- **Gute Virusresistenzen**
- **Für zweite Kultur geeignet**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Precardi
**Kreuzung:** CARDINAL MUTANT
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5
**Unterwassergewicht:** 420

**Trockenmassegehalt:** 23%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** etwas anfällig / 6
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** relativ anfällig / 6

agricopotatoes.de/diamant



# Erika.

Einzelhandel
Frisch, salatsorten

**Frühe festkochende Salat- und Einzelhandelssorte mit guter Schorfresistenz.**

- **Ansprechendes Äußeres**
- **Hoher Knollenansatz**
- **Gute Y-Virusresistenzen**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
**Kreuzung:** MARABEL x AR 88-0156
**Reifegruppe:** früh / 7,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** hervorragend / 8

**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5
**Unterwassergewicht:** 337
**Trockenmassegehalt:** 18,6%
**Kochtyp:** festkochend / A
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9

agricopotatoes.de/erika

# Esmee.

Konventionell
Einzelhandel
Frisch

**Mittelfrühe Speisesorte mit attraktiver roter Schale, guter Hitzetoleranz und gutem Ertrag.**

- **Ansprechendes Äußeres**
- **Große Knollen**
- **Mehrfache Virusresistenzen**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** LAURA x RODEO
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** hervorragend / 8
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6


**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 326
**Trockenmassegehalt:** 18%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/esmee

# Evolution.

Konventionell

**Mittelfrühe Speisesorte mit attraktiver dunkelroter Schale und einem frühen, guten Ertrag.**



- **Große Knollen**
- **Gute Trockenheitstoleranz**
- **Mehrfachresistenzen gegen Kartoffelnematoden**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 94-0807 x AMOROSA
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** kurz / 4
**Unterwassergewicht:** 343
**Trockenmassegehalt:** 18,9%

**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** moderat anfällig / 6
**White nematode Pa 2:** teilweise resistent / 7
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** moderat anfällig / 8
**Wart disease F6:** resistent / 10

agricopotatoes.de/evolution

# Fajah.

Konventionell

**Eine starke Konsumsorte mit großen regelmäßigen Knollen, hohem Ertrag und hohem Stärkegehalt.**



- **Große Knollen mit hohem Ertrag**
- **Gleichmäßige langovalen Knollen**
- **Kurze Keimruhe, anfällig für einen zweiten Ansatz**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** R. Rispens
**Kreuzung:** LANORMA x AMBITION
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

**Unterwassergewicht:** 354
**Trockenmassegehalt:** 19,4%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5

agricopotatoes.de/fajah



# Feliz (SW 14-7008).

Einzelhandel
Salads

## Tolles Aussehen, tolle Leistung!

**Die Kraft der Innovation**

**Eine zweitfrühe Salatsorte mit oval-langen Knollen, Kochtyp A und starker PVY-Resistenz.**



NEU!

- **Gute Schalenoptik**
- **Kochtyp A**
- **Gute PVY-Resistenz**

*Alle Informationen und technischen Daten derSpotlight-Variante finden Sie auf* ***Seite 10 & 20*** *oder scannen Sie den QR-Code.*

agricopotatoes.de/feliz

# Fontane.

**Verarbeitung**
Pommes frites, chips, flocken

**Mittelspäte Haupternte-Sorte mit hohem Ertrag für die Produktion von Pommes frites und Flocken.**

- **Große Knollen**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Für verschiedene Bodentypen geeignet**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** AGRIA x AR 76-034-03
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** relativ schlecht / 5
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5
**Unterwassergewicht:** 430

**Trockenmassegehalt:** 23,2%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Chipsqualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6,5
**Wart disease F1:** relativ anfällig / 6
**Wart disease F6:** moderat anfällig / 8


agricopotatoes.de/fontane

# Jolene.

**Konventionell** **Einzelhandel**
Frisch

**Mittelspäte Sorte mit guter Schalenqualität, und gute Lagereigenschaften.**

- **Ideal zum Backen zu Hause**
- **Einheitliche Knollenform**
- **Guter Trockenmassegehalt**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** SAGITTA x AR 03-1491
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7

**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 389
**Trockenmassegehalt:** 21,1%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7

agricopotatoes.de/jolene

# Jacky.

**Biologisch** | **Einzelhandel** Drillinge **Verarbeitung** Fertigprodukten

**Mittelfrühe kleine Speisesorte mit hohem Ertrag und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**

- **Vorwiegend mehlig kochend**
- **Hoher Knollenansatz**
- **Gute Toleranz gegen Flecken und Schäden**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** ANOUK x ATHLETE
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** Viele / 9
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5

**Unterwassergewicht:** 368
**Trockenmassegehalt:** 20,1%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9


agricopotatoes.de/jacky

# Kuroda.

**Konventionell**

**Mittelspäte Speisesorte mit roter Schale, hervorragender Hitzetoleranz und sehr gutem Ertrag.**

- **Große Knollen**
- **Gute Lagereigenschaften**
- **Mehrfach-Resistenzen gegen Warzenkrankheiten**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** G. Kuik
**Kreuzung:** AR 76-199-03 x KO 80-1407
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5
**Keimruhe:** lang / 8

**Unterwassergewicht:** 426
**Trockenmassegehalt:** 23%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** etwas anfällig / 9

agricopotatoes.de/kuroda

# Leonore.

Konventionell | Verarbeitung: Pommes frites

**Eine sehr frühe Verarbeitungssorte mit hohem Ertrag.**

- **Gute Schalenqualität**
- **Gute Virusresistenz**
- **Langovale Knollen**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** EXCELLENCY x AR 06-3754
**Reifegruppe:** früh / 7,5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6,5
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

**Unterwassergewicht:** 397
**Trockenmassegehalt:** 21,5%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/leonore

# Lugano.

Konventionell | Verarbeitung: Pommes frites

**Mittelspäte Haupternte-Sorte mit gelbem Fleisch und guten Resistenzen gegen Kartoffelnematoden und Kartoffelkrebs.**

- **Große Knollen**
- **Mehrfache Resistenzen**
- **Gute Lagereigenschaften**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** F.J. Vos
**Kreuzung:** AR 00-2211 x AR 99-0669
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5
**Keimruhe:** lang / 8
**Unterwassergewicht:** 394
**Trockenmassegehalt:** 21,4%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B

**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** resistent / 9
**White nematode Pa 2:** resistent / 9
**White nematode Pa 3:** resistent / 9
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** etwas anfällig / 9


agricopotatoes.de/lugano

# Levante.

Biologisch | Konventionell | Einzelhandel: Frisch

**Mittelspäte Speisesorte mit hohem Ertrag, ansprechender gelber Schale und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**

- **Hoher Knollenansatz**
- **Gute Schalenqualität**
- **Gute Lagereigenschaften**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 01-3218 x ALMERA
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Viele / 8
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5

**Unterwassergewicht:** 365
**Trockenmassegehalt:** 19,9%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7,5


agricopotatoes.de/levante

# Manitou.

Konventionell | Einzelhandel: Frisch

**Späte Speisesorte mit roter Schale und hohem Ertrag.**

- **Große Knollen**
- **Gute Trockenheitstoleranz**
- **Einheitliche Knollengröße**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
**Kreuzung:** LAURA x MARANCA
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5
**Unterwassergewicht:** 351

**Trockenmassegehalt:** 19,4%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 5:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/manitou

# Markies.

Konventionell
Verarbeitung: Pommes frites, chips

**Späte Allround-Sorte mit hohem Ertrag für den Verarbeitungsmarkt.**

- **Hervorragende Backqualität**
- **Guter Trockenmassegehalt**
- **Gute Lagereigenschaften**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
**Kreuzung:** FIANNA x AGRIA
**Reifegruppe:** spät / 4
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5

**Unterwassergewicht:** 427
**Trockenmassegehalt:** 22,8%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Chipsqualität:** sehr gut / 7,5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** etwas anfällig / 6,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7


agricopotatoes.de/markies

# Melrose.

Einzelhandel
Verarbeitung: Frisch, spezielle Fertigprodukten

**Eine mittelspäte Sorte mit spezifischem Geschmack.**

- **Vorwiegend mehlig kochend**
- **Gelbe Fleischfarbe**
- **Hellrote Schale**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** C.R.A.
**Kreuzung:** BP 15.7.70 x AM 15.1.68
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** Viele / 8

**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 406
**Trockenmassegehalt:** 22%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Wart disease F1:** moderat anfällig / 7

agricopotatoes.de/melrose





# Meryem.

Konventionell

**Späte Speisesorte mit hohem Ertrag und ansprechender roter Schale.**

- **Guter Knollenansatz**
- **Gute Virusresistenzen**
- **Gute Trockenheitstoleranz**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** LUSA x AR 01-0420
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** sehr gut / 7,5
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** kurz / 4

**Unterwassergewicht:** 349
**Trockenmassegehalt:** 19,2%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** etwas anfällig / 9

agricopotatoes.de/meryem

# Picasso.

Konventionell

**Späte Speisesorte mit gelber Schale, auffälligen roten Augen und guter Schorfresistenz, geeignet für langfristige Lagerung.**

- **Hohe Erträge**
- **Gute Trockenheitstoleranz**
- **Gute Toleranz gegen Flecken und Schäden**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Duoplant V.O.F.
**Kreuzung:** CARA x AUSONIA
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** lang / 8

**Unterwassergewicht:** 381
**Trockenmassegehalt:** 20,8%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** ungeeignet / 5
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/picasso




# Paradiso.

Traditional

## Das ideale Gesamtpaket: robust, ertragreich und zuverlässig

**Die Kraft der Innovation**

**Mittelspäte Sorte mit groß wachsenden Knollen und hervorragendem Ertrag für den konventionellen Markt.**



- **Große Knollen**
- **Ansprechendes Äußeres**
- **Gute Hitze- und Trockenheitstoleranz**

*Alle Informationen und technischen Daten der Spotlight-Variante finden Sie auf* ***Seite 22*** *oder scannen Sie den QR-Code.*

agricopotatoes.de/paradiso

# Premiere.

Verarbeitung
Pommes frites

**Sehr frühe Sorte für die Pommes-frites-Industrie mit gutem, frühem Ertrag.**

- **Frühe Lieferung direkt ab Feld**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Gute Trockenmasseverteilung**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Precardi
**Kreuzung:** CIVA x PROVITA
**Reifegruppe:** sehr früh / 8
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** relativ kurz / 5

**Unterwassergewicht:** 416
**Trockenmassegehalt:** 22,4%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** gut / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/premiere

# Ranomi.

Traditionell

Einzelhandel
Frisch

**Frühe Speisesorte mit relativ guter Schorfresistenz und gutem, frühem Ertrag.**

- **Ansprechende Schalenqualität**
- **Große Knollen**
- **Relativ festkochend**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 93-033-79 x AR 95-0319
**Reifegruppe:** sehr früh / 7,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** etwas anfällig / 6
**Keimruhe:** etwas anfällig / 6

**Unterwassergewicht:** 322
**Trockenmassegehalt:** 17,9%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend/ AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10

agricopotatoes.com/ranomi



# Riviera.

Konventionell

**Sehr frühe Speisesorte mit attraktiver Schale, hervorragender Hitzetoleranz, guter Virusresistenz und einem guten, frühen Ertrag.**

- **Große Knollen**
- **Ansprechendes Äußeres**
- **Gute Virusresistenzen**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Mts. Boerhave
**Kreuzung:** MINERVA x ALCMARIA
**Reifegruppe:** sehr früh / 8
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** hervorragend / 8
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5

**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 318
**Trockenmassegehalt:** 17,7%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10


agricopotatoes.de/riviera

# Rudolph.

Konventionell

**Mittelspäte Speisesorte mit attraktiver roter Schale, guter Hitzetoleranz und sehr hohem Ertrag.**

- **Weiße Fleischfarbe**
- **Große Knollen**
- **Gute Lagereigenschaften**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** CHIEFTAIN x STIRLING
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** weiß / 4
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5
**Keimruhe:** relativ lang / 7
**Unterwassergewicht:** 376

**Trockenmassegehalt:** 20,5%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Pommes-frites-Qualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** anfällig / 5,5
**Wart disease F1:** resistent / 10
**Wart disease F6:** moderat anfällig / 8

agricopotatoes.de/rudolph

# Sevas (KO 13-2242).

Konventionell

**Frühe Haupterntesorte mit langovalen Knollen, guter Keimruhe und guter Toleranz gegen Druckstellen/ Rodebeschädigungen.**



- **Hoher Ertrag**
- **Gute Virus- und Schorfresistenz**
- **Ansprechende Schalenqualität**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Konst Research B.V.
**Kreuzung:** KO 06-1457 x SAVANNA
**Reifegruppe:** mittelspät / 5,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5,5
**Keimruhe:** relativ lang / 7,5
**Unterwassergewicht:** 350

**Trockenmassegehalt:** 19,2%
**Kochtyp:** festkochend / A
**Pommes-frites-Qualität:** durchschnittlich / 6
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/sevas

# Sevilla.

Biologisch | Verarbeitung Pommes frites, chips

**Eine Haupternte Sorte mit gutem Unterwassergewicht, leckerem Geschmack und Widerstandsfähigkeit gegen Krautfäule.**



- **Krautfäuleresistenz**
- **Geringer Stickstoffbedarf**
- **Gute Trockentoleranz**


## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** N. Vos
**Kreuzung:** AGRIA x DOB 1997-507-015
**Reifegruppe:** spät / 4,5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** lang / 8

**Unterwassergewicht:** 385
**Trockenmassegehalt:** 21%
**Kochtyp:** mehlig / C
**Pommes-frites-Qualität:** sehr gut / 7,5
**Chipsqualität:** gut / 7
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9

agricopotatoes.de/sevilla





# Sinora.

Verarbeitung
Pommes frites, chips

**Mittelfrühe, leicht anzubauende Sorte mit hohem Ertrag für eine frühe Ernte, für Pommes frites oder Chips.**

- **Frühe Lieferung direkt ab Feld**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Gute Virusresistenzen**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** J. Schilt
**Kreuzung:** AGRIA x AM 70-2166
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Relativ viele / 7
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

**Unterwassergewicht:** 416
**Trockenmassegehalt:** 22,6%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Chipsqualität:** hervorragend / 8
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9

agricopotatoes.de/sinora

# Spunta.

Konventionell

**Mittelspäte Speisesorte mit guter Hitzetoleranz und hohen Erträgen.**

- **Große Knollen**
- **Einheitliche Knollengröße**
- **Hoher Trockenmassegehalt**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** J. Oldenburger
**Kreuzung:** BEA x USDA 96-56
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

**Unterwassergewicht:** 387
**Trockenmassegehalt:** 21%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Pommes-frites-Qualität:** durchschnittlich / 6
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** 0 /
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/spunta



# Twinner.

Biologisch | Konventionell | Einzelhandel Frisch

**Speisesorte mit frühem Ertrag für den konventionellen und biologischen Anbau mit Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**

- **Große Knollen**
- **Ansprechendes Äußeres**
- **Relativ festkochend**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** G.W. te Winkel
**Kreuzung:** MA 98-0032 x AR 00-87-22
**Reifegruppe:** früh / 7,5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

**Unterwassergewicht:** 359
**Trockenmassegehalt:** 19,7%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10

agricopotatoes.de/twinner

# Twister.

Biologisch | Konventionell | Einzelhandel Frisch

**Mittelfrühe Speisesorte für den konventionellen und biologischen Anbau mit gutem Ertrag und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**

- **Ansprechendes Äußeres**
- **Gute Lagereigenschaften**
- **Relativ festkochend**




## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** G.W. te Winkel
**Kreuzung:** ARG 96-0739 x AR 02-9113
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 7
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** Durchschnittlich / 6,5
**Keimruhe:** relativ lang / 7

**Unterwassergewicht:** 345
**Trockenmassegehalt:** 19%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** moderat anfällig / 8

agricopotatoes.de/twister

# Vogue.

Konventionell

**Mittelfrühe Speisesorte mit großen Knollen in einheitlicher Größe.**

- **Relativ festkochend**
- **Große Knollen**
- **Frühe Knollenansatz**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Konst Research B.V.
**Kreuzung:** MARABEL x AMOROSA
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** Relativ wenige / 5,5
**Keimruhe:** relativ kurz / 5

**Unterwassergewicht:** 311
**Trockenmassegehalt:** 17,3%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Chipsqualität:** ungeeignet / 4
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** etwas anfällig / 9

agricopotatoes.de/vogue

## Notizen.

# Ein Blick in die Zukunft des Kartoffelanbausn

**Wir freuen uns, Ihnen einen Vorgeschmack auf eine neue Generation vielversprechender Kartoffelsorten bieten zu können. Sie befinden sich derzeit in der letzten Prüfungsphase und sind noch nicht auf dem Markt erhältlich, zeigen aber großes Potenzial für die Zukunft.**

Betrachten Sie dies als exklusive Vorschau auf den Kartoffelanbau der Zukunft, auf vielversprechende Sorten, die schon bald den Markt prägen könnten..

# AR 16-1404.

Biologisch | Konventionell | Verarbeitung Pommes frites

**Eine mittelfrühe Verarbeitungssorte mit gleichmäßiger Größe und Form der Knollen.**

- **Gute Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule im Laub**
- **Y Virus Resistenz**
- **Gute Knollenansatz**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 10-4512 x JOLENE
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** durchschnittlich / 6
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** relativ kurz / 5
**Unterwassergewicht:** 388
**Trockenmassegehalt:** 21,1%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** etwas anfällig / 9


*Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.*

# AR 16-0165.

Biologisch | Konventionell

**ine Haupternte-Sorte mit einer sehr attraktiven Schale, guter Hitzetoleranz, breiter Resistenz gegen Kartoffelzystennematoden und hohem Ertrag.**

- **Große, gleichmäßige, ovale Knollen**
- **Eher mehlig im Teig und geeignet für Bratkartoffeln**
- **Eine robuste Pflanze mit einem guten Wurzelsystem und hoher Resistenz gegen PVY**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** AR 07-3009 x AR 08-3398
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6
**Unterwassergewicht:** 367
**Trockenmassegehalt:** 20,1%
**Kochtyp:** mehlig / BC
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent* / 9*
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** resistent* / 9*
**White nematode Pa 2:** resistent* / 9*
**White nematode Pa 3:** resistent* / 9*
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6



# CR 13-3717.

Biologisch | Verarbeitung Pommes frites

**Eine frühe Haupternte-Sorte mit großen Knollen, geeignet für den Verarbeitungsmarkt.**

- **Sorte der nächsten Generation**
- **Hoher Ertrag**
- **Gute Resistenz gegen Schorf**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Mts. Crijns-Hop
**Kreuzung:** AR 07-3626 x AR 05-3409
**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** relativ schlecht / 5
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6,5
**Unterwassergewicht:** 377
**Trockenmassegehalt:** 20,5%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**Pommes-frites-Qualität:** hervorragend / 8
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8,5

⊕ *Sorten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind Next-Generation-Sorten mit gestapelten Resistenzgenen.*

# PL 17-0210.

Biologisch | Verarbeitung Stärke

**Eine Stärkesorte mit mehrfacher Nematodenresistenz und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.**

- **Gutem Ertrag**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule**



## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** AKV Langholt
**Kreuzung:** VENANCE x PL 08-4010
**Reifegruppe:** spät / 5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** schlecht / 4,5
**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6,5
**Keimruhe:** relativ kurz / 5,5
**Unterwassergewicht:** 517
**Trockenmassegehalt:** 27,4%
**Kochtyp:** mehlig / CD
**Pommes-frites-Qualität:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** resistent / 9
**White nematode Pa 3:** moderat anfällig / 6
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 8

# SW 15-6459.

Verarbeitung
Fertigprodukten

**Eine mittelfrühe Handelssorte mit ovalen Knollen und guter Schalenoptik.**



- **Geeignet für die Schälindustrie**
- **Hohe Knollenzahl pro Pflanze**
- **Vorwiegend festkochend**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** REGINA x SA 06-0104
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** relativ schlecht / 5
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** relativ kurz / 5
**Unterwassergewicht:** 389

**Trockenmassegehalt:** 21,1%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** teilweise resistent / 7
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** teilweise resistent / 7
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7,5
**Wart disease F1:** resistent* / 10*

*Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.*

# SW 16-8008.

Biologisch | Einzelhandel
Frisch

**Eine ertragreiche, mittelfrühe, gelbfleischige Sorte für den Handel mit gutem Knollenansatz und Phytophthora-Resistenz, geeignet für vielfältige Vermarktungsmöglichkeiten im Frischmarkt.**



- **Sehr hohes Ertragspotenzial bei konstant starker Leistung**
- **Attraktives Schalenbild, gute Gleichmäßigkeit der Knollengröße und gute Knollenanzahl**
- **Sorte der nächsten Generation mit einem guten Resistenzpaket**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** Lantmännen Seed B.V.
**Kreuzung:** AR 09-5135 x AR 08-3159
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** relativ kurz / 5

**Unterwassergewicht:** 344
**Trockenmassegehalt:** 18,9%
**Kochtyp:** vorwiegend mehlig / B
**White nematode Pa 2:** resistent* / 9*
**White nematode Pa 3:** teilweise resistent* / 7*
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** resistent* / 10*

*Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.*



# TW 17-1410.

Biologisch | Einzelhandel
Frisch

**Mittelspäte Speisesorte mit roter Schale und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule und somit geeignet für konventionellen und biologischen Anbau.**



- **Hoher Ertrag**
- **Gute Virusresistenz**
- **Schöne Schalenfarbe**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** G.W. te Winkel
**Kreuzung:** ALOUETTE x AR 09-4077
**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** relativ kurz / 5
**Unterwassergewicht:** 369

**Trockenmassegehalt:** 19,9%
**Kochtyp:** festkochend / A
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Wart disease F1:** resistent / 10

*Sorten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind Next-Generation-Sorten mit gestapelten Resistenzgenen.*

# TW 18-1401.

Biologisch | Einzelhandel
Spezielle

**Eine frühe Speisesorte mit natürlicher Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule, geeignet für den konventionellen und ökologischen Anbau.**



- **Festkochend**
- **Frühe Speisesorte**
- **Sorte der nächsten Generation mit einem guten Resistenzpaket**

## Wichtige Eigenschaften

**Züchter:** G.W. te Winkel
**Kreuzung:** LORELEY x LM 11-0212
**Reifegruppe:** früh / 7,5
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** überdurchschnittlich / 6,5
**Knollenansatz:** -
**Keimruhe:** kurz / 4,5

**Unterwassergewicht:** 350
**Trockenmassegehalt:** 19,5%
**Kochtyp:** festkochend / A
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** teilweise resistent* / 8*
**Krautfäule:** kaum bis nicht anfällig / 9
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 6
**Wart disease F1:** resistent* / 10*

*Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.*
*Sorten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind Next-Generation-Sorten mit gestapelten Resistenzgenen.*

# Genetik und Know-how für die ganze Welt

**Agrico exportiert nicht nur Pflanzkartoffeln aus den Niederlanden. Auch unsere Genetik und unser Know-how werden Märkten auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt.**

Mit unseren exklusiven Lizenzsorten* unterstützen wir unsere Abnehmer durch unverwechselbare Sorten mit hohem Mehrwert bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Märkte. Ausgehend von In-vitro-Gewebekulturen bieten wir Zugang zu starker Agrico-Genetik und begleiten den Weg von der Vermehrung bis zur Markteinführung.

Mit Stolz präsentieren wir eine Auswahl unserer besten Lizenzsorten, die entwickelt wurden, um weltweit Mehrwert zu schaffen und auf den verschiedenen Märkten Erfolge zu erzielen.

** In den Niederlanden werden diese Sorten nicht als Pflanzkartoffeln angebaut.*



| Name | Seite | Anbau | Marktsegment | | | Marken | | Eigenschaften | | | | | | | | Wiederstandsfähig | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Reif | Schalen farbe | Fleisch farbe | Knollen form | Trocken substanz gehalt | Koch typ | Chips qualität | Pommes Pommes frites qualität | Ro 1,4 | Ro 2,3 | Ro 5 | Pa 2 | Pa 3 | Kraut fäule | Braun fäule |
| Agata | 30 | | ✓ | Frisch | | | | 8 | Y | 6 | O | 17,6 | AB | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 5 | 6 |
| Agria | 30 | ✓ | ✓ | Frisch | Pommes frites, Chips, Fertigprodukten | | ✓ | 5 | Y | 7 | OL | 21,8 | BC | 7,5 | 8 | 9 | - | - | 2 | 2 | 5,5 | 7 |
| Alouette | 31 | ✓ | ✓ | Frisch | Fertigprodukten | ✓ | | 6 | R | 7,5 | OL | 21,1 | AB | - | 6,5 | 9 | 8 | 4 | - | - | 9 | 9 |
| AR 16-1404 | 58 | ✓ | ✓ | | Pommes frites | ✓ | | 6,5 | Y | 7 | O | 21,1 | AB | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 9 | - |
| AR 16-0165 | 58 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | 5 | Y | 6 | O | 20,1 | BC | - | - | 9* | 9* | 9* | 9* | 9* | 9 | 6 |
| Arizona | 31 | | ✓ | | | | | 7 | Y | 6 | O | 17 | AB | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| Armedi | 32 | | | | Pommes frites | | | 5,5 | Y | 6 | OL | 21,8 | C | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7,5 |
| Arsenal | 32 | | | | Chips, Flocon | | | 5,5 | Y | 6 | RO | 24 | BC | 7 | 7,5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4,5 | 5,5 |
| Artemis | 33 | | ✓ | Frisch | | | | 7 | Y | 6 | OL | 20,4 | B | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 5 | 8 |
| Babylon | 33 | | ✓ | Frisch | Pommes frites, Chips, Fertigprodukten | | | 5 | Y | 7 | OL | 21,7 | BC | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 5,5 | 6,5 |
| Beyonce | 34 | ✓ | | | Chips, Flocon | ✓ | | 6 | Y | 6,5 | OR | 23,9 | BC | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | 8,5 | 7,5 |
| Carolus | 34 | ✓ | ✓ | Frisch | | ✓ | | 6 | Y/R | 7 | O | 21,6 | BC | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Cerisa | | | | Salatsorten | | | | 7,5 | R | 7 | L | 21,3 | A | 4,5 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| Chester (AR 13-2694) | 35 | | | | Chips, Flocon | | | 6 | Y | 6,5 | OR | 24 | C | 8 | - | 4* | 2* | - | 8* | 7* | 5 | 5 |
| Constance | 35 | | ✓ | Frisch | | | | 7 | Y | 6,5 | OR | 19,7 | AB | 4 | 5,5 | - | - | - | - | - | 5 | 4,5 |
| Corazon | 36 | | ✓ | Frisch | | | | 7 | R | 6 | OL | 17,8 | AB | 4 | 5,5 | 9 | 9 | 8 | - | - | 4,5 | 6,5 |
| CR 13-3717 | 59 | | | | | ✓+ | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Diamant | 36 | | ✓ | | | | | 6 | Y | 6 | O | 23 | B | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 6 | 7 |
| Erika | 37 | | | Frisch, Salatsorten | | | | 7,5 | Y | 6 | LO | 18,6 | A | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 3,5 | 4 |
| Esmee | 37 | | ✓ | Frisch | | | | 6,5 | R | 7 | OL | 18 | AB | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4,5 | 7 |
| Evolution | 38 | | ✓ | | | | | 6,5 | R | 6 | OL | 18,9 | B | 4 | 4,5 | 9 | 6 | - | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Fajah | 38 | | ✓ | | | | | 5,5 | Y | 6 | LO | 19,4 | BC | 6,5 | 7 | 9 | - | - | 3 | 2 | 4 | 5,5 |
| Feliz (SW 14-7008) | 10, 20, 39 | | | Salatsorten | | | | 7 | Y | 6,5 | OL | 19,6 | A | - | - | 9* | - | 3* | 6* | 3* | 3,5 | 5,5 |

| Name | Seite | Anbau | Marktsegment | | | Marken | | Eigenschaften | | | | | | | | Wiederstandsfähig | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Reif | Schalen farbe | Fleisch farbe | Knollen form | Trocken substanz gehalt | Koch typ | Chips qualität | Pommes Pommes frites qualität | Ro 1,4 | Ro 2,3 | Ro 5 | Pa 2 | Pa 3 | Kraut fäule | Braun fäule |
| Fontane | 40 | | | | Pommes frites, Chips, Flocon | | ✓ | 5,5 | Y | 6,5 | O | 23,2 | BC | 7 | 7,5 | 9 | - | - | - | - | 5 | 6,5 |
| Jacky | 40 | ✓ | | Grenailles | Fertigprodukten | ✓ | | 6,5 | Y | 6,5 | RO | 20,1 | B | 5 | 5,5 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Jamaica (AR 14-0334) | 12 | | ✓ | | | | | 7,5 | Y | 6,5 | OL | 18,3 | AB | - | - | 1* | - | - | - | - | 3,5 | 6 |
| Jolene | 41 | | ✓ | Frisch | | | | 6 | Y | 6 | OL | 21,1 | B | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
| Kuroda | 41 | | ✓ | | | | | 6 | R | 6 | O | 23 | BC | 5 | 5,5 | 9 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Leonore | 42 | | | | Pommes frites | | | 7,5 | Y | 7 | LO | 21,5 | BC | - | 7 | 9* | - | - | - | - | 3,5 | 5 |
| Levante | 42 | ✓ | ✓ | Frisch | | ✓ | | 5,5 | Y | 6 | LO | 19,9 | B | 4,5 | 5,5 | 9 | - | - | - | - | 8,5 | 7,5 |
| Lugano | 43 | | ✓ | | Pommes frites | | | 5,5 | Y | 6,5 | OL | 21,4 | B | 5,5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5,5 |
| Manitou | 43 | | ✓ | Frisch | | | | 5 | R | 6 | LO | 19,4 | B | 4,5 | 5,5 | 9 | 9 | 9 | - | - | 5 | 6 |
| Markies | 44 | | ✓ | | Pommes frites, Chips | | ✓ | 4 | Y | 6,5 | OL | 22,8 | BC | 7,5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 6,5 | 7 |
| Melrose | 44 | | | Frisch, Spezielle | Fertigprodukten | | | 6 | R | 7 | O | 22 | B | 5 | 6,5 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Meryem | 46 | | ✓ | | | | | 5 | R | 6,5 | LO | 19,2 | B | 4 | 5,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | 6 |
| Napoleon | 26, 45 | | | | Chips, Flocon | | | 5 | Y | 6,5 | RO | 24,1 | BC | 8 | 7 | 9 | - | - | 4 | 2 | 6 | 6,5 |
| Oregon (AR 14-3578) | 14 | | | | Chips | | | 5 | Y | 6 | OR | 24,9 | BC | 8 | 6,5 | 9* | - | - | - | - | 4,5 | 5 |
| Paradiso | 22, 47 | | ✓ | | | | | 5,5 | Y | 6 | OL | 18,2 | B | 4 | 4,5 | 9 | - | - | - | - | 5,5 | 6,5 |
| Picasso | 46 | | ✓ | | | | | 5 | Y/R | 6 | O | 20,8 | B | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 5 | 7 |
| PL 17-0210 | 59 | ✓ | | | Stärke | ✓ | | 5 | Y | 6 | RO | 27,4 | CD | 6,5 | - | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| Premiere | 48 | | | | Pommes frites | | | 8 | Y | 6 | OR | 22,4 | BC | 5 | 6,5 | 9 | - | - | - | - | 4 | 6 |
| Ranomi | 48 | | ✓ | Frisch | | | | 7,5 | Y | 6,5 | OL | 17,9 | AB | 5 | 6,5 | 9 | - | - | - | - | 4 | 6 |
| Riviera | 49 | | ✓ | | | | | 8 | Y | 6 | OR | 17,7 | AB | 4 | 4,5 | 9 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| Rudolph | 49 | | ✓ | | | | | 5,5 | R | 4 | OR | 20,5 | AB | 5,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 |
| Sevas | 50 | | ✓ | | | | | 5,5 | Y | 6 | O | 19,2 | A | - | 6 | 9* | - | - | - | - | 5,5 | 6 |
| Sevilla | 50 | ✓ | | | Pommes frites, Chips | | | 4,5 | Y | 7 | O | 21 | C | 7 | 7,5 | - | - | - | - | - | 9 | - |

| Name | Seite | Anbau | Marktsegment | | | Marken | | Eigenschaften | | | | | | | | Wiederstandsfähig | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Reif | Schalen farbe | Fleisch farbe | Knollen form | Trocken substanz gehalt | Koch typ | Chips qualität | Pommes Pommes frites qualität | Ro 1,4 | Ro 2,3 | Ro 5 | Pa 2 | Pa 3 | Kraut fäule | Braun fäule |
| Sidney | 24, 51 | | | | Pommes frites | | | 6 | Y | 4,5 | LO | 21,5 | B | - | 6,5 | 9 | 4 | 4* | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Sinora | 52 | | | | Pommes frites, Chips | | ✓ | 7 | Y | 6,5 | OR | 22,6 | B | 8 | 7,5 | 9 | - | - | 4 | 2 | 4,5 | 5 |
| Spunta | 52 | | ✓ | | | | | 6 | Y | 6 | L | 21 | BC | 5,5 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 5,5 | 5 |
| SW 15-6459 | 60 | | | | Fertigprodukten | | | 6 | Y | 7 | RO | 21,10% | AB | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 3 | 7,5 |
| SW 16-8008 | 60 | ✓ | | Frisch | | ✓ | | 6 | Y | 6 | OL | 18,9 | B | - | - | 4* | - | - | 9* | 7* | 9 | 5 |
| Texas (AR 14-3488) | 16 | | | | Pommes frites | | | 5,5 | Y | 6 | OL | 23 | C | - | 7 | 6* | - | - | - | - | 4 | 5,5 |
| TW 17-1410 | 61 | | | | | ✓+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TW 18-1401 | 61 | ✓ | | Spécialité | | ✓+ | | 7,5 | Y | 6,5 | LO | 19,5 | A | 4 | - | 8* | - | - | - | - | 9 | 6 |
| Twinner | 53 | ✓ | ✓ | Frisch | | ✓ | | 7,5 | Y | 7 | O | 19,7 | AB | 5 | 6,5 | 9 | - | - | - | - | 8 | 9 |
| Twister | 53 | ✓ | ✓ | Frisch | | ✓ | | 7 | Y | 6,5 | RO | 19 | AB | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Vogue | 54 | | ✓ | | | | | 6,5 | Y | 7 | OL | 17,3 | AB | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 4 | 6 |

** Ergebnisse mit einem * basieren auf eigenen Recherchen und sind noch nicht offiziell veröffentlicht.* ■

## Verwendungszweck

Konventionell

Einzelhandel
- Frish, salat, spezielle

Verarbeitung
- Chips, Fertigprodukten, Flocken, Pommes Frites, Stärke

## Anbauweise

Ökologisch (für den ökologischen Anbau geeignet)

## Next Generation-Sorte

Sorten, die mit dem Symbol „Next Generation" gekennzeichnet sind, verfügen über eine natürliche Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.

Sorten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind Sorten der Next Generation mit gestapelten Resistenzgenen.

## Agrico Originals

Sorten, die mit dem Agrico Originals-Symbol gekennzeichnet sind, haben eine Schlüsselrolle im weltweiten Kartoffelanbau gespielt und wirklich etwas bewegt.

## Kraut- und Knolleneigenschaften

| | |
|---|---|
| Reif | 4 spät; 4,5 spät; 5 spät; 5,5 mittelspät; 6 mittelspät; 6,5 mittelfrüh; 7 mittelfrüh; 7,5 früh; 8 sehr früh; 8,5 sehr früh; 9 sehr früh |

***Haftungsausschluss:*** *In der Europäischen Union wurde die Zulassung des Wirkstoffs Metribuzin nicht verlängert, und Pflanzenschutzmittel mit Metribuzin sind nicht mehr zugelassen. Prüfen Sie stets, ob ein Produkt und dessen Verwendungszweck im Anbauland rechtlich zulässig sind.*

| | |
|---|---|
| Lichtkeim | **RV** rot-violett<br>**R** rot<br>**BV** blau-violett<br>**V** violett<br>**GV** grün-violett<br>**G** grün<br>**GRV** grün-rot-violett<br>**GR** grün-rot<br>**RBV** rot-blau-violett |
| Blütenfarbe | **W** weiß<br>**HL** hellila<br>**L** lila<br>**HB** hellblau<br>**B** blau<br>**V** violett<br>**DL** dunkellila<br>**BL** blau-lila |
| Anzahl Beeren | 4 sehr viele; 4,5 viele; 5 überdurchschnittlich; 5,5 überdurchschnittlich; 6 durchschnittlich; 6,5 unterdurchschnittlich; 7 unterdurchschnittlich; 7,5 wenige; 8 keine |
| Laub - Entwicklung Anfang | 4 langsam; 4,5 langsam; 5 relativ langsam; 5,5 relativ langsam; 6 durchschnittlich; 6,5 durchschnittlich; 7 relativ schnell; 7,5 relativ schnell; 8 schnell |
| Laub - Entwicklung Ende | 4 schlecht; 4,5 schlecht; 5 schlecht; 5,5 schlecht; 6 schlecht; 6,5 mittel; 7 durchschnittlich; 7,5 relativ gut; 8 gut |
| Laub - Festigkeit | 4 schwach; 4,5 schwach; 5 relativ schwach; 5,5 relativ schwach; 6 durchschnittlich; 6,5 durchschnittlich; 7 relativ fest; 7,5 relativ fest; 8 fest |
| Schalenfarbe | 3 sehr slecht; 3,5 sehr slecht; 4 sehr slecht; 4,5 slecht; 5 relativ slecht; 5,5 unterdurchschnittlich |
| Fleischfarbe | 4 weiß; 4,5 weiß; 5 cremefarben; 5,5 cremefarben; 6 hellgeld; 6,5 hellgelb; 7 gelb; 7,5 gelb; 8 tiefgelb; 8,5 orange |
| Schalenqualität | 3 russet; 3,5 russet; 4 sehr schlecht; 4,5 schlecht; 5 relativ schlecht; 5,5 unterdurchschnittlich; 6 durchschnittlich; 6,5 überdurchschnittlich; 7 gut; 7,5 sehr gut; 8 hervorragend |
| Knollenform | **R** rund<br>**RO** rundoval<br>**OR** ovalrund<br>**O** oval<br>**OL** ovallang<br>**LO** langoval<br>**L** lang |
| Regelmäßigkeit der Knollenform | 4 unregelmäßig; 4,5 unregelmäßig; 5 relativ unregelmäßig; 5,5 relativ unregelmäßig; 6 relativ unregelmäßig; 6,5 relativ unregelmäßig; 7 regelmäßig; 7,5 regelmäßig; 8 regelmäßig |
| Knollenansatz | 4 wenige; 4,5 wenige; 5 relativ wenige; 5,5 relativ wenige; 6 durchschnittlich; 6,5 durchschnittlich; 7 relativ viele; 7,5 relativ viele; 8 viele; 8,5 viele; 9 viele |
| Knollengröße | 4 klein; 4,5 klein; 5 relativ klein; 5,5 relativ klein; 6 durchschnittlich; 6,5 durchschnittlich; 7 relativ groß; 7,5 relativ groß; 8 groß |
| Großenregelmäßigkeit | 4 unregelmäßig; 4,5 unregelmäßig; 5 relativ unregelmäßig; 5,5 relativ unregelmäßig; 6 relativ unregelmäßig; 6,5 relativ unregelmäßig; 7 regelmäßig; 7,5 regelmäßig; 8 regelmäßig |
| Keimruhe | 4 kurz; 4,5 kurz; 5 relativ kurz; 5,5 relativ kurz; 6 durchschnittlich; 6,5 durchschnittlich; 7 relativ lang; 7,5 relativ lang; 8 lang |

## Empfindlichkeit und Qualität

| | |
|---|---|
| Durchwuchs; Schwarz fleckigkeit; Wachstumsrisse; Ernteschäden | 4 sehr empfindlich; 4,5 sehr empfindlich; 5 empfindlich; 5,5 empfindlich; 6 relativ empfindlich; 6,5 relativ empfindlich; 7 leicht empfindlich; 7,5 leicht empfindlich; 8 leicht bis nicht empfindlich |
| Ethylen | **4** 5% weniger Knollen<br>**4,5** 5% weniger Knollen<br>**5** 5% weniger bis 5% mehr Knollen<br>**5,5** 5% weniger bis 5% mehr Knollen<br>**6** 5% bis 15% mehr Knollen<br>**6,5** 5% bis 15% mehr Knollen<br>**7** 15% bis 25% mehr Knollen<br>**7,5** 15% bis 25% mehr Knollen<br>**8** 25% mehr Knollen |
| Unterwassergewicht | 300 Gramm niedrig; 500 Gramm hoch |
| Trockensubstanzgehalt | 17% niedrig; 26,5% hoch |
| Kochtyp | **A** festkochend<br>**AB** vorwiegend festkochend<br>**B** vorwiegend mehlig<br>**BC** mehlig<br>**C** mehlig<br>**CD** mehlig |

| | |
|---|---|
| Grauverfärbung (nach dem Kochen) | 4 sehr empfindlich; 4,5 sehr empfindlich; 5 empfindlich; 5,5 empfindlich; 6 relativ empfindlich; 6,5 relativ empfindlich; 7 leicht empfindlich; 7,5 leicht empfindlich; 8 leicht bis nicht empfindlich |
| Rohverfärbung | 4 sehr empfindlich; 4,5 sehr empfindlich; 5 empfindlich; 5,5 empfindlich; 6 relativ empfindlich; 6,5 relativ empfindlich; 7 leicht empfindlich; 7,5 leicht empfindlich; 8 leicht bis nicht empfindlich |
| Pommes-frites-Qualität | 4 ungeeignet; 4,5 ungeeignet; 5 ungeeignet; 5,5 unterdurchschnittlich; 6 durchschnittlich; 6,5 überdurchschnittlich; 7 gut; 7,5 sehr gut; 8 hervorragend |
| Trockenmasse verteilung | 5 relativ schlecht; 5,5 relativ schlecht; 6 durchschnittlich; 6,5 durchschnittlich; 7 gut; 7,5 gut; 8 hervorragend; 8,5 hervorragend; 9 hervorragend; 9,5 hervorragend |
| Chipsqualität | 4 ungeeignet; 4,5 ungeeignet; 5 ungeeignet; 5,5 unterdurchschnittlich; 6 durchschnittlich; 6,5 überdurchschnittlich; 7 gut; 7,5 sehr gut; 8 hervorragend |
| Gehalt an Glykoalkaloiden | Zeigt den TGA-Spiegel an, gemessen in mg pro 100 Gramm. |

## Empfindlichkeit und Qualität

| | |
|---|---|
| Potato cyst nematodes<br>Golden nematode:<br>Ro 1, 2, 3 and 4<br>White nematode:<br>Pa 2 and 3 | Relative Empfindlichkeit (%)<br>**9** < 1<br>**8** 1,1-3<br>**7** 3,1-5<br>**6** 5,1-10<br>**5** 10,1-15<br>**4** 15,1-25<br>**3** 25,1-50<br>**2** 50,1-100<br>**1** > 100 |
| Krautfäule; Knollenfäule; Schorf; Pulverschorf; Fusarium; Schwarze Flecken; Pfropfenbildung; Virus - Blattrollen; Virus - Yn; Virus - Yntn (Knolle) | 1 anfällig; 2 anfällig; 3 anfällig; 4 anfällig; 5 moderat anfällig; 6 moderat anfällig; 7 teilweise resistent; 8 teilweise resistent; 9 resistent |
| Warzenkrankheit F1, F6, F18 | 2 sehr anfällig; 2,5 sehr anfällig; 3 sehr anfällig; 3,5 sehr anfällig; 4 sehr anfällig; 4,5 sehr anfällig; 5 anfällig; 5,5 anfällig; 6 etwas anfällig; 6,5 etwas anfällig; 7 etwas anfällig; 7,5 etwas anfällig; 8 kaum bis nicht anfällig; 8,5 kaum bis nicht anfällig; 9 kaum bis nicht anfällig |
| | 1 sehr anfällig; 2 sehr anfällig; 3 sehr anfällig; 4 sehr anfällig; 5 relativ anfällig; 6 relativ anfällig; 7 moderat anfällig; 8 moderat anfällig; 9 etwas anfällig; 10 resistent |

*Ergebnisse mit einem * basieren auf eigenen Recherchen und sind noch nicht offiziell veröffentlicht.* ■



**Notizen.**

| English | Nederlands | Deutsch | Français | Español | Português |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby potatoes | Krielaardappelen | Drillinge | Grenailles | Patatas baby | Babies |
| Black spot (internal bruising) | Stootblauw | Schwarzfleckigkeit | Noircissement de la chair | Antracnosis | Manchas negras |
| Breeder | Kweker | Züchter | Obtenteur | Obtentor | Obtentor |
| Common scab | Schurft | Schorf | Gale commune | Sarna común | Sarna comum |
| Convenience | Koelvers | Fertigprodukten | 4ème gamme | Precocinadas | 4ª Gama |
| Cooking type | Kooktype | Kochtyp | Type de cuisson | Tipo de cocción | Grupo culinário |
| Crisps | Chips | Chips | Chips | Patatas fritas de bolsa (chips) | Rodelas |
| Crisping quality | Geschikt voor chips | Geeignet für Chips | Utilisation possible en Chips | Calidad para chips | Qualidade para fritura em rodelas |
| Crossing | Kruising | Kreuzung | Croisement | Cruzamiento | Cruzamento |
| Discolouration after cooking | Grauwverkleuring (na koken) | Grauverfärbung (nach dem Kochen) | Noircissement après cuisson | Coloración gris (después de la cocción) | Descoloração após cozedura |
| Dormancy | Kiemrust | Keimruhe | Dormance | Dormancia | Dormência |
| Dry matter content | Drogestofgehalte | Trockensubstanzgehalt | Matière sèche | Contenido de materia seca | Teor de matéria seca |
| Dry matter distribution | Drogestofverdeling | Trockenmasseverteilung | Répartition de la matière sèche | Distribución de la materia seca | Distribuição da matéria seca |
| Flakes | Vlokken | Flocken | Flocon | Copos | Flocos |
| Flesh colour | Vleeskleur | Fleischfarbe | Couleur de la chair | Color de la carne | Cor da polpa |
| Flower colour | Bloemkleur | Blütenfarbe | Couleur de la fleur | Color de la flor | Cor da flor |
| Foliage - final development | Loof - ontwikkeling volledig | Laub - Entwicklung Ende | Feuillage - développement final | Follaje - desarrollo final | Folhagem - desenvolvimento final |
| Foliage - firmness | Loof - stevigheid plant | Laub - Festigkeit | Feuillage - tenue | Follaje - firmeza | Firmeza da folhagem |
| Foliage - initial development | Loof - ontwikkeling begin | Laub - Entwicklung Anfang | Feuillage - développement initial | Follaje - desarrollo inicial | Folhagem - desenvolvimento inicial |
| French fries | Frites | Pommes frites | Frites | Patatas fritas | Palitos |
| Fresh | Vers | Frisch | Frais | Frescas | Fresco |
| Fries quality | Geschikt voor friet | Geeignet für Pommes | Utilisation possible en Frites | Calidad para patatas fritas | Qualidade para fritura em palitos |
| Growth cracks | Groeischeuren | Wachstumsrisse | Crevasses | Grietas de crecimiento | Rachamentos |
| Harvest damage | Rooibeschadiging | Rodebeschädigung | Dégâts d'arrachage mécanique | Daños de recolección | Danos mecânicos |
| Late blight - foliage | Phytophthora - loof | Krautfäule | Mildiou du feuillage | Mildiu de la hoja | Míldio da folha |
| Late blight - tuber | Phytophthora - knol | Braunfäule | Mildiou du tubercule | Mildiu del tubérculo | Míldio do tubérculo |
| Light sprout colour | Kiemkleur | Lichtkeim | Couleur du germe | Color claro del brote | Brolho de cor clara |
| Maturity | Rijptijd | Reifezeit | Maturité | Madurez | Maturação |
| Organic | Biologisch | Biologisch | Biologique | Ecológico | Biológico |
| Potato cyst nematodes | Aardappelmoeheid | Kartoffelzystennematoden | Nématodes | Nematodos del quiste de la patata | Nemátodes do quisto da batateira |
| Powdery scab | Poederschurft | Pulverschorf | Gale poudreuse | Sarna pulverulenta | Sarna pulverulenta |
| Processing | Verwerking | Verarbeitung | Industrie | Transformación | Indústria |
| Raw discolouration | Rauwverkleuring | Rohverfärbung | Grisaillement | Coloración en crudo | Descoloração em cru |
| Regularity of tuber shape | Regelmaat knolvorm | Regelmäßigkeit der Knollenform | Régularité de la forme | Regularidad de la forma de los tubérculos | Regularidade da forma |
| Regularity of tuber size | Regelmaat sortering | Größenregelmäßigkeit | Homogénéité de la taille | Regularidad del tamaño | Regularidade do calibre |
| Retail | Retail | Einzelhandel | Retail | Venta al por menor | Retalho |
| Salads | Salade | Salatsorten | Vapeur | Ensaladas | Salada |
| Secondary growth | Doorwas | Durchwuchs | Repousse | Crecimiento secundario | Segundos crescimentos |
| Skin colour | Schilkleur | Schalenfarbe | Couleur de la peau | Color de la piel | Cor da pele |
| Skin finish | Schilhoedanigheid | Schalenqualität | Qualité de la peau | Finura de la piel | Acabamento de pele |
| Specials | Speciaal | Spezielle | Spécialité | Especiales | Especialidades |
| Spraing | Kringerigheid | Stippigkeit | Ferrure | Manchas y/o círculos necróticos | TRV |
| Starch | Zetmeel | Stärke | Fécule | Fécula | Fécula |
| Traditional | Traditioneel | Traditionell | Traditionelle (consommation) | Tradicional | Tradicional |
| Tuberisation | Knolzetting | Knollenbildung | Tubérisation | Tuberización | Tuberização |
| Tuber shape | Knolvorm | Knollenform | Forme du tubercule | Forma de los tubérculos | Forma dos tubérculos |
| Tuber size | Grofheid knollen | Knollengrösse | Grosseur des tubercules | Tamaño de los tubérculos | Calibre dos tubérculos |
| Underwater weight | Onderwatergewicht | Unterwassergewicht | Poids sous eau | Peso bajo agua | Peso debaixo de água |
| Wart disease | Wratziekte | Kartoffelkrebs | Gale verruqueuse | Sarna verrugosa | Verruga negra |

## Notizen.

# Same catalogue, different language?

**This variety catalogue is available digitally in the following languages**
**English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | Português**

agricopotatoes.fr/
catalogue/english

agricopotatoes.fr/
catalogue/german

agricopotatoes.fr/
catalogue/spanish

agricopotatoes.fr/
catalogue/french

agricopotatoes.fr/
catalogue/dutch

agricopotatoes.fr/
catalogue/portugese

Cultivation recommendations are available in many languages on our website or via our local partner in the relevant country.



**Agrico**
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
The Netherlands
**T** +31 (0)527 639911 / **E** info@agrico.nl
**I** agricopotatoes.de

ORD-2627680 | 2026-2027